

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

סאנלנקה® תמייסה להזרקה lenacapavir 463.5 mg/vial

חומרים פעילים: כל מ"ל מכיל –

309 מ"ג

לנקפואיר (סנטראן) (lenacapavir as sodium)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה זו, מכיוון שהוא מכיל מידע חשוב עבורך. עלון זה מכיל מידע חיוני על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. שמור את העلون הזה. יתכן שתצטרכך לקרוא אותו שוב. תרופה זו נרשמה עבורך בלבד. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה לשולך. אם אתה חש בתופעות לוואי פנה לרופא או לרוקח, גם אם אתה חש בתופעות לוואי שאין מוזכרות בעalon (ראה סעיף 4).

התרופה מיועדת למבוגרים בני 18 ומעלה.

1. למה מיועדת התרופה?

סאנלנקה תמייסה להזרקה, בשילוב עם תכשיר(ים) אנטי-רטרוויראל(ים) אחר(ים), מיועדת לטיפול במבוגרים עם זיהום בגין הכשל החיסוני האנושי מסוג 1 (1-HIV) עם עמידות לתרופות רבות, אשר לא ניתן להרכיב בעברם משטר אנטי-ויראלייעיל חלופי.

קבוצה רפואיית: תרופות אנטי-ויראליות לשימוש סיסטי; תרופות אנטי-ויראליות אחרות.

סאנלנקה היא תרופה בעלת פעילות ארוכת טווח והינה מיועדת, **בשילוב עם תכשירים אנטי-רטרוויראליים אחרים**, לטפל בגין הכשל החיסוני מסוג 1 (HIV), הנגיף אשר גורם לתסמנת הכשל החיסוני (AIDS).

השימוש בסאנלנקה מיועד למבוגרים עם חולופות טיפוליות מוגבלות (למשל כאשר תכשירים אנטי-רטרוויראליים אחרים אינם יעילים מספיק או אינם מתאימים).

הטיפול בסאנלנקה בשילוב עם תכשירים אנטי-רטרוויראליים אחרים מפחית את כמות נגיפי ה-HIV בגוף. כך, תשתperf פועלות מערכת החיסון שלך (מערכת ההגנה הטבעית של הגוף) ויחסת הסיכון שתפתח מחלות הקשורות בזיהום-B-HIV.

סאנלנקה מכילה את החומר הפעיל **לנקפואיר (lenacapavir)**. זהה תרופה נוגדת נגיפי רטרו המוכרת כמעכב HIV.

2. לפני השימוש בתרופה

- אין להשתמש בתרופה אם הנר רגיש (אלרגי) לנקפואיר, או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (מופיעים בסעיף 6 של עalon זה).
 - הנר נוטל תרופה כלשהי מבין התרופות הבאות:
 - ריפאמפיצין (Rifampicin) המשמש לטיפול במספר סוגים של זיהומים חידושים, כגון שחפת.
 - קרבנזפין, פניטואין (carbamazepine, phenytoin) המשמשים למניעת פרכוסים
 - פרע מחורר (Hypericum perforatum), צמח מרפא המשמש לטיפול בדיכאון וחרדה.
- ◀ אם אתה חושב שאחד הסעיפים תקין לגביך, אל תקבל סאנלנקה וספר מיד לרופא שלך.

■ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

יש להיוועץ ברופא לפני נטילת סאנלנקה:

- **היוועץ ברופא או ברוקח** שכן אם יש לך עבר של מחלת כבד חמורה או במייה ובדיקות הראו בעיות עם הכבד שלך. הרופא שלך יSKUOL בקפידה האם יש לטפל לך עם סאנלנקה.

בעת נטילת סאנלנקה

אחרי שהתחלת ליטול סאנלנקה, שים לב לסימנים הבאים:

- **סימני דלקת או זיהום**

◀ **אם הנך מבחין באחד מהתסמים האלו, ספר לרופא שלך מיד. למידע נוסף, ראה סעיף 4, תופעות לוויאי.**

מועד טיפול קבועים הינם חשובים
חשוב מאוד להגיע למועד הטיפול כפי שנקבעו לקבלת זריית סאנלנקה על מנת לשלוט בזיהום ה-HIV ולמנוע את התדרדרות המחללה. אם אתה שוקל להפסיק את הטיפול, שוחח עם הרופא שלך. אם אתה מתעכ卜 בקבלת הזריית או אם אתה מפסיק לקבל סאנלנקה, אתה תצטרכ לחתת תרופות חלופיות כדי לטפל בזיהום ה-HIV ולהפחית את הסיכון לפתח עמידות לנגיף.

ילדים ומתבגרים

אין למתן תרופה זו לילדים מתחת לגיל 18. אין מידייע על השימוש בסאנלנקה במטופלים מתחת לגיל 18.

תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקחת, לחתת לאחרונה או עשוי לחתת, **תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או ברוקח.** סאנלנקה עשויה להגיב עם תרופות אחרות. הדבר עשוי למנוע מסאנלנקה או מתרופות אחרות לפעול כראוי, או עלול להחמיר תופעות לוואי כלשהן. במקרים מסוימים, הרופא יצטרך לשנות את מינון התרופה או לבדוק את רמת התרופה בדם.

תרופות שאסור ליטול במקביל לسانלנקה:

- **ריפampieצין (rifampicin)** המשמשת לטיפול במספר סוגים של זיהומים חידקיים, כגון שחפת.
- **קרבמазפין, פניטואין (carbamazepine, phenytoin)** המשמשים למניעת פרקושים.
- **פרע מחורר (Hypericum perforatum)**, צמח מרפא המשמש לטיפול בדיכאון ובחרדה.

◀ **אם אתה נוטל אחת מתרופות אלה, אין לקבל סאנלנקה ויש לדוח עלך מיד לרופא שלך.**

שוחח עם הרופא שלך ביחיד במייה והן נוטל:

- **תרופות אנטי-ביסיוטיות המכילות:**
 - **ריפאבוטין (rifabutin)**
- **תרופות נגד פרקושים המשמשות לטיפול באפילפסיה המכילות:**
 - **אוקסקרbazפין (oxcarbazepine) או פנוברביטל (phenobarbital)**
- **תרופות המשמשות לטיפול ב-HIV, המכילות:**
 - **אטזנביר/קוביסיסטאט (efavirenz), אפאוירן (atazanavir/cobicistat), נוירפין (nevirapine), טיפרנויר/רטונואיר (tipranavir/ritonavir) או אטרוירין (etravirine).**
- **תרופות לטיפול במיגרנה, המכילות:**
 - **ד'הידרו-רגוטמין (ergotamine) או ארוגוטמין (dihydroergotamine)**
- **תרופות המשמשות לטיפול באין אונות וביתר לחץ דם ריאתי, המכילות:**
 - **סילדנafil (sildenafil) או טadalafil (tadalafil)**
- **תרופות המשמשות לטיפול באין אונות, המכילות:**
 - **וּרְדָנָאַפִּיל (vardenafil)**
- **קורטיקוסטרואידים (הידועים גם כ"סטרואידים") הנטילים דרך הפה או על ידי זריית למטרת טיפול בארגליה, מחלות מעי דלקתיות ומחלות שונות אחרות המערבות דלקות בגוף, המכילות:**

- דקסומתאזון (hydrocortisone/cortisone) או הידרוקורטיזון/קורטיזון (dexamethasone) תרופות המשמשות להורדת כולסטרול, המכילות:
- לובסטטין (lovastatin) או סימבסטטין (simvastatin) תרופות אנטי-אריתמיות לטיפול בעיות לבביות המכילות:
- דיגוקסין (digoxin) תרופות המסייעות לשינה, המכילות:
- מידזולם (midazolam) או טרייאזולם (triazolam) תרופות נוגדות קריישה המשמשות למניעה וטיפול בקוריישי דם, המכילות:
- ריבוגראקסבן (rivaroxaban), דיביגטרן (dabigatran) או אדוקסבן (edoxaban)

← ספר לרופא אם אתה נוטל תרופה כלשהי מרשימה זו או אם הנך מתחילה את הטיפול עם אחת מהתרופות הללו במהלך הטיפול עם סאנלנקה. אל תפיסק את הטיפול בלי להיוועץ קודם ברופא.

סאנלנקה היא תרופה הפעילה לטווח ארוך. אם לאחר שיחה עם הרופא שלך החלטת להפסיק את הטיפול או להחליף לטיפול אחר, עליך לדעת כי רמות נמוכות של לנkapויר (החומר הפעיל בסאנלנקה) יכולות להישאר בגוף לחודשים רבים לאחר החזרקה האחרונה. רמות נמוכות אלו לא צפויות להשפיע על תרופות אחרות – רטרויריאליות אחרות שתיטול לאחר מכון כדי לטפל בziehom ה-VIH. עם זאת, תרופות אחרות עלולות להיות מושפעות מהרמות הנמוכות של לנkapויר בגוף, כמו זה ואתה נוטל אותן בתוך 9 חודשים מזריקת סאנלנקה לאחרונה. כדאי לבדוק עם הרופא שלך האם תרופות אלו בטוחות לנטייה לאחר שהפסקת טיפול עם סאנלנקה.

הירין והנקה

אם הנך בהירין או מניקה, חשוב שיתacen שהנך בהירין, או מתכוננת להרות, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו.

המידע על השימוש בסאנלנקה בנשים בהירין הינו מוגבל, על כן יש להימנע מהשימוש בסאנלנקה במהלך הירין, אלא אם כן הרופא שלך מנחה אותך אחרת.

הנקה אינה מומלצת בנשים החיות עם נגיף ה-VIH כיוון נגיף ה-VIH עשוי לעבור לתינוק דרך חלב האם. לא ידוע אם לנkapאביר מופרש בחלב אם על כן האם מnika או שוקלת הנקה, **עליך להיוועץ ברופא שלך בהקדם האפשרי.**

גהיגת השימוש במכונות

סאנלנקה אינה צפואה להשפיע על היכולת לנוהג או להשתמש בכלים או במכונות כלשהם.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

סאנלנקה מכילה נתרן

התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) פר זריקה, כך שניתן לומר שהתרופה אינה נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

سانלנקה ניטלת בשילוב עם **תרופות אנטי-רטרויראליות נוספות** לטיפול בזיהום HIV. הרופא שלך ייעץ לך אילו תרופות נוספות יש ליטול לטיפול בזיהום ה-HIV ומתי יש ליטול אותן.

הטיפול שלך בסאנלנקה מתחילה בטబליות שיש ליטול דרך הפה, ומהמשך בזריקות שיינטנו לך ע"י הרופא או האחות שלך, כמפורט מטה.

שוחח עם הרופא שלך לפני נטילת הטబליות. אתה תקבל הנחיה מתי יש להתחיל את הטיפול בטబליות ולמתי עליך לעמוד קבלת הזריקות הראשונות.

יום 1 לטיפול:

- שתי טబליות הנינטנות דרך הפה, עם או ללא אוכל.

יום 2 לטיפול:

- שתי טబליות הנינטנות דרך הפה, עם או ללא אוכל.

יום 8 לטיפול:

- טבליה אחת הנינטנת דרך הפה, עם או ללא אוכל.

יום 15 לטיפול:

- שתי זריקות לבطن הנינטנות בו בזמןית על ידי הרופא או האחות שלך.

כל 6 חודשים:

- שתי זריקות לבطن הנינטנות בו בזמןית על ידי הרופא או האחות שלך.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אם קיבלת סאנלנקה במינון גבוה מהנדרש

הטיפול ניתן על ידי הרופא או האחות שלך, אם קיים חשש למתן התכשיר במינון גבוה מהנדרש, ספר על כך לרופא או לאחות.

אם פספסת זריקת סאנלנקה

- חשוב כי תקפיד על קיום הפגיעה הקבועות כל שישה חודשים כדי לקבל זריקות של סאנלנקה. זה יסייע לך לשלוט בזיהום ה-HIV.
- אם אתה חושש שלא תוכל להגיע לפגישה לקבל את הזריקות, צור קשר עם הרופא שלך במהרה כדי לדון באפשרויות הטיפוליות שלך.

אם אתה מחמיץ נטילת טבליה או מקיא אותן, פנה לעלון לצרכך של סאנלנקה טబליות.

אין להפסיק ליטול סאנלנקה

אין להפסיק הטיפול בסאנלנקה מבלתי לשוחח על כך קודם עם הרופא שלך. המשך טיפול בזריקות סאנלנקה למשך כל התקופה המומלצת על ידי הרופא שלך. הפסיקת סאנלנקה עלולה לפגוע באופן חמור בהשפעת הטיפולים נגד נגיף ה-HIV בעתיד.

← שוחח עם הרופא שלך במידה ואתה מעוניין להפסיק את הטיפול בזריקות סאנלנקה.

אין ליטול תרופות בחושך!
בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה.
הרכב משקפיים אם הנהן אכן נדרש להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסאנלנקה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחלה במקרה רשותת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות לוואי חמורות אפשריות: דוחה מיד לרופא

- **כל סימן לדלקת או לziehom.** בחלק מהמטופלים עם ziehom VII במצב מתקדם (تسمונת הכלש החיסוני הנרכש (איידס) והיסטוריה של ziehomים אופורטוניטיים (ziehomים שפוגעים באנשים בעלי מערכת חיסון חלה), סימנים ותסמינים של דלקת שנגרמה על ידי ziehomים קודמים עלולים להופיע תוך זמן קצר לאחר תחילת הטיפול ב-VII. ההשערה היא שתסמים אלו נגרמים עקב שיפור בתגובה החיסונית של הגוף, המאפשרת לגוף להילחם בziehomים שייתכן שנמצאו בו עד קודם לכן מבלי לגרום לתסמים ברורים.
- **הפרעות אוטואימוניות,** שבן מערכת החיסון תוקפת רקמה בריאה של הגוף, עלולות אף הן להופיע לאחר תחילת הנטילה של תרופות לטיפול ב-VII. הפרעות אוטואימוניות עלולות להופיע חודשים רבים לאחר תחילת הטיפול. יש לשים לב לכל תסמין של ziehom או תסמים אחרים כדוגמת:
 - חולשת שרירים
 - חולשה שמנתילה בידים וברגליים ומתרפעת כלפי מרכז הגוף
 - דפיקות לב, רעד או פעילות יתר (היפראקטיביות)

◀ אם הבחנת בתופעות אלו או בכל תסמין של דלקת או של ziehom, דוח על כך מיד לרופא שלך.

- **תופעות לוואי שכיחות מאוד (מופיעות בי/יתר משתמש אחד מעשרה)**
 - **תגובות באתר בו הזורקה סאנלנקה**
 - התסמים כוללים:
 - כאב וחוסר נוחות
 - גוש או בליטה קשה
 - תגובה דלקתית כגון אודם, גירוד ונפיחות

- **תופעות לוואי שכיחות (শמופיעות ב-10-1 ממשתמשים מתוך 100)**
 - **בחילה**

◀ אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעлон, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדוח על תופעת לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעת לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הביתי של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.
תוכל לעזור לספק מידע נוסף על בטיחות התרופה באמצעות דיווח על תופעות לוואי.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנع הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לטוויח ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות. על-ידי כך תמנע הרעליה.

אין להשתמש בתרופה זו אחרי תאריך התפוגה המופיע על הקרטון ותוית הבקבוקון (EXP). תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תרופה זו אינה דורשת תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמור בטמפרטורת החדר. אחסון בתרופה באזיזה המקורית על מנת להגן מפני אור.

6. מידע נוסף

מה סאנלנקה תמייסה להזרקה מכילה
החומר הפעיל הוא לנkapvio (lenacapavir). כל בקבוקון לשימוש חד פעמי מכיל 463.5 מ"ג לנקפוייר.

נוסף על המרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Macrogol (E1521), water for injections.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האזירה

סאנלנקה תמייסה להזרקה היא תמייסה שקופה, צהובה-חומה ללא חלקיקים נראים לעין. סאנלנקה מגיעה בשני בקבוקוני זכוכית, כל אחד מכיל 1.5 מ"ל תמייסה להזרקה. בקבוקוניים אלה הינם חלק מkit הזרקה, הכלול גם שני עזרי הזרקה (מכשיר המשיע לרופא או לאחות לשורר סאנלנקה מהבקבוקון), שני מזרקים חד פעמיים ושני מחטי הזרקה.

היצן

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business & Technology Park
Carrigtohill
County Cork
Ireland

בעל הרישום

גילד סיננסז ישראל בע"מ
רחוב החרש 4
הוד השרון 4524075
ישראל

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 34743

לשם הפשטות ולהקלת הקרייה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך במרץ 2024.
עלון אסמכתא: EU SmPC June 2023.

IL-MAR24-EU-JUN23

The following information is intended for healthcare professionals only:

Instructions for Use-Sunlenca solution for injection

Your pack contains

2 vials	
2 vial access devices	
2 syringes	
2 injection needles	





All the components are for single use.

A complete dose requires **two 1.5 mL injections**. The use of **the vial access device** is required.

Make sure that:

- Vial contains a **yellow-to-brown solution with no particles**
- Contents are **not damaged**
- Product is **not expired**

1. Prepare Vial	
	Remove cap.
	Clean vial stopper with alcohol wipe.
2. Prepare Vial Access Device	
	Push Down.
	Twist off.
3. Attach and Fill Syringe	
	<ul style="list-style-type: none">• Attach syringe and inject 1.5 mL of air into vial.• Flip upside down and withdraw all contents.

4. Prepare an Injection Site on Patient's Abdomen		Injection site options (at least 5 cm from navel)
5. Assemble needle and Syringe		Attach Injection Needle and Prime to 1.5 mL
6. Inject Dose		Inject 1.5 mL of Sunlenca Subcutaneously
7. Administer 2nd Injection		Repeat steps for 2 nd injection at new injection site.