

מידע למטופלים אודות אולומיאנט™ (בריסיטיניב)

מסמך זה מכיל מידע חשוב, שעליך להיות מודע אליו טרם השימוש ובמהלך השימוש באולומיאנט.

אולומיאנט משמש לטיפול במבוגרים הסובלים מדלקת מפרקים שגרונית מתונה עד חמורה, בהם טיפול קודם בתרופה אנטי ראומטית אחת או יותר מקבוצת DMARD לא היה יעיל דיו או היה בלתי נסבל. ניתן להשתמש באולומיאנט כתכשיר יחיד או בשילוב עם מתוטרקסאט (methotrexate).

אולומיאנט משמש לטיפול במבוגרים הסובלים מדלקת עור אטופית מתונה עד חמורה, המועמדים לטיפול סיסטמי (טיפול שניתן לכלל הגוף).

אולומיאנט משמש לטיפול במבוגרים עם אלופסיה אראטה (קרחת אזורית) חמורה.

למידע מלא על התרופה, יש לעיין **בעלון לצרכן** המצורף לאריזת התכשיר. כמו כן, העלון לצרכן מפורסם באתר משרד הבריאות: [מאגר התרופות \(health.gov.il\)](http://health.gov.il)



שמור מידע זה עימך והעבר אותו לאנשי צוות רפואי אחרים המעורבים בטיפול שלך.

שמך:

שם הרופא (אשר רשם אולומיאנט):

מספר טלפון של הרופא:

הכרטיס אושר בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך: פברואר 2024

זיהומים

אולומיאנט עלול להחמיר זיהום קיים או להגביר את הסיכון לכך שתפתח זיהום חדש או להגביר את הסיכון לשפיעול נגיפי. אם יש לך סוכרת או שאתה מעל גיל 65, ייתכן שהסיכון לזיהומים יהיה גבוה יותר. זיהום שאינו מטופל עלול להפוך לחמור. דווח לרופא מייד אם תפתח תסמינים של זיהום, כגון:

- חום, פצעים, תחושת עייפות מוגברת בהשוואה למצב הרגיל או בעיות שיניים.
- שיעול שאינו חולף, הזעות ליליות וירידה במשקל. אלה עלולים להיות תסמינים של שחפת (מחלת ריאות זיהומית).
- פריחה עורית המלווה בכאב ובשלפוחיות. תופעה זו עלולה להיות סימן לזיהום בשלבקת חוגרת.

סרטן עור שאינו מלנומה

סרטן עור שאינו מלנומה נצפה בקרב מטופלים שנטלו אולומיאנט. אם מופיעים נגעים חדשים בעור במהלך או אחרי הטיפול או שחל שינוי במראה של נגעים קיימים, הודע לרופא.

קרישי דם

אולומיאנט עלול לגרום למצב שבו נוצר ברגל קריש דם העלול להיסחף אל הריאות. הודע לרופא מייד אם הבחנת באחד מהתסמינים הבאים:

- נפיחות או כאב באחת הרגליים או הזרועות
- תחושת חום או אדמומיות באחת הרגליים או הזרועות
- קוצר נשימה בלתי צפוי
- נשימות מהירות
- כאב בחזה

היריון

- אין ליטול אולומיאנט אם את בהיריון או חושדת שאת עשויה להיות בהיריון.
- השתמשי באמצעי מניעה יעיל במהלך הטיפול באולומיאנט (ובמשך שבוע אחד לאחר מכן, אם הפסקת את הטיפול).
- דווחי לרופא מייד אם את בהיריון (או אם ברצונך להרות).

התקף לב או שבץ

הודע לרופא מייד אם הבחנת באחד מהבאים:

- כאב או לחץ בחזה בדרגה חמורה (שיכול להתפשט לזרועות, ללסת, לצוואר, לגב)
- קוצר נשימה
- זיעה קרה
- חולשה חד-צדדית בזרוע ו/או ברגל
- דיבור לא ברור