

Храните данную информацию при себе и передайте ее другим членам медицинского персонала, участвующим в вашем лечении.

Ваши имя и фамилия:

**Имя и фамилия врача
(выписавшего вам Олюмиант):**

Номер телефона врача:

Данная карточка утверждена в соответствии с указаниями
Министерства здравоохранения в феврале 2024 года

PP-BA-IL-0705

Информация для пациентов об Олюмианте™ (Барицитинибе)

Настоящая брошюра содержит важную информацию, которую вы должны знать перед применением Олюмианта и во время его применения.

Олюмиант используется у взрослых людей для лечения ревматоидного артрита от низкой до серьезной степени активности в тех случаях, когда предшествующее применение одного или более антиревматических препаратов из группы БМАРП (DMARD) не дало желаемого эффекта или плохо переносилось пациентом. Можно использовать Олюмиант в качестве единственного препарата или в сочетании с метотрексатом (methotrexate).

Олюмиант используется у взрослых людей для лечения atopического дерматита от низкой до серьезной степени активности, которым показано системное лечение (лечение всего тела).

Олюмиант используется для лечения взрослых с тяжелой очаговой алопецией (облысением).

Для получения полной информации о препарате следует ознакомиться с **Инструкцией по применению**, приложенной к упаковке препарата. Помимо этого, Инструкция по применению находится на интернет-сайте Министерства здравоохранения:

[База данных лекарственных препаратов \(health.gov.il\)](https://health.gov.il)



Инфекции

Олюмиант способен усугубить существующие инфекции или повысить риск того, что у вас разовьются новые инфекции, или повысить риск репликации вирусов. Если у вас диабет или вам больше 65 лет, риск заражения может быть выше. Нелеченая инфекция может приобрести серьезный характер. Немедленно сообщите врачу, если у вас возникли симптомы инфекции, например:

- Жар, язвы, повышенная утомляемость по сравнению с обычным состоянием или стоматологические проблемы.
- Кашель, который не проходит, ночное потоотделение и уменьшение веса тела. Эти явления могут быть симптомами туберкулеза (инфекционного заболевания легких).
- Кожная сыпь, сопровождающаяся болями и появлением пузырьков. Эти явления могут быть симптомами опоясывающего лишая (Herpes zoster).

Немеланоцитарный рак кожи

У пациентов, принимавших Олюмиант, наблюдался немеланоцитарный рак кожи. Если во время или после лечения появляются новые поражения кожи или происходит изменение внешнего вида существующих поражений, сообщите об этом врачу.

Тромбоз

Олюмиант может вызвать состояние, при котором в венах на ногах образуется тромб, способный попасть в легкие. Немедленно сообщите своему врачу, если вы заметили какой-либо из следующих симптомов:

- Отек или боль в одной из ног или рук
- Ощущение жара или покраснение в одной из ног или рук
- Неожиданная одышка
- Учащенное дыхание
- Боль в груди

Беременность

- Не следует принимать Олюмиант, если вы беременны или полагаете, что можете быть беременны.
- Во время лечения Олюмиантом используйте эффективные средства контрацепции (и продолжайте их использование в течение недели после прекращения приема данного препарата).
- Немедленно сообщите врачу, если вы забеременели (или если хотите забеременеть).

Инфаркт миокарда или инсульт

Немедленно сообщите своему врачу, если вы заметили что-либо из следующего:

- Сильная боль или давление в груди (которые могут распространяться на руки, челюсть, шею, спину)
- Одышка
- Холодный пот
- Односторонняя слабость в руке и/или ноге
- Неразборчивая речь