

# معلومات للمتعالجين حول أولوميانت™ (باريسيتينب)

يحتوي هذا المستند على معلومات مهمة، التي يجب عليك أن تعرفها قبل الاستعمال وخلال استعمال أولوميانت.

يُستعمل أولوميانت لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب مفاصل روماتويدي معتدل حتى شديد، الذين تلقوا علاجاً سابقاً بدواء واحد أو أكثر مضاد الروماتيزم من مجموعة DMARD ولم يكن فعالاً بما يكفي أو أنه كان غير محتمل. يمكن استعمال أولوميانت كمستحضر وحيد أو بالدمج مع ميثوتريكسات (methotrexate).

يُستعمل أولوميانت لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي المعتدل حتى الحاد، المرشحين للعلاج الجهازى (علاج يتم إعطاؤه لكل الجسم).

يُستعمل أولوميانت لعلاج البالغين المصابين بالتَّعلبة (بقعة الصَّلع) الحادّة.

للحصول على معلومات كاملة عن الدواء، يجب قراءة النشرة للمستهلك المرفقة في عبوة المستحضر. كذلك، فإن النشرة للمستهلك منشورة على موقع وزارة الصحة: [مجّمع الأدوية \(health.gov.il\)](http://health.gov.il)

احتفظ بهذه المعلومات معك ومررها لأفراد آخرين من الطاقم الطبي الذين يشاركون في علاجك.

اسمك:

اسم الطبيب (الذي وصف أولوميانت):

رقم هاتف الطبيب:

تمت المصادقة على هذه البطاقة وفق تعليمات وزارة الصحة في تاريخ: شباط 2024

## حالات عدوى

قد يؤدي أولوميانت إلى تفاقم حالة عدوى موجودة أو يزيد خطر تطور عدوى جديدة أو يزيد خطر التنشيط الفيروسي. إذا كنت مصابا بالسكري أو كان عمرك فوق 65 عاما، قد تكون خطورة حالات العدوى أعلى. قد تصيح العدوى التي لا يتم علاجها أكثر خطورة. بلغ الطبيب فوراً إذا تطوّرت لديك أعراض عدوى، مثل:

- سخونة، جروح، شعور بالتعب المتزايد مقارنة بالحالة الاعتيادية أو مشاكل أسنان.
- سُعال لا يختفي، تعرّق ليليّ وانخفاض في الوزن. هذه قد تكون أعراض مرض السل (مرض رئوي معدّ).
- طفح جلدي مصحوب بألم وبتور. هذا العارض قد يكون علامة لعدوى الهربس النطاقي.

## سرطان الجلد غير الميلانوما

تمت مشاهدة سرطان الجلد غير الميلانوما لدى متلقي العلاج الذين تناولوا أولوميانت. إذا ظهرت آفات جديدة في الجلد خلال أو بعد العلاج أو إذا حصل تغيير في شكل الآفات الموجودة، أخبر الطبيب.

## تخثرات دموية

قد يسبب أولوميانت حالة تتشكل فيها خثرة دموية في الرجل، والتي قد تنتقل إلى الرئتين. أخبر الطبيب فوراً إذا لاحظت أحد الأعراض التالية:

- انتفاخ أو ألم في إحدى الرجلين أو الذراعين

- شعور بالحرارة أو الاحمرار في إحدى الرجلين أو الذراعين
- ضيق تنفّس غير متوقع
- تنفّس سريع
- ألم في الصّدر

## الحمل

- يُمنع تناول أولوميانت إذا كنت حاملا أو تشكين بأنك قد تكونين حاملا.
- استعملي وسيلة منع حمل ناجعة خلال العلاج بأولوميانت (ولمدة أسبوع واحد بعد ذلك، إذا توقفت عن العلاج).
- أبلغني الطبيب فوراً إذا حملت (أو إذا كنت ترغيبين بأن تحملي).

## نوبة قلبية أو أزمة دماغية

أخبر الطبيب فوراً إذا لاحظت أحد الأمور التالية:

- ألم أو ضغط في الصدر بدرجة شديدة (قد يمتدّ نحو الذراعين، الفكّ، العنق، الظهر)
- ضيق تنفّس
- تعرّق بارد
- ضعف في جهة واحدة في الذراع و/أو الرجل
- كلام غير واضح