

## עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ז – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### **בריביאקט תמייסה לשתייה**

**החומר הפעיל:**

**בריביאקט תמייסה לשתייה מכילה** 10 מ"ג בריבאראצטאם (brivaracetam 10 mg) לכל 1 מ"ל תמייסה.

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, אנא ראה פרק 2 סעיף : "מידע חשוב אודות חלק מרכיבי התרופה" ופרק 6 : "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלות. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואית דומה.

התרופה מיועדת למבוגרים, למתבגרים וילדים מעל גיל 4 שנים.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

בריביאקט משמשת לטיפול בסוג של אפילפסיה המאופיין על ידי אירועים של פרכוסים חלקיים עם או ללא פרכוסים כללים שנוניים, מבוגרים, מתבגרים וילדים מעל גיל 4 שנים.

פרכוסים חלקיים הינם התקפים המתאפיינים בהשפעה על צד אחד של המוח בלבד. פרכוסים חלקיים אלה יכולים להתפשט ולהופיע על חלקים גדולים יותר בשני צידי המוח – מצב זה נקרא 'פרכוסים כללים שנוניים'.

תרופה זו נרשמה עבורה על מנת להפחית את מספר התקפים שלן. בריביאקט ניתנת יחד עם תרופות נוספות לטיפול באפילפסיה.

**קבוצה Terapeutic: תרופות אנט-אפילפטיות.**

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

##### **אין לשימוש בבריביאקט אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל בריבאראצטאם, חומרים כימיים אחרים דומים כמו לבטיראצטאם או פיראצטאם או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (מופייעים בפרק 6). אם איןך בטוח, פנה לרופא או לרוקח לפני Nutzung בריביאקט.

##### **اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בבריביאקט ספר לרופא או לרוקח אם:**

- יש לך מחשבות על פגיעה עצמית או התאבדות. מספר קטן של אנשים המטופלים בתרופות אנט-אפילפטיות כמו בריביאקט חוות מחשבות על פגיעה עצמית או התאבדות. אם יש לך מחשבות כאלו בכל זמן, פנה לרופא מיד.
- הנר סובל מעויות כבד. יתכן שהרופא יצטרך להתאים את המינון שלך.

## **ילדים ומתבגרים**

בריביאקט אין מומלץ לשימוש בילדים מתחת לגיל 4 שנים.

## **אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות**

אם אתה לוקח או אם לךחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. יתכן שהרופא יצטרך להתאים את מינון הbrisiekט שאתה נוטל, במיוחד אם הנך נוטל את התרופות הבאות:

- ריפאמיצין – תרופה המשמשת לטיפול בziehomim חידק'ים.
- Wort St John's – ידועה גם בשם *Hypericum perforatum* – תרופה צמחית המשמשת לטיפול בדיכאון, חרדה ומצביים אחרים.

## **שימוש בתרופה ומזון**

ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

## **שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**

- נטילת התרופה בשילוב עם צריכת אלכוהול אינה מומלצת.
- אם אתה שותה אלכוהול בזמן שאתה נוטל Brisiek, ההשפעות השליליות של אלכוהול עלולות להחמיר.

## **הירין, הנקה ופוריות**

נשים בגיל הפוריות צריכות לשוחח עם הרופא על השימוש באמצעי מניעה.

אם אתה בהירין או מיניקה, חשוב שתהן בהירין או מתכונת להיכנס להירין יש להיעזר ברופא או ברוקח לפני שימוש בתרופות.

לא מומלץ לךחת Brisiek אם אתה בהירין, כיוון שהשפעות Brisiek על ההירין ועל העובר אין ידועות. לא מומלץ להניך את תינוקך במהלך נטילת Brisiek, כיוון שbrisiek עברת לחלב האם.

אין להפסיק את הטיפול ללא התיעצות עם הרופא לפני כן. הפסקת הטיפול עלולה להגביר את ההתקפים שלך ולפגוע בתינוק.

## **נהיגה ושימוש במכונות**

- אתה עלול להרגיש ישנו, מסוחרר או עייף בעת נטילת Brisiek.
- תופעות אלו יותר סדירות בתחילת הטיפול או לאחר העלאת מינון.
- אין להנוג, לרכב על אופניים, להשתמש במכשירים או להפעיל מכונות עד שתדע כיצד התרופה משפיעה עליו. יש להזהיר ילדים מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכבש וכדומה.

## **מידע חשוב אודות חלק ממרכיבי התרופה**

brisiek תמייה לשתייה מכילה:

- מתיל פארה-הידרוקסיבנזואט (E218): עלול לגרום לאלרגיות (יתכן שמאוחרות).
- נתרן: תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לכל מ"ל, קלומר למעשה היא "נטולת נתרן".
- סורביטול (E420) (סוג של סוכר): תרופה זו מכילה 168 מ"ג سورביטול בכל מ"ל. سورביטול הוא מקור לפראקטים. אם נאמר לך על ידי הרופא כי לך (או לילדך) יש אי סובלות לסוכרים מסוימים או אובייחת עם אי סובלות תורשתית לפראקטים (HFI), מחלת גנטית נדירה בה אדם יכול לפרק פראקטוז, פנה לרופא לפני שאתה (או הילדך) נוטל או מקבל תרופה זו.
- פרופיל גליקול (E1520): תרופה זו מכילה מקסימום 5.5 מ"ג פרופיל גליקול בכל מ"ל.

## **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמייד לפי הוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בונגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

brisiek נלקחת יחד עם תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה.

המיןון וצורת הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. רופאrik יקבע את המנה המתאימה עבורו. יש ליטול את התרופה בשתי מנות שווות - פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב בהתאם לשעה כל יום.

**מבוגרים, מתבגרים וילדים השקלים 50 ק"ג או יותר**  
המיןון המקביל בדרך כלל הוא: בין 25 מ"ג ל-100 מ"ג פעמיים ביום. רופאrik עשוי להחליט בהתאם את המיןון הכי נכון עבורו.

**ילדים ומתבגרים השקלים פחות מ-50 ק"ג**  
המיןון המקביל בדרך כלל הוא: בין 0.5 מ"ג עד 2 מ"ג לכל ק"ג משקל גוף פעמיים ביום. רופאrik עשוי להחליט בהתאם את המיןון הכי נכון עבורו.

הטבלה להלן רק מדגימה מנות שניית ליטול ובאיזה מזרק להשתמש. רופאrik יעריך את המנה המתאימה לך ובאיזה מזרק עלייך להשתמש לפי משקלך.

<u>מינה שנלקחת פעמיים ביום בילדים מגיל ארבע שנים ומעלה</u>					
<u>ושקלים פחות מ-50 ק"ג</u>					<u>משקל</u>
<u>2 מ"ג/ק"ג = 0.2 מ"ל/ק"ג</u>	<u>1.5 מ"ג/ק"ג = 0.15 מ"ל/ק"ג</u>	<u>1 מ"ג/ק"ג = 0.1 מ"ל/ק"ג</u>	<u>0.5 מ"ג/ק"ג = 0.05 מ"ל/ק"ג</u>		
2 מ"ל	1.5 מ"ל	1 מ"ל	0.5 מ"ל	10 ק"ג	
3 מ"ל	2.25 מ"ל	1.5 מ"ל	0.75 מ"ל	15 ק"ג	
4 מ"ל	3 מ"ל	2 מ"ל	1 מ"ל	20 ק"ג	
5 מ"ל	3.75 מ"ל	2.5 מ"ל	1.25 מ"ל	25 ק"ג	
6 מ"ל*	4.5 מ"ל	3 מ"ל	1.5 מ"ל	30 ק"ג	
7 מ"ל*	5.25 מ"ל	3.5 מ"ל	1.75 מ"ל	35 ק"ג	
8 מ"ל*	6 מ"ל	4 מ"ל	2 מ"ל	40 ק"ג	
9 מ"ל*	6.75 מ"ל	4.5 מ"ל	2.25 מ"ל	45 ק"ג	
10 מ"ל*	7.5 מ"ל	5 מ"ל	2.5 מ"ל	50 ק"ג	
עבור נפח בין 0.5 מ"ל עד 5 מ"ל, השתמש במזרק האוראלי של 5 מ"ל (שנתות בצבע כחול).					השתמש במזרק של 5 מ"ל (שנתות בצבע כחול)
*עבור נפח מעל 5 מ"ל עד 10 מ"ל, השתמש במזרק האוראלי של 10 מ"ל (שנתות בצבע שחור).					

#### מטופלים עם בעיות כבד

אם אתה סובל מבעיות בכבד:

- עבור מבוגר, מתבגר או ילד השקל 50 ק"ג או יותר, המנה המקסימלית שתיטול היא 75 מ"ג פעמיים ביום.
- ילד או מתבגר השקל פחות מ-50 ק"ג, המנה המקסימלית שתיטול תהיה 1.5 מ"ג לכל ק"ג משקל גוף פעמיים ביום.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

ניתן ליטול את תמייסת בריביאקט ללא מיהול או למיהול אותה במים או ב Miz' Zeit קצר לפני הבליעה.

#### **הוראות שימוש למטופלים או מטופלים:**

- האריזה תכיל שני מזרקים למtan אוראלי. ודא עם הרופא שלך באיזה מהם להשתמש.
- עבור נפח בין 0.5 מ"ל ל-5 מ"ל, עלייך להשתמש במזרק האוראלי של 5 מ"ל (שנתות בצבע כחול) המצורף לאrizah על מנת להבטיח דיק במדידת המנה.



- עברו נפח מעל 5 מ"ל ועד 10 מ"ל, עליך להשתמש במזרק האוראלי של 10 מ"ל (שנתות בצלב) שחזור המצורף לאירועה על מנת להבטיח דיוק במדידת המנה.

מזרק מדידה אוראלי 10 מ"ל	מזרק מדידה אוראלי 5 מ"ל
מזרק המדידה האוראלי של 10 מ"ל נשא מערכת שנתות אחת בצלב כחול; בהפרש של 0.25 מ"ל.	מזרק המדידה האוראלי של 5 מ"ל נשא שתי מערכות שנתות חופפות בצלב כחול; בהפרש של 0.25 מ"ל ובהפרש של 0.1 מ"ל.



פתח את הבקבוק: לחץ על הפקק וסובב אותו נגד כיוון השעון (איור 1)



- עקב אחר צעדים אלה בפעם הראשונה שאתה נוטל בריביאקט:
- הסר את המתאם מהמזרק האוראלי (איור 2).
  - הכנס את המתאם לפתח הבקבוק (איור 3). וודא שהוא מקובע היטב במקוםו. אין צורך להסיר את המתאם לאחר שימוש.




- עקב אחר צעדים אלה בכל פעם שאתה נוטל בריביאקט:
- הכנס את המזרק האוראלי לתוך פתח המתאם (איור 4).
  - הפוך את הבקבוק כלפי מטה (איור 5).




- החזק את הבקבוק במאופר בידי אחת והשתמש ביד השנייה למילוי המזרק האוראלי.
- משור את הבוכנה כלפי מטה לצורך مليוי המזרק האוראלי עם כמות קטנה של תמייסה (איור 6).
- לאחר מכן, דחוף את הבוכנה כלפי מעלה על מנת להוציא בועות אויר שיתכן שנוצרו (איור 7).


- משוך את הבוכנה כלפי מטה עד לכו הסימון במיליליטרים המופיע על גבי המזרק האוראלי המתאים למנה שנרשמה עבורה על ידי הרופא (איור 8). הבוכנה עלולה לחזור למעלה אל המזרק במנת הראשונה. לכן, ודאי כי הבוכנה מוחזקת במקומה עד שהמזרק האוראלי מתנתק מהבקבוק.




- הפור את הבקבוק כך שפתחו יהיה כלפי מעלה (איור 9).
- קח את המזרק האוראלי מעל פניו המתאם (איור 10).



- ישנן שתי דרכים לבחור מביניהן לשתיית התרכזה:
- רוקן את תוכן המזרק לתוך מים (או מיץ) ע"י דחיפת הבוכנה עד לתחתית המזרק האוראלי (איור 11) – לאחר מכן עליך לשותות את כל המים (הוסף רק מעט על מנת שייהי קל לשתו) **או**
  - לחילופין שתה את התמייסה ישירות מהמזרק האוראלי ללא מים – שתה את כל תוכנות המזרק (איור 12).



- סגור את הבקבוק באמצעות פקק ההברגה מפלסטיק (אין צורך בהסרת המתאם).
- לצורך ניקיון של המזרק האוראלי, שטוף במים קרים בלבד, והזז את הבוכנה מספר פעמים למעלה ולמטה כדי לשאוב ולפלוט את המים, מבליל להפריד את שני המרכיבים של המזרק (איור 13).



- שמור את הבקבוק, המזרק האוראלי ואת העלון באירועת הקרטון.

#### **משך הטיפול**

הטיפול בבריביאקט הינו ארוך-טוווי. המשך ליטול בריביאקט עד שהרופא יאמר לך להפסיק.

#### **אם נטלת בטיעות מינון גבואה יותר**

אם נטلت יותר וטר בבריביאקט מהנדרש, שוחח עם הרופא. אתה עלול לחוש מסוחרר וישנו. בנוסף, אתה עלול לחוות את התסמינים הבאים: בחילה, תחושת 'סחרור', בעיות בשמירה על שווי המשקל, חרדה, הרגשות עייפות רבה, עצבנות, אגרסיביות, קושי בשינה, דיכאון, מחשבות או ניסיונות לפגיעה עצמית או התאבדות.

אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בלבד מלבד התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

#### **אם שכחת ליטול בריביאקט**

- אם פספסת منها, קח את המנה מיד כשנזכרת.
- קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.
- אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצוץ על מנה שנשכחה.
- אם אין בטוח מה לעשות, שאל את הרופא או הרוקח.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

#### **אם אתה מפסיק את נטילת בריביאקט**

- אין להפסיק ליטול תרופה זו אלא אם הרופא הורה לך לעשות זאת. זאת מפני שהפסקת הטיפול עלולה להגביר את מספר ההתקפים שייהיו לך.
- אם הרופא יגיד לך להפסיק ליטול תרופה זו, הוא יוריד עבורך את המין בהדרגה. זה יסייע למניעת חזרת ההתקפים או החמרתם.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעע שעומן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זכוכית להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעץ לרופא או ברוקח.

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בבריביאקט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי, יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

יש לפנות לרופא מיד אם יש לך מחשבות או ניסיונות של פגיעה עצמית או התאבדות.

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common)** - תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה:

- תחושת ישנוויות או סחרחות

**תופעות לוואי שכיחות (common)** - תופעות שufigות ב-10-1 משתמשים מתוך 100:

- שפעת
- תחושת עייפות רבה
- פרכוס, תחושה של סחרחות סיבובית' (ורטיגו)
- בחילה והקאות, עצירות
- דיכאון, חרדה, קושי לשון (אינסומניה), רגונות
- זיהום של האף והגרון (לדוגמא הצטנות), שיעול
- ירידת בתיאבן

**תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon)** - תופעות שufigות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000:

- תגבות אלרגיות
- מחשבות מושנות /או איבוד קשר עם המציאות (הפרעה פסיכוטית), תוקפנות, עצבנות (אגיטציה)
- מחשבות או ניסיונות של פגיעה עצמית או התאבדות, ספר לרופא שלא מידית
- ירידת בתאי דם לבנים (הנקראת 'ניטרופניה') הנראית בבדיקות דם

#### **תופעות לוואי נוספת בילדים**

**תופעות לוואי שכיחות** (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 אנשים)

- אי שקט והיפראקטיביות (פעילות פסיקומוטורית מוגברת)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי  
שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי", שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>. בנוסף, ניתן לדוח באמצעות שליחת דוא"ל ליחידת בטיחות המטופלים של בעל הרישום: [drugsafety@neopharmgroup.com](mailto:drugsafety@neopharmgroup.com)

### **5. איך לאחסן את התרופה**

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי קופסת הקרטון והבקבוק. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

#### **תנאי אחסון**

- אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמר בטמפרטורת החדר.
- לאחרפתיחה הבקבוק לראשונה, **יש להשתמש תוך 5 חודשים**, ללא תנאי אחסון מיוחדים, מומלץ לשמר בטמפרטורת החדר.

אין להשליך תרופות לביב או לאשפָה הביתי. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה.

### **6. מידע נוסף**

#### **• נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:**

Sorbitol liquid, glycerol, sucralose, raspberry flavour 7557-A, carmellose sodium, sodium citrate, methyl parahydroxybenzoate, anhydrous citric acid, purified water.

- **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזיה**  
התמיישה הינה נזול מעט צמיגי, שקוֹף, חסר צבע עד צהבהב.

בקבוק הזוכנית של בריביאקט בעל נפח של 300 מ"ל ארוז בקופסת קרטון המכילה מזרק אוראלי בעל נפח של 10 מ"ל העשו מפוליפרופילן/פוליאתילן (שנתות בצבע שחור) ומזרק אוראלי בעל נפח של 5 מ"ל העשו מפוליפרופילן/פוליאתילן (שנתות בצבע כחול) ומתאימים עבור המזרקים העשויים מפוליאתילן.

**בעל הרישום:** ניאופרム בע"מ, רחוב השילוח 6, ת.ד. 7063, פתח תקווה 4951439.

**היצן:** י.ס.ו.ב. פארמה S.A., בריסל, בלגיה.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 159 93 35246

נערך במרץ 2024.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Briviant OS PIL vs 01A