

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"א - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אוטריין w/w	תמיסה לאף בתרסיס מודוד 0.1% w/w	אוטריין תמיסה לאף בטיפות 0.1% w/w
----------------	---------------------------------	--------------------------------------

חומר פעיל ורכיביו:
Xylometazoline Hydrochloride 0.1% w/w קסילומטАЗולין הידרוקלוריד 0.1% w/w

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – אני ראה סעיף 6 וסעיף 2 (מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה).
קרה בעיון את העלון עד סופו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת נספotta, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף מינון לעלון זה. היועץ ברוקח אם הנר זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותשミニ המחלה (סימפטומים) חממים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלת מהירה בגודש באך עד ל-10 שעות במבוגרים ומתבגרים מעל גיל 12 שנים.

קבוצה רפואייתו:

אוטריין מכילה קסילומטАЗולין הידרוקלוריד, הנמנה על קבוצת הסימפטומימטיים.
אוטריין מסיע בפתחה ופינוי של מעבר האף על ידי הפחתה של היוצרות נזלת עודפת והחזרה של כל הדם הנפוחים לגודלם המקורי.

2. לפני שימוש בתרופה אין להשתמש בתכשיר אם:

- אתה רגיס (אלרגי) לחומר הפעיל (קסילומטАЗולין הידרוקלוריד) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה – אני ראה סעיף 6.
 - הנר לאחר כריתת טרנס-ספנואידלית (דרך חלל האף) של בלוטת יותרת המוח או ניתוח שבמהלכו נחשף הקרום החיצוני במערכת העצבים המרכזית.
 - הנר סובל מגלאוקומה מסווג>Zווית צרה (narrow angle glaucoma).
 - הנר סובל מחלת קרוניית באף עם מעבר אף יבשים מאוד (atrophic rhinitis sicca) או
 - יש לך בלוטת ערכונית מוגדלת.
 - הנר סובל מגידול נדר ביותרת הכליה אשר מייצר אדרנלין ונוראדרנלין בעודף (pheochromocytoma).
 - הנר נוטל תרופות המעכבות את האנדומים מונואמין אוקסיאז (MAO inhibitors) או אם הפסיק ליטול אותו – 14 הימים האחרונים.
- אין להשתמש בתכשיר בילדים בני פחות מ-12 שנים.**

! אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני השימוש באוטריין ספר לרופא אם:

- הנר סובל מיתר לחץ דם
 - הנר סובל מחלת לב או כלי דם (לדוגמא: תסמנת QT מוארך)
 - הנר סובל מפעילות יתר של בלוטת התריס (היפרתרירואידיזם)
 - הנר סובל מסוכרת
 - הנר בהריון או מניקה
 - הנר נוטל תרופות נגד דיכאון מסווג טריציקליים וטטרחציקליים
- בדומה למפחית גודש אחרים, אוטריין עלול לגרום להפרעות בשינה, שחחרורת ורעד באנשים שמאוד רגישים לכך.
היועץ ברופא אם תסמים אלו מטרידים אותך.

אין לקחת מפחית גודש ליותר מ-3 ימים רצופים. נטילה ממושכת או עדפת עלולה לגרום לחזרה או להחמרה של הגודש. במידה והנر צריך אוטריין מעבר למשך הטיפול או המינון המומלצים, התיעץ עם הרופא או הרוקח.

! ילדים ומתבגרים:

אין להשתמש בתרופה בילדים מתחת לגיל 12 שנים.

! אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוחך, או אם לך תרופה אחרת כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוחך:
תרופות לטיפול בדיכאון מקבוצת מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAO) או תרופות אחרות לטיפול בדיכאון.

! הרין, הנקה ופוריות:
השימוש באוטריין אינו מומלץ אם הנר בהריין או מניקה. יש להתייעץ עם הרופא לפני השימוש באוטריין.

! נהיגה ושימוש במכוניות:
לאוטריין אין השפעה על יכולת הנהוג או להשתמש במכוניות.

! מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

הפורמוללה מכילה בנזילקוניאם כלוריד ברכוז השווה ערך ל- 0.1 mg/mL .
טריסים מודוז: 0.014 mg בהतזה אתחת.

טריפוט: 0.0025 mg בטיפה אתחת.
תרסיסים: לא ניתן לקבוע במידוקין כיון שהכחות תלויות באופן הלחיצה של המשתמש.

בנ扎ילקוניאם כלוריד עשוי לגרום לגירוי או לנפיחות באף, במיוחד אם נעשה בו שימוש לאורך זמן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיך.

המינון המקבול בדרך כלל הוא:

אוטריין טיפות:

למתבגרים מעל גיל 12 שנים ולמבוגרים:
3-2 טיפות בכל נחיר, כל 10-8 שעות, לפי הצורך. אין לטפטף טיפות יותר מ-3 פעמים ביוםמה בכל נחיר.

אוטריין טרסיס:

למתבגרים מעל גיל 12 שנים ולמבוגרים:
לחיצה אחת בכל נחיר, כל 10-8 שעות, לפי הצורך. אין לרטסס יותר מ-3 פעמים ביוםמה בכל נחיר.

אוטריין טרסיס מודוז:

למתבגרים מעל גיל 12 שנים ולמבוגרים:
לחיצה אחת בכל נחיר 3 פעמים ביוםמה לפי הצורך. אין לרטסס יותר מ-3 פעמים ביוםמה בכל נחיר.

אין לעבור על המגנה המומלצת.

משך הטיפול:

אין להשתמש בתרופה לעיתים קרובות או מעבר ל-3 ימים רצופים בלי להיוועץ ברופא. שימוש ממושך או מופרץ עלול לגרום להחמרה בגודש ולפגעה ברירית האף. אם הסימפטומים נמשכים, יש להתייעץ עם הרופא.

צורת הנטילה:
לא לבליה, תרופה זו מיועדת לשימוש באף בלבד.

אופן השימוש:

אוטריין טיפות:

- קנח את האף.
 - הטה את הראש לאחר (ראה איור א).
 - טפטף 2-3 טיפות לכל נחיר והמשך להטאות את ראשך למשך זמן קצר.
 - נקיה וייבש את הטפטפת בטרם החזרתה לבקבוק.
- על מנת למנוע את התפשטות הדיזומם, אריזה זו מיועדת לשימוש של אדם אחד בלבד.

אוטריין טרסיס:

- קנח את האף.
- רכון קדימה מעט והכנס את הפיה לתוך הנחיר (ראה איור ב).
- ליחס על הבקבוק פעם אחת ובו Zeitnah שאמינה פנימה בעדינות.
- הוציא את הפיה מהנחיר לפני שחרור הלחיצה מהבקבוק.
- חזר על הפעולות בנחיר השני.

על מנת למנוע את התפשטות הדיזהום, אריזה זו מיועדת לשימוש של אדם אחד בלבד.

אוטריין טרסיס מודוד:

- אין לגזר את הפיה (ראה איור ג'). הטרסיס המודוד מוקן להפעלה.
- קנה את אפר.
- הסר את המכסה המגן.

לפני השימוש הראשוני, לחץ 4 פעמים על המשאבה כדי להפעילה. לאחר הפעלת המשאבה, בדרך כלל תשאר המשאבה טעונה במהלך תקופות הטיפול היומיות. אם הטרסיס אינו ניתך לאחר לחיצה על המשאבה עד הסוף או אם הטרופה לא הינה בשימוש במשך יותר מ-7 ימים, יהיה צורך להפעיל את המשאבה מחדש. לחץ 4 פעמים על המשאבה, כפי שנעשה בהתחלה. היזהר מאד שלא לרסס לעיניים או לפה.

- החזק את הבקבוק ישר כאשר האגודל מתחת לבסיס הבקבוק והפיה בין 2 אצבעותיך.
- סופף את ראש מעת קדימה והכנס את הפיה לתוך הנחיר.

לחץ על המשאבה תוך כדי שאיפה דרך האף.
חוזר על הפעולות בנחיר השני.
מיד בתום השימוש, נkeh ויבש את הפיה בטרם ת恢זר את המכסה המגן.

על מנת למנוע את התפשטות הדיזהום, אריזה זו מיועדת לשימוש של אדם אחד בלבד.



אין לעבור על המנה המומלצת.

אם **נטלת בטיעות מינון גבוהה מדי**, הנר עלול הריגש סחרחות חמורה, הצעה, טמפרטורת גופו נמוכה, כאב ראש, קצב לב איטי, יתר לחץ דם, דיכוי נשימה, תרדמת ופרכוסים. יתר לחץ דם עלול להיות מלאה בירידה בלוץ הדם. ילדים קטנים רגישים יותר למיןיע עודף מבוגרים.

אם **נטلت בטיעות מינון גבוהה או אם בטיעות בעליל מין התרופה**, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת **לייטול תרופה** זו בזמן המיעוד, אין לייטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין **לייטול תרופות בחושך!** בדוק התווית והמנה בכל פעע שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. **תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש באוטריין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

הפסק את השימוש בתרופה ופנה מיד לרופא אם הנר חזה:

- תגובות אלרגיות, שיכולות לכלול קושי בנשימה או בבליעה, נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון, גרד חמור בעור המלווה בפריחה אדומה או בבליטות בעור

תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שימושicas ב-10-1 משתמשים מתוך 100:

- כאבי ראש
- יובש ברירית האף
- אי נוחות באף

- בחילוֹת
- גירוי מקומי לאחר השימוש בתרסיס

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות שמוועות ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000:

- דימום מהאף

תופעות לוואי נדירות מאד (very rare) - תופעות שמוועות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000:

- רגשות יתר לרובת גרד ופריחה
- הפרעות ראייה
- דפוקות לב (פליפיטזיות) וקצב לב מואץ
- דום נשימה בתינוקות צעירים וילדים

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- תחושת צריבה באף ובגרון

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואה חמלה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דוח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרכופה?

- מגן הרעלה! תרכופה זו וכל תרכופה אחרת יש לשמר במקומם סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
 - אין להשתמש בתרכופה אחרי תאריך התגובה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התגובה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון:**
יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-30°C, באזירה המקורית.

6. מידע נוספת

- **נוסך על החומר הפעיל בתרכופה מכילה גם:**
אוטריין טיפות, תרסיס ותרסיס מודוד:

Sorbitol 70% (non crystallising), Methylhydroxypropylcellulose 4000 mPa.s, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Sodium Chloride, Disodium phosphate dodecahydrate, Disodium edetate, Benzalkonium Chloride, Purified Water.

כיצד נראה התרכופה ומה תוכן האריזה:

- אוטריין טיפות, תרסיס ותרסיס מודוד הינם תמיישה צולולה המօיפה במספר צורות מותן:
טיפות לאף: תמיישה צולולה בבקבוק עם פקק טפי מובנה בנפח של 10 מ"ל.
תרסיס לאף: תמיישה צולולה בבקבוק פלסטיק לחץ, בנפח של 10 מ"ל.
תרסיס מודוד לאף: תמיישה צולולה בבקבוק עם משאבה משולבת למונת אחדה בכל לחיצה, בנפח של 10 מ"ל.

- **בעל הרישום וכותבותו:** הלאון סי.אי'ז' ישראל בע"מ, ת.ד. 3256, פתח תקווה.
- **שם הייצן וכותבותו:** הלאון סי.אי'ז' SARL, רוט דה אלאלטרז 1260, ניוון, שווז.

נערך במרץ 2024

מספר רישום התרכופה בפנקס התרכופות הממלכתי במשרד הבריאות:
אוטריין טיפות, תרסיס ותרסיס מודוד: 00-22229-115-43.

לשם הפשטוט ולחקלת הקရיה, עלון זה נגיש בלשון זכר. על אף זאת, התרכופה מיועדת לבני שני המינים.
סימני מסחר בעלות או בזכינות של HALEON © 2024.