

## פרוטופיק® 0.03% משחה

1 גרם של משחה מכיל טקרולימוס (כmonohydراט) [Tacrolimus (as monohydrate)] 0.3 מ"ג.  
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".  
קריאה בעין את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעבורי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

لتיפול באסתמה של העור (אטופיק דרמטייטיס) מתונה עד חמורה במוגרים או ילדים בני שנתיים ומעלה שאינם מגיבים במידה מספקת או שאינם סובלים טיפולים מקובלים.

למניעת התלקחות של אסתמה של העור (אטופיק דרמטייטיס) מתונה עד חמורה והארכת תקופות ההפוגה ללא התלקחות במטופלים הסובלים מתדיות גבואה של התלקחות המחלת (4) או יותר פעמיים בשנה) אשר הגיעו לטיפול ראשוני של שימוש בשחת טקרולימוס פעמיים ביום במשך 6 שבועות (פאעים נעלמו, כמעט נעלמו או שחליה הקלה מתונה).

**קבוצה רפואייתית:**  
immunomodulating agent – חומר המנסה את התגובה הלא תקינה של מערכת החיסון ומkek על גרד ודלקת בעור.

### 2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (טקרולימוס) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6), או לאנטיבוטיקה מקבוצת המקROLידים (כגון: איזיתרומיצין, קלריטרומיצין, אריתרומיצין).

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה  
**לפני הטיפול בפרוטופיק, ספר לרופא אם:**

- אתה סובל מאין ספיקת כבד.
- אתה סובל מגידולים ממאיירים בעור או אם אתה סובל **מערכת חיסונית מוחלשת** (מערכת חיסון מודכאת) מסיבה כלשה>.
- אתה סובל ממחלה עור תורשתית, כגון סינדרום נטרטן, או ממצב של lamellar ichthyosis (קילוף מגבר של העור כתוצאה מהתערבות שכבת העור החיצונית), או אם אתה סובל ממחלה עור דלקתית כמו פיזורמה גנגרנווזום, או אם אתה סובל **מאריתרודרומה** (עור מודלק, אדום וمتכלף).
- אתה סובל מ- Graft Versus Host Disease (TAGובה חיסונית של העור - סיבוך שכיח בחולים שעברו השתלת מה עצם).
- אתה סובל **קשרי למיפה נפוחים** בתחילת הטיפול. אם קשרי הלימפה מתנפחים תוך כדי הטיפול בפרוטופיק, עליך להיוועץ ברופא.
- אתה סובל **מנגעים מזוהמים**. אין למרוח את המשחה על נגעים מזוהמים.
- אתה מבחין בשינוי מראה העור שלך.

اذירות נוספת:

- על סמך תוצאות של מחקרים ארכיטווח וניסיוני, לא הוכח קשר בין טיפול בשחת **פרוטופיק** להתקפות גידולים ממאיירים, אך לא ניתן להסיק מסקנות חד משמעיות.
- יש להימנע מחשיפה ממושכת לשמש או לאור שמש מלאכותי כגון מיטות שיזוף. עליך לדאוג להגנה מתאיימה (בגדים ארוכים ורפויים, מסנני קריינה) אם אתה נמצא בחוץ לאחר מריחת **פרוטופיק**. בנוסף, היועץ ברופא לגבי אמצעים נוספים להגנה מפני השמש.

- אם אתה מטופל בפרוטופיק וועמד לעבר טיפול באור, יש להודיע על כך לרופא, לאחר טיפול בפרוטופיק במקביל לטיפול באור אין מומלץ.
- אם הרופא מנחה על המשך טיפול של פעמיים בשבוע על מנת לשמור את ההפגזה אטופיק דרמטייס, יש להמשיך במעקב רפואי בתדירות של לפחות כל 12 חודשים גם אם לא ניכר שינוי במצבם. בילדים, בתום 12 חודשים טיפול מניעתי בתרופה, יש להפסיק את הטיפול במשחה ולבחון את הצורך בהמשך הטיפול.
- מומלץ להשתמש במשחת פרוטופיק במינון ובתדריות הנומוכים ביותר ולמשך הזמן הקצר ביותר הנדרשים. החלטה זו צריכה להתבסס על הערכת הרופא כיצד האקזמה מגיבה למשחת פרוטופיק.

#### **ילדים**

- **פרוטופיק 0.03%** אינה מאושרת **ילדים מתחת לגיל שנתיים**, על כן אין להשתמש בתכשיר בקבוצת גיל זו. יש להיעזר ברופא.
- השפעת הטיפול בפרוטופיק על מערכת החיסון המתפתחת בילדים, במיוחד בילדים צעירים, אינה ידועה.

**תגובהות בין תרופתיות**  
אם אתה לוקח, אם לך חות לאחרונה, או אם אתה עשוי לקחת, **תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

- ניתן להשתמש בקרמי לחות וחליבי לחות בתקופת השימוש בפרוטופיק, אך אין להשתמש במוצרים אלה בטוחו של שעתים מרבית המשחה.
- אין מידע לגבי שימוש בפרוטופיק במקביל לתכשירים אחרים לשימוש על גבי העור, או במקביל לניטילת קורטיקויסטרואידים (כגון קורטיזון) דרך הפה, או תרופות המשפיעות על מערכת החיסון.

**שימוש בפרוטופיק וצירכת אלכוהול**  
שתיית אלכוהול בתקופת הטיפול עם התרופה עלולה לגרום להסמה או לאודם ותחושת חום בעור או בפנים.

**הירין והנקה**  
אם את בהירין או מניקה, חושבת שתאת עשויה להיות בהירין או מתכנתה להיכנס להירין, הייעוץ ברופא או רוקח לפני השימוש בתרופה זו.

**נהיגה ושימוש במכונות**  
לא צפואה פגעה בכושר הנהיגה או הפעלת מכונות בזמן השימוש בתרופה זו.

**מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**  
התרופה מכילה בוטילידרוקסיטולואן [E321] hydroxytoluene, שועלן לגרום לתגובה עור מקומית [למשל דלקת עור מוגע - (contact dermatitis)] או גירוי בעיניים וברקמות ריריות.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

תמיד יש להשתמש בתרופה לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.  
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קבועים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. אופן השימוש המקובל בדרך כלל הוא כדלקמן:

#### **כללי**

- יש למרוח שכבת פרוטופיק דקה על האזוריים הנגועים בעור.
- ניתן למרוח פרוטופיק על מרבית חלקי הגוף, כולל הפנים והצוואר, בקפל המרפף והברכיים.
- יש להימנע מריחת המשחה בתוך האף, הפה או העיניים. אם המשחה באה בגע עם אזוריים אלה יש לנגב היפב / או לשטוף במים.
- אין לכוסות או לעטוף את העור המטופל בתחבושים או בכיסויים.
- יש לשטוף את הידיים אחרי המריחה אלא אם כן הידיים שלך נמצאות גם תחת טיפול.
- יש לוודא שהעור יבש לगמרי טרם מריחת פרוטופיק לאחר מקלחת.

#### **ילדים ( מגיל שנתיים ומעלה )**

יש למראה **פרוטופיק 0.03%** פעמיים ביום, בוקר וערב, לתקופה של עד שלושה שבועות. לאחר מכן יש למראה פעם ביום על כל אזור נגוע בעור עד שהاكזמה תחלוף.

#### מבוגרים (מגיל 16 שנים ומעלה)

ק"י מים שני חזקים של **פרוטופיק** (משחת **פרוטופיק 0.03%** ו**פרוטופיק 0.1%**) והם זמינים לשימוש עבור מבוגרים (16 שנים ומעלה). הרופא יחייב לגבי החזק המתאים לר.

בדרכו כלל הטיפול בפרוטופיק 0.1% מתחילה במינון של פעמיים ביום, בוקר וערב, עד להיעלמות האקזמה. בהסתמך על תגובהת האקזמה לטיפול, הרופא יחייב באמ' היה צריך להוריד לר את תדרות המינון או עבריר יותר לחזק הנמור יותר, דהיינו **פרוטופיק 0.03%**.

יש לטפל בכל אזור העור הנגועים, עד להיעלמותה של האקזמה. ניתן להבחן בשיפור בתוך שבוע אחד של טיפול. אם אין שיפור לאחר שבועיים, עליך להיוועץ ברופא לגבי טיפולים אחרים.

הרופא עשוי להורות לך להמשיך ולמרא **פרוטופיק פעמיים בשבוע** לאחר היעלמותה מלאה או כמעט מלאה של אטופיק דרמטייטיס (**פרוטופיק 0.03%** מתאים לילדים ולמבוגרים ופרוטופיק 0.1% למבוגרים). יש למראה **פרוטופיק** פעם ביום בתדרות של פעמיים בשבוע על אזור הגוף הנגועים באטופיק דרמטייטיס. יש להקפיד ולהשאיר מרוח של 2-3 ימים לפחות **פרוטופיק**, בין טיפולים, בין הטיפולים. אם התס敏יניות חוזרת, עליך להשתמש **פרוטופיק** פעמיים ביום כפי ש蹶רט מעלה, ולפנות לרופא לצורך הערכה חוזרת של הטיפול.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אין לבളוי! התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

במקרה של בליה בטיעות או אם בטיעות בעלILD מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים ולהביא את אריזת התרופה. אין לנסות ולגרום להתקאה.

אם שכחת להשתמש **במשחה זו בזמן שנكبעה**, יש להמשיך בטיפול כרגיל, אך אין למראה כמות כפולה כפיצו.

יש להתמיד בטיפול **כפי שהומלץ על ידי הרופא**, גם אם חל שיפור במצב בריאותך. אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או ברוקח.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם אתה **זקוק להם**.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, **היועץ ברופא או ברוקח**.

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש **בפרוטופיק** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביורר משתמש אחד מעשרה):

- תחושת שריפה וגרד.
- תופעות אלו הן בדרך כלל קלות עד בינויות וככללו חולפות תוך שבוע מתחילה הטיפול **בפרוטופיק**.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100):

- אדיםומיות, הרגשות חום, כאב, רגשות מגברת בעור (במיוחד לחום ולקרור), עקצוץ בעור, פריחה
- זיהום מקומי בעור (מסיבה כלשהי) הכול, אך לא מוגבל לכך: דלקת או זיהום זקיין שיער, פצעי קור,
- זיהומים ויראליים הנגרמים מנגיף הרפס
- סומך בפנים או גירוי בעור לאחר שתית אלכוהול

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- אקנה

קיימים דיווחים על זיהומים במקומות המריחה בקרוב ילדים ומבוגרים בעקבות טיפול של פעמים בשבוע. בילדים קיימים דיווחים על אימפטיגו (impetigo) - זיהום חידקי שטחי הגורם לשלפוחיות או פצעים בעור).

ישנם דיווחים על רוזיצאה (Rosacea) - אדמומיות עור הפנים), דרמטיטיס הדומה לרוזיצאה, כתמים שטוחיםocabus chom על העור (Lentigo), בזקת במקומות המריחה וזיהומי הרופס בעיניים.

אם הופעה תופעת לואו, אם אחת מתופעות הלואו מחייבת, או כאשר אתה סובל מתופעת לואו שלא צינהavelon, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לואו למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "DIVOC על תופעות לואו" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המukan לדוח על תופעות לואו, או על ידי כניסה לקישור:  
<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- منع הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי קר תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל-25°C.
- אין להשליך תרופות לביב או לפח אשפה בית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלה יסייעו להגן על הסביבה.

## 6. מידע נוספת

### נוסך על החומר הפעיל בתרופה מכילה גם:

White soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin, butylhydroxytoluene (E321), all-rac- $\alpha$ -tocopherol.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה  
שפופרת מכילה משחה בצלע לבן עד צהוב בהיר.  
גודלי אריזה מאושרים: 30 - 60 גרם באריזה.  
יתכן שלא כל גודלי האריזה משווים.

**שם הייצור וכתובתו:**  
לאו פארמה S/A, באלווף, דנמרק.

נערך במרץ 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי** במשרד הבריאות:  
127-71-30667-00

לשם הפשטות ולהקלת הקירה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**בעל רישום:** דקסל בע"מ  
רחוב דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל