

מרץ 2024

Protopic 0.03%, Ointment

צוות רפואי נכבד,

חברת דקסל בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון העלונים לרופא ולצרן של התכשיר **פרוטופיק 0.03%**.

בהודעה זו מפורטים העדכנים המהותיים בלבד. למידע מלא, יש לעיין בעלונים.

העלונים לרופא ולצרן נשלחו לפרטום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפס ע"י פניה לבעל הרישום:
dexel בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל, טל': 04-6364000.

הרכב התכשיר:

0.3 g of Protopic 0.03% ointment contains 0.3 mg of tacrolimus as tacrolimus monohydrate (0.03%).

התווויות המאושרות:

Treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adults who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies.

Treatment of moderate to severe atopic dermatitis in children (2 years of age and above) who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies.

Maintenance treatment of moderate to severe atopic dermatitis for the prevention of flares and the prolongation of flare-free intervals in patients experiencing a high frequency of disease exacerbations (i.e. occurring 4 or more times per year) who have had an initial response to a maximum of 6 weeks treatment of twice daily tacrolimus ointment (lesions cleared, almost cleared or mildly affected).

העלון לרופא עודכן בספטמבר 2023. להלן העדכנים המהותיים (מוסמן באדום)

4.4 Special warnings and precautions for use

The use of tacrolimus ointment is not recommended in patients with a skin barrier defect, such as Netherton's syndrome, lamellar ichthyosis, generalized erythroderma, **pyoderma gangrenosum** or cutaneous Graft Versus Host Disease.

העלון לצרן עודכן במרץ 2024. להלן העדכנים המהותיים (מוסמן באדום)

2. לפני השימוש בתרופה

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בפרוטופיק, ספר לרופא אם:

- אתה סובל ממחלה עור תורשתית, כגון סינדרום נטרטן, או מצב של lamellar ichthyosis (קילוף מגבר של העור כתוצאה מהתערבות שכבת העור החיצונית), או אם אתה סובל **מחלות עור דלקטיבים כמו פיאדרמה גנגרנוזום**, או אם אתה סובל **מאריתודרומה** (עור מודלק, אדום ומתקלף).