

**עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986**  
התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

**אוטריין לילדים % 0.05% w/v  
תמייסה לאף בטיפות תמייסה לאף בתרסיס מודוד**

חומר פעיל

קסילומטזולין הידרוקלוריד 0.05% w/v Xylometazoline Hydrochloride 0.05% w/v

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6 וסעיף 2 תחת הכותרת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתית על התרופה.  
אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך לשימוש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוווץ ברוקח אם הנrk זוקן למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה וטסמיini המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

**1. למה מיועדת התרופה?**

להקלת מהיריה עד 10 דקות של גודש באף בילדים בני 12-2 שנים.

קבוצת רפואיים: סימפטומימטיים.

**פעילות רפואיית:**  
קסילומטזולין מכואץ כלפי דם ובכך מפחית את הנפיחות בקרום הריר.

**2. לפני השימוש בתרופה  
אין לשימוש בתרופה:**

- אם אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- לאחר כריתת טרנס-ספנואידלית (דרך חלל האף) של בלוטת יותרת המוח או ניתוח דרך הפה או האף שבמהלכו נחשף הקروم החיצוני במערכות העצבים המרכזית.
- הנrk סובל מגלאוקומה מסווג זוויות צרה (narrow angle glaucoma).
- הנrk סובל מדלקת קרונית באף עם מעבריו אף יבשים מאד (rhinitis sicca or atrophic rhinitis).
- ילך מתחת לגיל שנתיים.

**! אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

בדומה לנוגדי גודש אחרים אוטריין ילדים עלול לגרום לביעות בשינה, סחרחוורת, רעד, הפרעות בקצב הלב או עליה בלחץ הדם במטופלים רגשים במיוחד.

**לפני הטיפול באוטריין לילדים, ספר לרופא אם הנrk/ילדך:**

- סובל מיתר לחץ דם.
- סובל מחלות לב וכלי דם.
- סובל מביעות לב (לדוגמא תסמנת מקטע QT מוארך).
- סובל מפעילות יתר של בלוטת התריס
- סובל מסוכרת

- סובל מגידול נדי בבלוטת יותרת הכליה שמייצר רמות גבוהות של אדרנליין ונווראדרנליין (פואקורומוציטומה)
- סובל נבלות ערמוניות מוגדלות
- נוטל תרופות לטיפול בדיכאון כגון:
- תרופות המעכבות את האנזים מונואמין אוקסידאז (MAO) המשמשות לטיפול בדיכאון או אם הפסיק ליטול אותו ב-14 הימים הבאים.
- נוגדי דיכאון טריציקליים וטראציקליים

#### **! ילדים ומתבגרים**

אין להשתמש באוטריין ילדים בילדים מתחת לגיל שנתיים. בילדים בגיל שנתיים עד 12 שנים, יש להשתמש באוטריין ילדים תחת השגחת מבוגר.

#### **! משך טיפול**

בדומה לנוגדי גודש אחרים, אין להשתמש באוטריין לילדים מעבר ל-3 ימים ברציפות. אם התסמינים אינם חולפים, היועץ ברופא. שימוש ממושך או עודף עלול לגרום לנפיחות קרונית (Rhinitis medicamentosa) ו/או ניון של רקמת רירית האף.

#### **! אינטראקציות/תגובה בין תרופתיות:**

- אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרופק. במיוחד אם אתה לוקח:
- תרופות נגד דיכאון כגון מעכבי האנזים מונואמין אוקסידאז (MAO) או מקבוצת טריציקליים או טראציקליים שימוש ביחיד של תרופות אלו ואוטריין ילדים יכול להוביל לעלייה בלחץ הדם עקב השפעה כל תפקוד הלב ומערכת הדם.

#### **! הריאן, הנקה ופוריות**

המוצר מיועד לשימוש בילדים.

אם הנר בהריון או מניקה, חושבת שהנر בהריון או מתכנתה להיכנס להריון, היועצי ברופא או ברוקח לפני השימוש באוטריין לילדים.

#### **! הריאן**

השימוש באוטריין לילדים אינו מומלץ במהלך הריאן.

**! הנקה**  
אין להשתמש באוטריין ילדים במהלך הנקה, כיוון שלא ידוע אם החומר הפעיל מופרש לחלב האם.

**! פוריות**  
אין מידע על השפעת אוטריין לילדים על פוריות. אין מחקרים זמינים על בעלי חיים.

**! נהיגה ושימוש במכוניות:**  
אוטריין לילדים מיועד לשימוש בילדים. לאוטריין לילדים אין השפעה על שימוש במכוניות.

**! מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**  
הפורמוללה מכילה בנזלקוניום קלורייד ברכישת השווה ערך ל-0.1 מ"ג/מ"ל.

- תרסיס מדוד: 0.007 מ"ג בהतזה אחת.
- טיפות: 0.0025 מ"ג בטיפה אחת.  
בNazalekoniom קלורייד עלול לגרום לגירוי או לנפיחות בחולל האף, במיוחד בשימוש ממושך.

#### **3. כיצד השתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.  
המינון המקביל בדרך כלל הוא:

ליילדים בגיל 2-12: 3-2 טיפות או ריסוס אחד בכל נחיר, כל 8-10 דקות. תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולתינוקות מתחת לגיל שנתיים, אלא בהמלצת רופא ותחת השגחתו.

#### אין לעבר על המנה המומלצת.

##### marsh tipol

אין להשתמש באוטריון לילדים מעבר ל-3 ימים ברציפות.

##### אוף השימוש:

לשימוש באף

##### טיפות אף:

1. קנה את אפו של הילד בטרם השימוש באוטריון לילדים.
2. בטרם השימוש הcn את הטפפטת על מנת להשיג פיזור אחיד של המינון.
3. השען קלות את ראשו של ילך לאחר, בטיפר בזיהירות רבה את אוטריון לילדים לנוח.
4. מבלי לגעת עם הטפפטת באפו של ילך, בטיפר לאחר שعون לאחר בmarsh מספר דקות על מנת לאפשר של ילך. השאר את הראש של ילך שウン לאחר בmarsh מספר דקות על מנת לאפשר לטיפות להיספג באף. (ראה איור א)



איור א

5. אם הטיפה אינה מגיעה לתוך הנחיר של ילך, השתמש בטיפה נוספת.
6. אין לטפוף טיפה נוספת במקרה שהחלק מהטיפה נכנס לתוך הנחיר של ילך.
7. חזר על הפעולות בנחיר השני.
8. נקה את הטפפטת בטרם החזרתה לבקבוק בתום השימוש.
9. על מנת למנוע את התפשטות הדיזהום, אריזה זו מיועדת לשימוש של אדם אחד בלבד.

##### תרטיס מודד לאף:

יש להחזיק את אריזת התרטיס כשהפיה פונה כלפי מעלה כדי שההתמיסה תשחרר בצורה מיטבית. היזהר מאוד שלא להתייז לעיניים ומסביב לעיניים. הסר את המכסה המגן. אין לגזר את הפיה (ראה איור ב). התרטיס המודד מוכן להפעלה.



איור ב

לפני השימוש הראשוני, לחץ 4 פעמיים על המשאבה בכדי להפעילה. לאחר הפעלת המשאבה, בדרך כלל תשאר המשאבה טעונה במהלך תקופות הטיפול היומיות. אם התרטיס אינו ניתן לאחר לחיצה על המשאבה עד הסוף או אם התרפופה לא הייתה בשימוש במשך יותר מ-7 ימים, יהיה צורך להפעיל את המשאבה מחדש. לחץ 2 פעמיים על המשאבה, כפי שנעשה בהתאם.

היזהר שלא לרסס לעיניים.

1. קנה את אפו של הילד בטרם השימוש
2. החזק את הבקבוק ישר כאשר האגדול מתחת לבסיס הבקבוק והפיה בין 2 אצבעותיך. (ראה איור ג)



איור ג

3. קופף את ראשו של הילד מעט קדימה והכנס את הפיה לתוך הנחיר.
4. לחץ על המשאבה ובקש מהילד לשאוף בעדינות דרך האף בזמן הלחיצה. (ראה איור ד)



איור ד

5. חוזר על הפעולות בנחיר השני.
6. מיד בתום השימוש, נקה וייבש את הפיה בטרם תחזיר את המכסה המגן. אם אפשר, יש להשתמש במנת האחורה של היום קרוב ככל הניתן לזמן השינה. מסיבות היגייניות ועל מנת למנוע את התפשטות הדיזוזם, ארזה זו מיועדת לשימוש של אדם אחד בלבד.

**אם נטלה בטיעות מיןון גבואה יותר של אוטריין לילדיים** התמונה הקלינית בעקבות נטילת מיןון יתר יכולה להיות מבלבלת שכן שלבי גירוי מערכת העצבים ומערכת הלב וכל הדם יכולים להתחלף בשלבי דיכוי. תסמינים של גירוי מערכת העצבים כוללים חרדה, אי-שקט, הדיזות ופרכוסים. תסמיini דיכוי של מערכת העצבים כוללים ירידה בחום הגוף, תשישות, נמנום ותרדמת. יתכן גם התסמיינים הבאים: כיווץ איסווזונים (miosis), הרחבת איסווזונים (mydriasis), החעת יתר, חום, חיוורון, הופעת צבע כהה בעורק ירידה בכמות החמוץ בדם (כיחלון), בחילה, קצב לב לא סדיר, קצב לב מהיר או איטי מדי, דפיקות לב (פלפיטציות), דום לב, עלייה או ירידה בלחץ הדם, בזקת ריאות, דיכוי נשימה, דום נשימה בשינה. ביחס בילדים, מיןון יתר מוביל לעיתים קרובות להשפעות על מערכת העצבים כגון פרכוסים ותרדמת, קצב לב נמוך, דום נשימה בשינה ועליה בלחץ הדם שאחריה עלולה להיות ירידה בלחץ הדם.

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעלILD מיןון התראפה, פנה מיד לרופא או לחדר המיןון של בית החולים והבא את אריזות התראפה איתך, היות וידרשו השגחה וטיפול בבית החולים.

**אם שכחת ליטול התראפה אין לקחת מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה.**

**אין ליטול תרופה בחושך!** בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זוקק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.**

**4. תופעות לוואי:** כמו בכל תרופה, השימוש באוטריין לילדיים עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשיימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהם.

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שימושיות ב-10-1 משתמשים מתוך 100:

- כאבי ראש
- יבש בריריות האף
- אי נוחות באף
- התעטשות
- בחילה
- תחושת צריבה באף או בגרון

תופעות לוואי שאינן שכיחות (common) תופעות שמאופיינות ב 10-1 מעתמשים מ�� 1,000,000

- דימום מהאף
- בסיום ההשפעה, תחושה מוגברת של גודש באף.

תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שמאופיינות ב 1-10 מעתמשים מ�� 10,000

- דפיקות לב (פלפיטזיות)
- קצב לב מוגבר
- לחץ דם מוגבר

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) – תופעות שמאופיינות בפחות מעתמש אחד מ�� 10,000:

- רגישות יתר (נפיחות בעור או ברקמות הריריות, פריחה בעור, גרד)
- אי שקט
- נזודין שינה
- עייפות (نمנים, ישננות)
- הדיזות (ביחוד ילדים)
- הפרעות חולפות בראשיה
- קצב לב לא סדרי או מוגבר
- דום נשימה בשינה בתינוקות צעירים וילודים
- פרכוסים (ביחוד ילדים)

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חממירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך הת滂ואה (exp. date) המופיע על גבי הארזה. תאריך הת滂ואה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

### תנאי אחסון:

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-30°C, באזיה המקורית.

## 6. מידע נוסף

### \* נסוף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

אוטריולן לילדים טיפול, ותרסיס מודז:

Sorbitol 70% (non crystallizing), Methylhydroxypropylcellulose 4000 mPa.s,  
Sodium Dihydrogen Phosphate dihydrate, Sodium Chloride, Disodium phosphate dodecahydrate, Disodium edetate, Benzalkonium Chloride, Purified Water.

- **כיצד נראה תרופה ומה תוכן האזינה:**  
אוטריין לילדים טיפול ותרסיס מודוד הינט תמיisha צלולה המופיעה במספר צורות מתן:  
טיפולות לאף: תמיisha צלולה בבקבוק עם פגק טפי מובנה בנפח של 10 מ"ל.  
תרסיס מודוד לאף: תמיisha צלולה בבקבוק עם משאבה מושלבת למנה איחידה בכל לחיצה,  
בנפח של 10 מ"ל.
- **בעל הרישום וכותבותו:** הלאון ס. אייז. בע"מ, ת.ד. 3256, פתח תקווה.
- **שם היצרן וכותבותו:** הלאון SARL רוט דה אלאטראז 1260, ניון שוויץ.

נערך במרץ 2024.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**  
108-21-23658-00

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני  
המינים.  
סימני מסחר הינט בבעלות או בזכינות של NILEON HALEON © 2024 או הזכיין.