

לוג'וקסטה 5 מ"ג לוג'וקסטה 10 מ"ג לוג'וקסטה 20 מ"ג

כמוסות קשות

חומר פעיל:

כל כמוסה של לוג'וקסטה 5 מ"ג מכילה: 5 מ"ג לומיטאפיד (כ-מסילאט), Lomitapide (As Mesilate) 5 mg
כל כמוסה של לוג'וקסטה 10 מ"ג מכילה: 10 מ"ג לומיטאפיד (כ-מסילאט), Lomitapide (As Mesilate) 10 mg
כל כמוסה של לוג'וקסטה 20 מ"ג מכילה: 20 מ"ג לומיטאפיד (כ-מסילאט), Lomitapide (As Mesilate) 20 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2: "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לוג'וקסטה משמשת כתוספת לדיאטה דלת שומן ולטיפולים אחרים להפחתת שומנים בדם, כולל אפרזיס ל-LDL, בחולים עם היפרכולסטרולמיה משפחתית הומוזיגוטית (HoFH) לשם הורדת: כולסטרול מסוג LDL ("כולסטרול רע") כולסטרול כללי (TC) אפוליפופרוטאין B כולסטרול non-HDL

קבוצה תרפויטית:

משפחת חומרים המווסתים שומנים בדם.

לוג'וקסטה מכילה את החומר הפעיל שנקרא לומיטאפיד הפועל על ידי חסימת הפעולה של "חלבון העברת טריגליצרידים מיקרוזומלי". חלבון זה ממוקם בכבד ובתאי המעי, שם הוא מעורב בהרכבת חומרים שומניים לחלקיקים גדולים יותר שמשחררים לאחר מכן לזרם הדם. על ידי חסימת חלבון זה, התרופה מורידה את רמת השומנים והכולסטרול בדם.

2. לפני השימוש בתרופה

X אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (לומיטאפיד) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6- "מידע נוסף")
- יש לך בעיות בכבד או בדיקות כבד חריגות שאינן מוסברות
- יש לך בעיות במעיים או שיש לך בעיה בספיגת המזון במעיים
- אתה נוטל יותר מ-40 מ"ג סימבסטטין מדי יום (תרופה נוספת המשמשת להורדת כולסטרול)
- אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות המשפיעות על האופן שבו לומיטאפיד מתפרק בגוף:
 - איטראקונאזול, קטוקונאזול, פלוקונאזול, ווריקונאזול, פוסאקונאזול (לזיהומים פטרייתיים)
 - תליתרומיצין, קלריתרומיצין, אריתרומיצין (לזיהומים חיידקיים)
 - אינדינאביר, נלפינאביר, סאקווינאביר, ריטונביר (לזיהום HIV)
 - דילטיאזם, וראפאמיל (ליתר לחץ דם או תעוקת חזה), דרונדרון (לוויסות קצב הלב)
 - את בהיריון, מנסה להיכנס להיריון או חושבת שאת בהיריון (ראי סעיף 2 "היריון והנקה")

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בלוג'וקסטה, ספר לרופא אם:

- סבלת מבעיות בכבד, כולל בעיות בכבד בזמן נטילת תרופות אחרות. כמוסות אלו עלולות לגרום לתופעות לוואי שיכולות להיות גם תסמינים של בעיות בכבד. תופעות הלוואי האלו מפורטות בסעיף 4 ועליך לספר לרופא מיד אם יש לך אחד מהסימנים והתסמינים הללו, מכיון שהם עלולים להיגרם מנזק לכבד. הרופא שלך יפנה אותך לבדיקות דם כדי לבדוק את הכבד שלך לפני שתתחיל ליטול כמוסות אלה, אם המינון שלך גדל, ובאופן קבוע במהלך הטיפול. בדיקות דם אלו יעזרו לרופא להתאים את המינון. אם הבדיקות שלך מראות סימנים של בעיות בכבד, הרופא שלך עשוי להחליט להפחית את המינון או להפסיק את הטיפול.

ייתכן שבמקרים מסוימים תחווה אובדן נוזלים/התייבשות, למשל, במקרה של הקאות, בחילות ושלשולים. חשוב להימנע מהתייבשות על ידי שתיית נוזלים מספקת (ראה סעיף 4).

ילדים ומתבגרים:

לא קיים מידע לגבי בטיחות ועילות השימוש בתכשיר זה בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18. לכן השימוש בילדים ומתבגרים אינו מומלץ.

בדיקות ומעקב:

יש לבצע בדיקות דם לפני התחלת הטיפול בלוג'וקסטה, אם המינון שלך גדל, ובאופן קבוע במהלך הטיפול. בדיקות דם אלו יעזרו לרופא להתאים את המינון. אם הבדיקות שלך מראות סימנים של בעיות בכבד, הרופא שלך עשוי להחליט להפחית את המינון או להפסיק את הטיפול.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

תרופות אחרות עשויות להשפיע על אופן הפעילות של לוג'וקסטה. אין ליטול אף אחת מהתרופות הבאות עם לוג'וקסטה:

- תרופות מסוימות לטיפול בזיהומים חיידקיים, פטרייתיים או זיהום HIV (ראה סעיף 2: "אין להשתמש בתרופה אם")
- תרופות מסוימות לטיפול ביתר לחץ דם, תעוקת חזה או לווטיות קצב הלב (ראה סעיף 2: "אין להשתמש בתרופה אם")

כמו כן, עליך לספר לרופא או לרוקח אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות, שכן ייתכן שיהיה צורך לשנות את המינון של לוג'וקסטה:

- תרופות להורדת כולסטרול (כגון אטורבסטאטין)
- גלולות למניעת היריון (כגון אתיניל אסטרדיול, נורגסטימט)
- גלוקוקורטיקואידים (כגון בקלומתאזון, פרדניזולון) תרופות סטרואידיות המשמשות לטיפול בדלקת במצבים כגון אסתמה קשה, דלקת מפרקים (ארתריטיס)
- תרופות לטיפול בסרטן (כגון ביקאלוטאמיד, לפטיניב, מתוטרקסאט, נילוטניב, פזופניב, טמוקסיפן) או בחילות/הקאות עם טיפול בסרטן (כגון פוספרפיטנט)
- תרופות להפחתת פעילות מערכת החיסון (כגון ציקלוספורין, טאקרולימוס)
- תרופות לטיפול בזיהומים חיידקיים או פטרייתיים (כגון נפצילין, אזיתרומיצין, רוקסיתרומיצין, קלוטרימאזול)
- תרופות לטיפול ומניעת קרישי דם (כגון צילוסטאזול, טיקגרלור)
- תרופות לטיפול בתעוקת חזה - כאבים בחזה הנגרמים על ידי הלב (כגון רנוליזין)
- תרופות להורדת לחץ דם (כגון אמלודיפין, לצידיפין)
- תרופות לווטיות קצב הלב (כגון אמידארון)
- תרופות לטיפול באפילפסיה (כגון פנובארביטאל, קארבאמאזפין, פניטואין)
- תרופות לטיפול בסוכרת (כגון פיוגליטאזון, לינגליפטין)
- תרופות לטיפול בשחפת (כגון איזוניאזיד, ריפאמפיצין)
- אנטיביוטיקה טטראציקלין לטיפול בזיהומים כגון דלקות בדרכי השתן
- תרופות לטיפול בהפרעות חרדה ודיכאון (כגון אלפראזולאם, פלואוקסטין, פלובוקסאמין)
- נוגדי חומצה (כגון ראניטידין, סימטידין)

- אמינוגלוטאמיד - תרופה המשמשת לטיפול בתסמונת קושינג
- תרופות לטיפול באקנה חמורה (כגון איזוטרטינואין)
- פרצטמול – לטיפול בכאב
- תרופות לטיפול בסיסטיק פיברוזיס (כגון איואקפטור)
- תרופות לטיפול בבריחת שתן (כגון פרופיברין)
- תרופות לטיפול ברמות נמוכות של נתרן בדם (כגון טולבפטן)
- תרופות לטיפול בישנוניות מוגזמת בשעות היום (כגון מודפיניל)
- תרופות צמחיות מסוימות:
 - סנט ג'ון וורט (לטיפול בדיכאון)
 - גינקו (לשיפור הזיכרון)
 - חותם זהב Goldenseal (לטיפול בדלקות וזיהומים)

לוג'קסטה עשויה להשפיע על אופן הפעולה של תרופות אחרות. ספר לרופא או לרוקח אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:

- גלולות למניעת היריון (ראה סעיף 2: "היריון והנקה")
- תרופות אחרות המשמשות להורדת כולסטרול כגון:
 - סטטינים כגון סימבסטטין. הסיכון לנזק כבד גדל כאשר משתמשים בתרופה זו במקביל לסטטינים. כאבי שרירים (מיאלגיה) או חולשה (מיופתיה) עשויים להתרחש. **פנה לרופא מיד אם אתה חווה כאבי שרירים בלתי מוסברים, רגישות או חולשה.** אין ליטול יותר מ-40 מ"ג סימבסטטין בעת השימוש בלוג'קסטה (ראה סעיף 2: "אין להשתמש בתרופה אם")
- נוגדי קרישה של קומריין לדילול הדם (כגון וארפרין)
- תרופות לטיפול בסרטן (כגון אברולימוס, אימטיניב, לפטיניב, נילוטיניב, טופוטקאן)
- תרופות להפחתת פעילות המערכת החיסונית (כגון סירולימוס)
- תרופות לטיפול ב-HIV (כגון מאראבירוק)
- תרופות לטיפול ומניעת קרישי דם (כגון דביגטרן אטקסילאט)
- תרופות לטיפול בתעוקת חזה - כאבים בחזה הנגרמים על ידי הלב (כגון רנולזין)
- תרופות להורדת לחץ הדם (כגון טלינולול, אליסקירן ואמבריסנטן)
- תרופות לוויסות קצב הלב (כגון דיגוקסין)
- תקופות לטיפול בסוכרת (כגון סקסגליפטין, סיטגליפטין)
- תרופות לטיפול בגאוסט (כגון קולכיצין)
- תרופות לטיפול ברמת נתרן נמוכה בדם (כגון טולבפטן)
- תרופות אנטי היסטמיניות לטיפול בקדחת השחת (כגון פקסופנאדין)

• אין להשתמש בתרופה אם אתה נוטל תרופות המעכבות CYP3A4 (תרופות לטיפול בזיהומים בקטריאלים, פטרייתיים או ויראליים ותרופות לטיפול בדיכאון, לחץ דם גבוה או אנגינה (תעוקת חזה)).

שימוש בתרופה עם מזון, שתייה ואלכוהול

- אין לשתות כל סוג של מיץ אשכוליות.
- השימוש באלכוהול במהלך הטיפול בלוג'קסטה אינו מומלץ.
- ייתכן שיהיה צורך להתאים את המינון של לוג'קסטה אם אתה צורך שמן מנטה או תפוזי סביליה.
- כדי להפחית את הסיכוי לבעיות בקיבה, עלייך לשמור על דיאטה דלת שומן בזמן נטילת התרופה. התייעץ עם דיאטנית על מנת ללמוד מה אתה יכול לאכול בזמן נטילת לוג'קסטה.

היריון והנקה

אין ליטול תרופה זו אם את בהיריון, מנסה להיכנס להיריון או חושבת שאת בהיריון, מכיוון שישנה אפשרות שהיא עלולה להזיק לעובר. אם נכנסת להיריון במהלך הטיפול בתרופה, התקשרי לרופא מיד והפסיקי ליטול את הכמוסות.

היריון

- לפני התחלת הטיפול עלייך לאשר שאינך בהיריון ומשתמשת באמצעי מניעה יעילים, לפי המלצת הרופא. אם את משתמשת בגלולות למניעת היריון וסובלת משלשול או הקאות שנמשכים יותר מיומיים, עלייך להשתמש באמצעי מניעה חלופי (כגון קונדומים, דיאפרגמה) למשך 7 ימים לאחר שהתסמינים חלפו.
- אם לאחר שהתחלת טיפול בלוג'קסטה, תחליטי שאת רוצה להיכנס להיריון, אנא הודיעי לרופא, מכיוון שיהיה צורך לשנות את הטיפול.

הנקה

- לא ידוע אם לוג'וקסטה עוברת בחלב אם. אנא ספרי לרופא אם את מניקה או מתכננת להניק. הרופא עשוי ליעץ לך להפסיק לקחת לוג'וקסטה או להפסיק להניק.

נהיגה ושימוש במכונות

הטיפול עשוי להשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש במכונות. אם אתה מרגיש סחרחורת במהלך הטיפול, אל תנהג או תשתמש במכונות עד שתרגיש טוב יותר.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

לוג'וקסטה מכילה לקטוז

אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת התרופה. הכמוסה מכילה פחות מ-1mmol של נתרן (23 מ"ג) לכמוסה ולכן ניתן להגיד כי אינה מכילה נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

- יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. תרופה זו צריכה להינתן לך על ידי רופא מנוסה בטיפול בהפרעות שומנים בדם אשר גם יבצע מעקב באופן קבוע.
 - המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון ההתחלתי המומלץ הוא כמוסה של 5 מ"ג, פעם ביום. הרופא עשוי להגדיל את המינון בהדרגה לאורך זמן, עד למקסימום של 60 מ"ג, פעם ביום. הרופא יגיד לך:
 - איזה מינון לקחת ולכמה זמן.
 - מתי להעלות או להקטין את המינון.
- אל תשנה את המינון בעצמך.
אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

- יש ליטול את התרופה פעם ביום עם כוס מים, לפני השינה, לפחות שעתיים לאחר ארוחת הערב (ראה סעיף 2: "שימוש בתרופה עם מזון, שתייה ואלכוהול").
- אין ליטול תרופה זו עם אוכל, שכן נטילת כמוסות אלו עם אוכל עשויה לגרום לבעיות בקיבה.
- יש ליטול את הכמוסה בשלמותה. אין לפתוח, לרסק, להמיס או ללעוס את הכמוסה לפני בליעתה.
- אם אתה נוטל תרופה אחרת להורדת כולסטרול הנקשרת לחומצות מרה כגון כולסבלם או כולסטיראמין, יש ליטול אותן לפחות 4 שעות לפני או 4 שעות אחרי נטילת לוג'וקסטה.

בגלל האפשרות של אינטראקציות עם תרופות אחרות, הרופא שלך עשוי לשנות את השעה ביום שבה אתה נוטל את התרופות שלך. לחילופין, הרופא שלך עשוי להפחית את המינון של לוג'וקסטה. יש ליידע את הרופא על כל שינוי בתרופות שאתה נוטל.

יש ליטול מדי יום ויטמין E ותוספי חומצות שומן חיוניות (אומגה 3 ואומגה 6) בזמן נטילת התרופה. המינון הרגיל מופיע להלן. שאל את הרופא או הדיאטנית כיצד להשיג את התוספים הללו. ראה סעיף 2: "שימוש בתרופה עם מזון, שתייה ואלכוהול".

מינון יומי	
400 IU*	ויטמין E
בערך	אומגה 3
110 מ"ג*	EPA
80 מ"ג	DHA
210 מ"ג	ALA
	אומגה 6
200 מ"ג	Linoleic acid

* IU – international units, מ"ג- מיליגרם

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

- פנה מיד לרופא או לרוקח.
- אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

- יש ליטול את המנה הרגילה ביום למחרת בשעה הקבועה. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

- אם תפסיק ליטול תרופה זו, הכולסטרול שלך עלול לעלות שוב. עליך לפנות לרופא לפני הפסקת נטילת התרופה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בלוג'וקסטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

- בדיקות דם חריגות לתפקודי כבד דווחו בתדירות גבוהה (עלולות להופיע ב-עד 1 מתוך 10 אנשים). הסימנים והתסמינים של בעיות כבד כוללות:
 - בחילות
 - הקאות
 - כאבי בטן
 - כאבי שרירים
 - חום
 - הצהבת העור או העיניים
 - עייפות יתר
 - הרגשה דמוית שפעת

יש לפנות מיד לרופא אם יש לך אחד מהתסמינים הללו, שכן הרופא עשוי להחליט להפסיק את הטיפול.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להופיע ביותר מ-1 מתוך 10 אנשים):

- שלשול
- בחילות והקאות
- כאבי בטן, אי נוחות או נפיחות בטנית
- ירידה בתיאבון
- הפרעות עיכול
- גזים
- עצירות
- ירידה במשקל

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע ב-עד 1 מתוך 10 אנשים):

- דלקת בקיבה ובמעיים הגורמת לשלשולים והקאות

- גורג'יטציה- מזון שעולה חזרה
- גיהוקים
- תחושה של עשיית צרכים לא מלאה, צורך דחוף בעשיית צרכים
- דימום מהרקטום או דם בצואה
- סחרחורת, כאב ראש, מיגרנה
- עייפות, חוסר אנרגיה או חולשה כללית
- כבד מוגדל, פגום או שומני
- שינוי צבע העור לסגול, בליטות מוצקות בעור, פריחה, בליטות צהובות בעור
- שינויים בבדיקות קרישת דם
- שינויים בספירת תאי דם
- ירידה ברמות האשלגן, קרוטון, ויטמין E, ויטמין K בדם
- התכווצויות שרירים

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להופיע ב-עד 1 מתוך 100 אנשים):

- שפעת או הצטננות, חום, דלקת בסינוסים, שיעול
- ספירת תאי דם אדומים נמוכה (אנמיה)
- התייבשות, יובש בפה
- תיאבון מוגבר
- צריבה או עקצוץ של העור
- נפיחות של העין
- כיב או נקודה כואבת בגרון
- הקאות דם
- עור יבש
- שלפוחיות
- הזעה מוגברת
- כאבי מפרקים או נפיחות, כאב בידיים או ברגליים
- כאב שרירים
- דם או חלבון בשתן
- כאב בחזה
- שינויים בהליכה
- בדיקת תפקודי ריאות לא תקינה

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (לא ניתן להעריך את התדירות מהנתונים הזמינים)

- נשירת שיער (התקרחות)
- כאבי שרירים (מיאלגיה)
- אובדן נזלים שעלול לגרום לכאב ראש, יובש בפה, סחרחורת, עייפות או חוסר הכרה (התייבשות)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון:
יש לאחסן מתחת ל-30°C.

יש לשמור את הבקבוק סגור היטב על מנת להגן מלחות. אין להשליך תרופות דרך שפכים או פסולת ביתית. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות אשר אינן עוד בשימוש. אמצעים אלו יעזרו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, pregelatinised starch, sodium starch glycolate, silica colloidal anhydrous and magnesium stearate.

(למידע נוסף לגבי לקטוז מונוהידרט, ראה סעיף 2: "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה").

מעטפת הכמוסה:

- מעטפת הכמוסה של כמוסות 5 מ"ג ו-10 מ"ג מכילות: gelatin, titanium dioxide and red iron oxide (E172).
- מעטפת הכמוסה של כמוסות 20 מ"ג מכילות: gelatin and titanium dioxide.
- כל הכמוסות מכילות דיו שחור אכיל להדפסה.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

- לוג'וקסטה 5 מ"ג הינה כמוסה קשיחה בעלת מכסה כתום/גוף כתום, מודפסת בדיו שחור עם "5 mg" על הגוף ו-"A733" על המכסה.
- לוג'וקסטה 10 מ"ג הינה כמוסה קשיחה בעלת מכסה כתום/גוף לבן, מודפסת בדיו שחור עם "10 mg" על הגוף ו-"A733" על המכסה.
- לוג'וקסטה 20 מ"ג הינה כמוסה קשיחה בעלת מכסה לבן/גוף לבן, מודפסת בדיו שחור עם "20 mg" על הגוף ו-"A733" על המכסה.

גודל האריזה: 28 כמוסות.

שם היצרן וכתובתו:

Catalent CTS, 10245 Hickman Mills Drive, Kansas City, MO 64137, USA

עבור:

Amryt Phatma DAC, 45 Mespil Road, Dublin 4, D04 W2F1, Ireland

שם בעל הרישום וכתובתו: מדיסון פארמה בע"מ, רח' השילוח 10, ת.ד. 7090, פתח תקווה.

עלון זה נערך במרץ 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

לוג'וקסטה 5 מ"ג – 152-85-33996

לוג'וקסטה 10 מ"ג – 152-86-33998

לוג'וקסטה 20 מ"ג – 152-87-33999

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.