

הודעה על עדכון עלון לרופא ועלון לצרכן**קארין 250****קארין 500**

טבליות מצופות

חברת אוניפארם בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון בעלון לצרכן של התכשיר **קארין 250, 500 מ"ג**.

בפירוט שלהלן כלולים העדכונים המהותיים בלבד. עדכונים שאינם מהותיים, אינם כלולים בהודעה זו. למידע מלא, יש לעיין בעלונים.

תוספות המידע מסומנות **בצבע אדום**, החמרות מודגשות **בצהוב** והסרות המידע מופיעות בקו חוצה.

הרכב:

כל טבליה מצופה של **קארין 250** מכילה:

קלאריתרומיצין 250 mg מ"ג Clarithromycin 250 mg

כל טבליה מצופה של **קארין 500** מכילה:

קלאריתרומיצין 500 mg מ"ג Clarithromycin 500 mg

ההתוויה המאושרת:

לטיפול בזיהומים של דרכי הנשימה העליונות, דרכי הנשימה התחתונות, זיהומים של העור ורקמות ריריות רכות.

לטיפול בזיהומי MAC (Mycobacterium Avium Complex) בחולי איידס.

לטיפול משולב עם תרופות ממשפחת מעכבי משאבות פרוטון (PPI) בחולים עם כיב פפטי פעיל הקשור בזיהום של הליקובקטר פילורי.

אנטיביוטיקה זו מפסיקה התפתחות של חיידקים הגורמים לזיהומים.

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה מקבוצת המקרוליידים.

העדכונים בעלון לצרכן:

[...]

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הנך סובל מאי ספיקת כבד חמורה ובעיות בכליות בו זמנית.
- הנך סובל מרמות נמוכות באופן חריג של אשלגן או **מגנזיום** בדם (היפוקלמיה או **היפומגנזמיה**).
- הנך נוטל:
 - טיקאגלור (למניעת קרישי דם).
 - רנולזין (לטיפול בתעוקת חזה).
 - ארגוטמין או דיהידרוארגוטמין (תרופות לטיפול במיגרנה).
 - ציסאפריד ודומפרידון (להפרעות במערכת העיכול).
 - פימוזיד (אנטי-פסיכוטי).
 - טרפנדין או אסטמיזול (קדחת השחת, אנטי-אלרגיות).
 - לובאסטטין, סימבאסטטין (תרופות המשמשות להורדת רמות כולסטרול).
 - קולכיצין (לטיפול בגאوت [שיגדון]).
- **תרופה המכילה לומיטפיד.**
- **תרופות אחרות, הידועות כגורמות להפרעות חמורות בקצב הלב:**
 - התפתחה אצלך בעבר צהבת או בעיה כבדית אחרת לאחר שימוש בקלאריתרומיצין.
 - הנך נוטל אסטמיזול או טרפנדין (תרופות לקדחת השחת או אלרגיה), ציסאפריד (להפרעות קיבה), פימוזיד (לבעיות נפשיות). שילוב של תרופות אלו עם קארין עלול לגרום להפרעות בקצב הלב.
 - הנך נוטל טבליות אלטרופטאן, טבליות/משאף ארגוטמין או טבליות דיהידרוארגוטמין (למיגרנה).
 - הנך נוטל אפילרנון (לטיפול באי ספיקת לב).
 - הנך נוטל טיקאגלור, איזוברדין או רנולזין (לטיפול בתעוקת חזה יציבה).
 - הנך נוטל תרופות מקבוצת הסטטינים כגון: לובאסטטין, סימבאסטטין, פרבסטטין, אטורבסטטין או רוזובסטטין [מעכבי HMG-CoA רדוקטאז המשמשים להורדת רמות כולסטרול וטריגליצרידים (סוגים של שומן) בדם].
 - הנך נוטל קולכיצין ומטופל במקביל בבעיות כבד או כליה.
 - הנך סובל מרמה נמוכה של אשלגן בדם (מצב הנקרא היפוקלמיה).
 - הנך סובל מבעיות בכבד ו/או בכליות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בקארין, ספר לרופא אם:

- אם אתה מפתח שלשול חריף או ממושך (pseudomembranous colitis) במהלך או לאחר הטיפול בקארין, היוועץ מיד עם רופא. דלקת המעי הגס (pseudomembranous colitis) דווחה בשימוש עם כמעט כל התרופות האנטיביוטיות כולל קארין.
 - יש לך **או היו לך בעבר** בעיות בלב.
 - נטלת קארין מספר פעמים בעבר או למשך תקופה ממושכת.
 - הנך סובל מזיהומים פטרייתיים (כמו פטרת) או יש לך נטייה לפתח זיהומים מסוג זה.
 - הנך בהריון, חושבת שהנך בהריון או מיניקה.
 - הנך נוטל תאופילין (לאסטמה), קרבמזפין, פניטואין (לאפילפסיה ועוויתות), דיגוקסין (ללב). בטיפול משולב עם תרופות אלו יש לבצע מעקב אחר ריכוזן בפלסמה.
 - הנך סובל ממיאסטניה גראביס (הפרעה הגורמת לחולשת שרירים).
 - הנך נוטל קולכיצין (לטיפול בשיגדון) שכן שילוב תרופות אלו עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות.
 - הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

- אם הסימפטומים אינם משתפרים תוך מספר ימים או שהם מחמירים, היוועץ ברופאך.
- שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לזיהום חיידקי/פטרייתי עמיד.
- אם הנך עומד לעבור ניתוח או פרוצדורה אחרת תחת הרדמה, יש להודיע לפני כן לרופא על נטילת התרופה.
- **קארין** עלול לגרום להפרעת קצב הנקראת "התארכות מקטע QT" הפרעה זו עלולה להיות חמורה (ולעיתים נדירות אף קטלנית) ולהתבטא בקצב לב מהיר/לא רגיל וסימנים אחרים (כגון: סחרחורת חריפה, התעלפות) הדורשים התערבות רפואית מיידית. הסיכון להפרעת קצב זו עלול לעלות אם אתה סובל ממחלות רקע מסוימות, מרמות אשלגן או מגנזיום נמוכות בדם, ממצבים רפואיים כגון: הזעה חריפה, שלשול, הקאות, אם אתה נוטל תרופות משתנות או תרופות אחרות העלולות להשפיע על קצב הלב (ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם" ו-"אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח").
- אם אתה מפתח שלשול חריף או ממושך במהלך או לאחר הטיפול ב**קארין**, **ספר מיד לרופא** שכן זהו עלול להיות תסמין לזיהום חמור במעי.
- אם אתה מפתח תסמינים כלשהם שעשויים להעיד על פגיעה בתפקוד הכבד כגון אובדן תיאבון, הצהבת העור או החלק הלבן של העיניים, שתן כהה, גרד או רגישות בבטן, הפסק ליטול את התרופה ו**ספר מיד לרופא**.
- למרות שרוב האנטיביוטיקות כנראה אינן משפיעות על אמצעי מניעה הורמונאליים (כגון גלולות), אנטיביוטיקות מסוימות עלולות להפחית את יעילותם במניעת הריון.
- התייעץ עם הרופא או הרוקח אם עליך להיעזר באמצעי מניעה נוספים בזמן השימוש בתרופה.

[...]

אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות

קארין עלולה להגביר את השפעת התרופות הבאות:

- אסטמיזול, טרפנדין (תרופות אנטי-אלרגיות), פימוזיד (תרופה אנטי-פסיכוטית), ציסאפריד ודומפרידון (לטיפול בהפרעות במערכת העיכול), ארגוטמין, דיהידרוארגוטמין (תרופות למיגרנה), איברוטיניב (תרופה ללוקמיה לימפטית כרונית), לובאסטטין, סימבאסטטין (תרופות להורדת רמות כולסטרול בדם), טיקגלור (תרופה למניעת קרישי דם), רנוליזין (לטיפול בתעוקת חזה), קולכיצין (לטיפול בגאوت [שיגדון]) - ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".
- אלפראזולאם, טריאזולאם, מידזולאם (תרופות להרגעה ו/או שינה).
- דיגוקסין, וראפאמיל, אמלודיפין, דילתיאזם (תרופות ללב).
- תיאופילין (תרופה אנטי-אסתמטית).
- וורפרין או נוגדי קרישה אחרים כגון דביגטרן, ריברוקסבאן, אפיקסבן (משמשים לדילול הדם).
- אטורבסטטין, רוזובסטטין (תרופות להורדת רמות כולסטרול בדם).
- ציקלוספורין, סירולימוס, טאקרולימוס (מדכאי מערכת חיסון).
- קרבמזפין, פניטואין, וולפרואט (לטיפול באפילפסיה).
- צילוסטזול (משמש לשיפור זרימת הדם ברגליים).
- אינסולין, ותרופות אחרות לטיפול בסוכרת (כגון נטגליניד, רפאגליניד).
- מתילפרדניזולון (קורטיקוסטרואיד לטיפול בדלקת).
- אומפראזול (תרופה לקיבה).
- סילדנאפיל, טדלפיל, ורדנאפיל (לטיפול באין אונות).
- טולטרודין (לטיפול בתסמונת השלפוחית הרגילה).
- וינבלסטין (לטיפול בסרטן).
- תרופות עם סיכון להשפיע על השמיעה, במיוחד אנטיביוטיקות ממשפחת אמינוגליקוזידים כגון גנטמיצין או נאומיציין.

תרופות, שכאשר נלקחות יחד עם קארין, גם מגבירות את השפעתו של קארין וגם השפעתן

מוגברת:

- אטאזאנאביר, סאקווינאביר (תרופות לטיפול באיידס).
- איטרקונאזול (תרופה לטיפול בזיהום פטרייתי).

אם הרופא שלך המליץ לך ליטול קארין יחד עם אחת התרופות המוזכרות כאן מעלה, ייתכן והרופא שלך יצטרך לבצע לך מעקב צמוד.

התרופות הבאות עלולות להחליש את השפעתו של קארין:

- ריפאמפיצין, ריפאבוטין, ריפפנטין (אנטיביוטיקות).
- אפאבירנז, אטראבירין, נביראפין (תרופות לטיפול באיידס [HIV]).
- פניטואין, קרבמזפין, פנובארביטאל (לטיפול באפילפסיה).
- היפריקום (St. John's Wort).

לתשומת ליבר

- ריטונאביר (אנטי-וירלי) ופלוקונאזול (תרופה לטיפול בדלקת פטרייתית) עלולות להגביר את השפעתו של קארין.
- קארין עלול להחליש את השפעתו של זידובודין (אנטי-וירלי).
- על מנת למנוע זאת, יש להשאיר מרווח של 4 שעות בין נטילת תרופות אלו.
- נטילה בו-זמנית של קארין עם דיגוקסין, קווינידין, דיסופיראמיד או וראפאמיל (תרופות ללב) או אנטיביוטיקות אחרות ממשפחת המקרולידים עלולה לגרום להפרעות בקצב הלב.

- דיגוקסין (ראה סעיף "לפני הטיפול בקארין, ספר לרופא אם"), דיסופיראמיד, קווינידין, אמיודון, דופטיליד, סוטלול, פרוקאינאמיד, פרופפנון (למחלות לב). ייתכן ותצטרך לעבור בדיקות דם ובדיקות לניטור פעילות הלב.
- תיורידזין (אנטי פסיכוטי).
- תרופות נגד קרישת דם (כגון וורפרין או כל תרופה אחרת לדילול דם) – ייתכן ותצטרך לערוך בדיקות לקרישת הדם.
- קרבמזפין, וולפראט, פנובארביטאל או פניטואין (לאפילפסיה) – ראה סעיף "לפני הטיפול בקארין, ספר לרופא אם".
- קולכיצין (לטיפול בשיגדון (גאט)) – ראה סעיף "לפני הטיפול בקארין, ספר לרופא אם".
- תרופות להורדת רמות הגלוקוז בדם כגון: נטגליניד, פיוגליטזון, רפאגליניד, רוזיגליטזון או אינסולין.
- תיאופילין, אמינופילין (תרופות למחלות ריאה כגון: אסתמה).
- מידזולאם, אלפראזולאם, טריאזולאם (תרופות להרגעה ו/או שינה).
- צילוסטזול (לבעיות בזרימת הדם).
- אומפראזול (לצרבות וכיבים בקיבה אלא אם כן נירשם לטיפול בהליקובקטר פילורי).
- קורטיקוסטרואידים כגון מתילפרדניזולון.
- וינבלסטין (לטיפול בסרטן).
- ציקלוספורין, סירולימוס, טאקרולימוס (מדכאי מערכת חיסון המשמשים לדוגמה למניעת דחיית השתלות).
- אפאבירנז, דלברדין, נביראפין, זידובודין, אטראבירין, מעכבי פרוטאזות כגון: ריטונאביר, אטאזאנאביר, סאקווינאביר (תרופות אנטי וירליות המשמשות לטיפול באיידס).
- ריפאבוטין, ריפאמפיצין, ריפפנטין, פלוקונאזול, איטרקונאזול (לטיפול בזיהומים שונים).
- אפרפיטנט (למניעת הקאות במהלך טיפול כימותרפי).
- טולטרודין (לטיפול בשלפוחית רגילה).
- תרופות ממשפחת חוסמי תעלות סידן כגון: וראפאמיל, אמלודיפין, דילתיאזם (לטיפול ביתר לחץ דם).
- סילדנאפיל, ורדנאפיל, טדלפיל (לטיפול באין אונות בגברים או ביתר לחץ דם ריאתי – לחץ דם גבוה בכלי הדם בריאות).
- היפריקום (St. John's Wort) – תכשיר צמחי המשמש לטיפול בדיכאון.
- סימטידין (להפרעות במערכת העיכול).
- אנטיביוטיקות ממשפחת האמינוגליקוזידים (כגון: גנטמיצין, סטרפטומיצין, טוברמיצין, אמיקצין, נטילמיצין); משפחת המקרולידים (כגון: אריתרומיצין); מוקסיפילוקסצין וגנטסיפילוקסצין.
- ברומוקריפטין.
- הקסוברביטל.
- אלפטיניל ופנטניל (משככי כאבים נרקוטיים).

- חיסונים בקטריאליים חיים.
 - אסטמיזול או טרפנדין (תרופות לקדחת השחת או אלרגיה), ציסאפריד (להפרעות קיבה), פימזיד (לבעיות נפשיות) – ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם".
 - טבליות אלטרפטאן, טבליות/משאף ארגוטמין או טבליות דיהידרוארגוטמין (למיגרנה) – ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם".
 - תרופות מקבוצת הסטטינים כגון: לובאסטטין, סימבאסטטין, פרבסטטין, אטורבסטטין או רוזובסטטין [מעכבי HMG-CoA רדוקטאז המשמשים להורדת רמות כולסטרול וטריגליצרידים (סוגים של שומן) בדם] – ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם".
 - אפלרנון (לטיפול באי ספיקת לב) – ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם".
 - טיקאגלור, איוברדין או רנוליזין (לטיפול בתעוקת חזה יציבה) – ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם".
- [...]

הריון, פוריות והנקה

אין מידע אודות השפעת קלאריתרומיצין על פוריות האדם. בחולדות, מחקרי פוריות לא הראו הוכחות להשפעות מזיקות.

נהיגה ושימוש במכונית

לקות ראייה וטשטוש בראייה עלולים להשפיע על יכולת המטופל לנהוג או להפעיל מכונית.

[...]

4. תופעות לוואי

תופעות לוואי חמורות

תופעות לוואי חמורות שאינן שכיחות (תופעות המופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1000):

- חום, כאב גרון או **כיבים בפה** עקב זיהומים (סימנים של רמות נמוכות של תאי דם לבנים).
- פריחה, גרד, חרלת, קוצר נשימה או קושי לנשום, **צפצופים** או **שיעול**, סחרחורת, תחושת סחרור, שינויים במצב הכרה, **לחץ דם נמוך** עם או בלי גרד כללי קל, אדמומיות בעור, התנפחות של הפנים/הגרון, הכחלה של **השפתיים**, הלשון או **העור** (סימנים לתגובה אלרגית חמורה).
- קצב לב לא סדיר (שינויים בפעילות חשמלית של הלב).
- הצהבה של העור והעיניים, בחילה, אובדן תיאבון, שתן כהה.

תופעות לוואי חמורות ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- שלשול, כאבי בטן, חום (סימנים של דלקת המעי הגס).
- כאב חריף בבטן **ובגב** הנגרם מדלקת בלבלב.
- שינוי בכמות השתן, נמנום, בלבול ובחילה הנגרמת כתוצאה מדלקת בכליות.
- פריחה עורית חמורה או מגרדת, במיוחד אם מלווה בשלפוחיות ומופיע כאב בעיניים, בפה או באיברי המין.
- חבורות או דימומים לא שגורתיים הנגרמים מרמה נמוכה של טסיות הדם.
- קצב לב מהיר או לא סדיר.
- **דימום כבד**.
- פירוק לא תקין רקמת השריר הגורם לכאב, חום, **שתן בצבע אדום-חום**.
- **ירידה חמורה בתפוקת השתן**.

- דרמטיטיס בולוס (dermatitis bullous), פריחה, חום, שינויים בדם (אשר עלולים להעיד על תסמונת רגישות היתר הנקראת DRESS), פריחה אדומה, קשקשית עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות (פוסטולוזיס אקסנתמטי כללי חריף - acute generalised exanthematous pustulosis).

כל אלה הן תופעות לוואי חמורות. ייתכן ותזדקק לטיפול רפואי דחוף.

תופעות לוואי נוספות:

ספר לרופא שלך אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מפריעות לך.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות המופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100):

- קושי להירדם.
- כאב בטן, בחילה או הקאה, שלשול, קשיי עיכול, צרבת.
- תוצאות בדיקת תפקודי כבד לא תקינים.
- פריחה.
- התרחבות כלי דם.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות המופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1000):

- זיהומים פטרייתיים (פטרת- candidiasis).
- זיהום בנרתיק.
- רמות נמוכות של תאי הדם הלבנים, עלייה בכמות של תאי דם לבנים מסוימים.
- ירידה בנויטרופילים (נויטרופניה).
- אובדן או ירידה בתיאבון.
- חרדה.
- סחרחורת, נמנום, רעד, ישנוניות, רעידות.
- תנועות שרירים בלתי רצוניות.
- ליקויי שמיעה.
- תחושת סחרור.
- צלצולים באוזניים (טנטון).
- דלקת של רירית הקיבה, עצירות, גזים, יובש בפה, גיהוק, התנפחות ונפיחות של הבטן.
- עלייה של אנזימי הכבד בדם.
- תחושת חולי, חולשה, עייפות.
- כאב בחזה.
- צמרמורות.
- עוויתות בשרירים, כאב בשרירים או אובדן רקמת השריר. אם ילדך סובל ממיאסטניה גראביס (מצב בו השרירים נחלשים ומתעייפים בקלות), טיפול בקארין עלול להחריף תסמינים אלו.
- אסטמה- מחלת ריאות המקושרת להיצרות של דרכי האויר, המקשה על הנשימה.
- דימום מהאף.
- קריש דם הגורם לחסימה פתאומית בעורק הריאה (תסחיף ריאתי).
- עלייה חריגה בתוצאות בדיקות דם של תפקודי כבד וכליה.
- תוצאות בדיקות דם חריגות- רמות גבוהות של האנזים הנקרא אלקליין פוספטאז (alkaline phosphatase) בדם, המעיד על בריאות העצמות בגוף, או רמות גבוהות של האנזים הנקרא לקטאט דהידרוגנאז (lactate dehydrogenase) בדם, המעיד על בריאות איברים מסוימים בגוף.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- סינוסים, חוסר התמצאות במרחב, בלבול, הזיות (ראייה של דברים שאינם קיימים), פסיכוזא (אובדן קשר עם המציאות), תחושה של אובדן זהות, מאניה (תחושה של התרוממות רוח או התרגשות יתר), דכאון.
- פרנסים, איבוד חוש טעם או ריח, עקצוץ וחוסר תחושה בעור.
- זיהומים חיידקיים מסוימים של העור ורקמות שמתחת לעור.
- שינוי צבע הלשון, שינוי צבע השיניים.
- כאב או חולשה בשרירים.
- תוצאות בדיקות דם חריגות- זמן קרישת דם ממושך.
- צבע שתן חריג.
- בעיות בראייה (ראייה מטושטשת).
- ליקויי ראייה.

קארין עלול להשפיע על תוצאות בדיקות מסוימות. אם אתה צריך להגיע לבית חולים או לרופא לביצוע בדיקות דם, חשוב שתספר לרופא או לאחות שאתה נוטל קארין.

- שלשול חריף ו/או ממושך עם התכווצויות או כאבי בטן, היכול להיות דמי או רירי (עלול להוות סימפטום לזיהום חיידקי חמור). שלשול עלול להופיע גם במהלך החודשים שלאחר סיום הטיפול

- בקלאריתרומיצין יש לפנות לרופא גם במקרה זה. אין ליטול תכשירים נוגדי שלשול או נוגדי כאב נרקוטיים שכן הם עלולים להחמיר את המצב.
- פריחה, קשוי נשימה, התעלפות, אובדן הכרה, או התנפחות של הפנים והצוואר, ייתכן שפיתחת תגובה אלרגית לתרופה.
- הצהבה של העור ו/או העיניים (צהבת), גירוי בעור, צואה בהירה, שתן כהה, בטן רגישה או אובדן התיאבון, אלו סימנים העלולים להעיד על בעיה בפעילות הכבד.
- תסמונת DRESS (מחלה חמורה המלווה בפריחה, חום ודלקות באיברים פנימיים).
- תגובה עורית חמורה כגון תסמונת Stevens-Johnson או Toxic Epidermal Necrolysis (תגובה אלרגית נדירה שגורמת למחלה חמורה המלווה בשלפוחיות על העור, הפה, השפתיים, העיניים ובאיברי המין).
- נקודות סגולות על פני העור, כאבי פרקים, בעיות במערכת העיכול ובכליה (שעשויים להצביע על מחלה הנקראת Henoch-Schonlein purpura).
- כאבים וחולשת שרירים (רבודומיליזיס) מצב הגורם לפירוק רקמת שריר שיכול להוביל לנזק כליתי.

במידה ומופיע אחד מהתסמינים הבאים, פנה מיד לרופא:

- אובדן שמיעה, שינויים במצב הרוח או במצב הנפשי.
- סחרחורת חריפה, התעלפות, קצב לב מהיר/לא רגיל.
- סימנים חדשים לזיהום (כגון: חום, כאב גרון מתמשך), חולשת שרירים, בחילות או הקאות מתמשכות, כאב בטן חריף, שינוי בכמות השתן.

במידה ומופיע אחד מהתסמינים הבאים, פנה לרופא:

- כתמים לבנים בחלל הפה, שינוי בהפרשות וגינאליות או סימפטומים חדשים אחרים העשויים להעיד על זיהום פטרייתי בפה או בואגינה (שכן שימוש ממושך או חוזר בתרופה עלול להגביר את הסיכון לזיהומים אלו).

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות המופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- פריחה בעור.
- קשוי שינה.
- שלשול, בחילה, הקאות, כאב בטן, קשוי עיכול.
- שינויים בתפקודי הכבד.
- הסמקה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות המופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1000):

- נפיחות, גרד או אדמומיות בעור, קשיקשת חומה.
- זיהומים פטרייתיים בעור.
- חום גבוה.
- דלקת בעור, חרלת.
- זיהום פטרייתי בפה או בנרתיק.
- ירידה בכמות תאי הדם הלבנים אשר עלולה להגדיל את הסיכון לזיהומים.
- שינוי ברמת הטסיות בדם (עלול להגביר את הסיכון להופעת חבורות, דימומים או קרישי דם).
- אובדן או ירידה בתיאבון, אנורקסיה, צרבת, תחושת נפיחות בבטן, עצירות, גזים, גיהוקים.
- דלקת בדופן הקיבה או בושט.
- חרדה, עצבנות, צרחות, עילפון, אובדן הכרה, נמנום, עייפות, סחרחורת, רעד.
- נוקשות או עוויתות בשרירים.
- הפרעות בתנועה, תנועות בלתי רצוניות של הלשון, הפנים, השפתיים או הגפיים.
- צלצולים/זמזומים באוזניים, אובדן שמיעה.
- הרגשת סחרור (ורטיגו).
- תחושת עקצוץ או נימול בגפיים.
- שטפי דם, דימום מהאף.
- דלקת של הפה או הלשון.
- יובש בפה.
- כאב בפה.

- כאבי פרקים או כאבי שרירים, אובדן מסת שריר. אם אתה סובל ממיאסטניה גראביס (מצב בו השרירים נחלשים ומתעייפים בקלות) או מרבדומיליזיס (מצב בו מתרחש פירוק של רקמת שריר), טיפול בקלאריתרומיצין עלול להחריף את התסמינים שלך.
- כאבי חזה, שינויים בקצב הלב, דפיקות לב מהירות או חזקות (פלפיטציות).
- דום לב.
- בעיות בנשימה (אסתמה).
- דלקת בכבד או חסימת דרכי המרה (יכול להתבטא בהצהבה של העור, שתן כהה, צואה בהירה, גירוי בעור), עליה ברמות אנזימי הכבד.
- ליקוי בתפקוד הכליה כגון: עליה בהפרשות חלבונים על ידי הכליה או עליה באנזימי הכליה, עליה ברמות קריאטנין ואוריאה בדם, דלקת של הכליה (יכול להתבטא בעייפות, התנפחות ונפיחות של הפנים, הבטן, הירכיים או הקרסוליים) ובעיות במתן שתן.
- חום, צמרמורת, חולשה.
- תוצאות בדיקות דם לא תקינות.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- זיהום במעי הגס.
- זיהום בעור או בקפלי העור.
- רמות סוכר נמוכות בדם העלולות לגרום לעילפון.
- הפרעות פסיכוטיות, מאניה, בלבול, הזיות, שינוי בתפיסת המציאות, איבוד יכולת התמצאות במרחב, פאניקה, דיכאון, סיוטי לילה (חלומות רעים).
- נימול/ עיקצוץ בעור.
- שינוי בצבע הלשון והשיניים (נדיר מאוד – הפיך בדרך כלל על ידי ניקוי שיניים מקצועי).
- כשל כבדי, צהבת.
- DRESS (מחלה חמורה המלווה בפריחה, חום ודלקות באיברים הפנימיים).
- נחלות שרירים, פירוק רקמת השריר.
- אגרנולוציטוזיס.

[...]

העלון לצרכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות <http://www.health.gov.il> וניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לבעל הרישום.