

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תבשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

נוזידקס®
טబליות
הרכב
כל טבלייה מכילה:

Dexchlorpheniramine Maleate 1 mg
Pseudoephedrine (as hydrochloride) 25 mg
דקסקלורפניראמין מיליאט 1 מ"ג
פאסואודואפדרין (כהידרוולוריד) 25 מ"ג

למידע על מרכיבים בלתי פעילים וארגנים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך לשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינוון לעalon זה. היועץ ברוקח אם הינך זוקק למידע נוסף. עlijך לפנות לרופא אם תסמיini המחלת (סימפטומים) מחמיירים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

טיפול סימפטומי בהצטנות ובנזלת מקור אלרגי.

קובצת רפואיית

דקסקלורפניראמין מיליאט הינו אנטיהיסטאמין מסווג פוליאמין.
פאסואודואפדרין הידרוולוריד הינו אלפא אגוניסט, נוגד גודש סימפטומיימי.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פירוט בסעיף 6). חלק מהתחסמים של תגובה אלרגית עלולים לכלול:
פריחה עורית, קשי נשימה או עילפון.
- המטופל הוא ילד מתחת לגיל 6 שנים.
- אתה סובל מסוכרת.
- אתה סובל מגידול בבלוטות יותרת הכליה (Pheochromocytoma).
- אתה סובל מפעילות יתר של בלוטת התיריס.
- אתה סובל מכשל כלילי חמור.
- אתה סובל מגלאוקומה זווית סגורה.
- אתה מטופל בתרופות מקובצות מעכבי מונואמין אוקסידי (MAOI) או בתוך 14 ימים מהפסקת הטיפול בהן.
- אתה מטופל בתרופות נוגדות גודש אחרות (כגון תרופות לשיעול והצטנות).
- אתה מטופל בחוסמי בטא.
- יש לך לחץ דם גבוה מאוד (יתר לחץ דם חמור) או יתר לחץ דם שאינו נשלט בעזרת תרופות, מחלת לב או כלי דם או היסטוריה של שבץ.
- יש לך מחלת כליות חריפה (פתאומית) או כרונית (ארוכת טווח) או אי ספיקת כליות.

ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה פני הטיפול בנוזידקס, ספר לרופא אם:

- יש לך אלרגיה לתרופות אחרות או למזון.
- את בהירין, מתכנתה להיכנס להירין, מניקה או מתכנתה להניק (ראי סעיף "הירין והנקה").
- מקרים של תסמנות אנטפלופתיה הפיכה אחוריית (PRES) ותסמנות כיוך כלי דם מוחית הפיכה (RCVS) דווחו בעקבות שימוש בתרופות המכילות פאסואודואפדרין. RCVS ו-PRES הם מצבים נדירים שכיחים להיות קרוביים באספקת דם מוגחתת למוח. הפסיק

מיד להשתמש בנוסידקס ופנה לעזרה רפואיית מיידית אם אתה מפתח תסמינים שעשוים להיות סימנים של RCVS או PRES (لتסמינים ראה סעיף 4 "תופעות לוואי אפשריות")

- אתה סובל או סבלת בעבר:
 - מפרוסיסים
 - ממחלת כליה או כבד
 - מפעילות יתר של בלוטת התיריס
 - ממחלוות לב
 - מלץ דם גבוה
 - מעלייה בלץ תוך עיני
 - מביעות בבלוטת הערמוניית מהירות או מחסימה בין הקיבה למעי הדק הגורמות להகאות
 - מכיב פפטיא
 - מקשי במתן שתן או מתן שתן תכוף, עקב למשל בעיות בבלוטת הערמוניית או זיהום/דלקת בשלפוחית השטן/דרכי השטן
 - מחסימת עורקים או ררידים (מחלת צלי דם חסימתית)
 - מבעה בבלוטת התיריס מהתכורות לאלכוהול

התרופה עלולה לגרום לישב בפה, באף או בגרון. אם היובש בפה לא נעלם אחרי שבועיים, ספר לרופא או לרופא השינויים שלך.

השפעה על בדיקות מעבדה:

- אין ליטול תרופה זו 48 שעות לפני בדיקות לאלהגיה כיון שהתרופה עלולה לשנות את תוצאות מבחני האלהגיה.
- התרופה עלולה לגרום לתוצאה חיובית בבדיקות סמיים.

קשיישים

חולמים קשיישים עלולים להיות רגישיים לתקשרים מונעיג גודש. השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות, לטשטוש, לתופעות של דיכוי מערכת העצבים המרכזית (בלבול) וללחץ דם נזוק.

ילדים ותבגרים

אין להשתמש בנוסידקס בילדים מתחת לגיל 6 שנים.

תగובות ביון-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לך תחת לאחורונה, **תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופק**. במיוחד אם אתה לוקח:

- אלכוהול
- תרופות נוגדות דיכאון טרייציקליות - שימושות לטיפול בהפרעות מצב רוח.
- משככי כאבים חזקים/נרקוטיים (כגון: קודאין, מורפיאם ודקسطו-פרופוקסיפן).
- תרופות לשינה.
- תרופות לטיפול בחרדזה.
- תרופות נוגדות קריישת דם (כגון וורפרין).
- מעכבי מונואמין ואוקסידייז (ראה "אין להשתמש בתרופה אם" לעיל).
- מוקלובמיך - משמש לטיפול בהפרעות מצב רוח.
- תרופות אנטיכולינרגיות - משמשות לטיפול בהתכווצויות ובעוויות (כגון אטרופין).
- תרופות להורדת לחץ דם (כגון: גואאנטיידין, מתילדופה, חוסמי נוירונים אדרנרגיים, דבריסוקין, ברטיליום, רסרפין ובטאנידין).
- אוקסיטוצין (ליזירוז לידה).
- תכשירים המכילים אלקלואידים של ארגוט - משמשים לטיפול במיגרנה (כגון: ארגומטמין ומתייסרגיד).
- חומר הרדמה.

- ממריצים או מדכאי תיאבון ותרופות המשמשות לטיפול בגודש ובאסטמה (תרופות סימפטומימטיות).
- תרופות לב ממפחת גליקוזידים - משמשות לשילטה בקצב לב או בהתקכוציות (כגון דיגוקסין).
- מטוכלופרמיד או דומפרידון (טיפול בבחילה ובהקאה)
- גלולות למניעת הריון
- כולסטיראמין (להפחחת יתר שומני הדם) אנטיקוונולסטנט (תרופות לטיפול באפיפסיה)

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לשתיות אלכוהול בזמן הטיפול עם נסידקסט. התרופה עלולה להגבר את השפעת האלכוהול ועל כן שתיית אלכוהול עם התרופה עלולה להחמיר את תופעות הנמנום והסחרורות.

הירין, הנקה ופוריות

אם את בהירין או מניקה, חשוב שתאת עשויה להיות בהירין או מתכנתה להרות, פni לרופא או לרוקח ליעוץ טרם נטילת תרופה זו. לא מומלץ להשתמש בהירין או הנקה, אלא אם התועלת הפוטנציאלית של הטיפול לאם עולה על הסיכון אפשריים לעובר או לתינוק היונק.

הירין

דקסכלורפניראמין מליאט : בטיחות במהלך ההירין לא נקבעה. השימוש במהלך שני השלישים הראשונים של ההירין הוא רק אם יש צורך ברור. מומלץ שלא להשתמש בשליש השלישי של ההירין, מכיוון שעובר עלולה להיות תוגבה קשה לאנטי-היסטמינים. דקסכלורפניראמין מליאט נלקח על ידי מספר רב של נשים הרות ונשים בגיל הפוריות מבלי שנצפו עליות מוחחות בתדרות המומים או השפעות מזיקות אחרות ישירות או עקיפות על העובר.

פאודואפדרין הידרוכולוריד :

בטיחות במהלך ההירין לא נקבעה. מהנתונים הקיימים על נשים בהירין לא נראה כי נصفת רעלות לעובר או לילוד.

הנקה

ספרי לרופא אם את מניקה או מתכנתה להניק. דקסכלורפניראמין מליאט - מופרש בחלב אם. פאודואפדרין הידרוכולוריד - מופרש בחלב בכמות מועטה, אך ההשפעה על התינוק היונק אינה ידועה.

פוריות

אין מידע על ההשפעה של מוצר זה על הפוריות.

נהייה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה זו עלול לפוגם בעירנות ועל כן מחיבב זהירות בהניגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

חשיפה לשמש

תרופה זו עלולה לגרום לרגשות מיוחדת בעת חשיפה לשמש, על-כן המנע מחשיפה לשמש ודאג להגנה מתאימה (בגדים ארוכים, כובע, משחות הגנה וכו').

מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה

נטרן - תרופה זו מכילה פחotta מ-1 מילימול נטרן (23 מ"ג) לטבליה ועל כן נחשבת נטולת נטרן. לקטו - אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סיבות לסוכרים, عليك להתיעץ עם הרופא לפני נטילת תרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר. בהעדר הוראה אחרת מהרופא, המינון המקורי הוא:

מבוגרים : 2-1 טבליות, פעמיים ביום.
ילדים בגיל 6-12 שנים : טבלייה אחת ביום.
אין לעبور על המנה המומלצת.

אופן השימוש
יש ליטול את התרופה עם או אחרי הארוחה.
אין מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה.

אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בלוילך מן התרופה, פנה מיד לחדר מيون של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. תסמנני מינון יתר כוללים סחרחרות וקשי נשימה.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, אין ליטולמנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אם ליטול תרופות בחושך ! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זוקק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי
כמו בכל תרופה, השימוש בנוטידקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחלה למקרא רשימות תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מאן אף אהת מהן.
אם אתה מעל גיל 60 יתכן שאתה בסיכון מוגבר לתופעות לוואי.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לטיפול רפואי או לרופא אם מופיעה אחת מהתופעות הבאות:

- כאב בחזה.
- סימנים פתאומיים של תגובה אלרגית (כגון : פריחה, שלפוחיות, קילוף וגרד בעור).
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון שעלולה לגרום לקושי בבליעה או בנשימה.
- עוינותות, התקפים או פרכויסים.
- תרדמת.
- הופעה פתאומית של חום, אדמומיות בעור, או פצעונים קטנים רבים (تسمינים אפשריים של AGEP - Acute Generalised Exanthematous Pustulosis - תופעה העשויה להתறחש במהלך היום הראשונים לטיפול בתרופה זו).
- כאב בטן פתאומי או דימום מפני הטעטה עקב דלקת במעי הגס כתוצאה מספקת דם לא מספקת.
- הופעה פתאומית של כאב ראש חמוץ, בחילות, הקאות, בלבול, קצב לב לא סדיר, הפרעות ראייה.
- ירידה בזרימת הדם ללוב העוללה לגרום לעזוקת חזזה (אי נוחות או כאב בחזה, בצוואר, בגב, בלסת, בכפותים, בזרועות) או התקף לב
- שבץ (חולשה בפנים, בזרועות או ברגליים או בעיות דיבור)
- בעיות בהטלת שתן (במיוחד בגברים עם בעיות בערמוניות).
- עייפות בלתי רגילה, חבלות או דימומים בלתי צפויים והידבקות ביותר זיהומיים (כגון הצטננות) מהרגיל.
- אובדן ראייה פתאומי - זרימת דם מופחתת לעצב הראייה (נוירופתיה איסכמית או פטית).
- הזיות, אשליות או פרנוויות (שמיעת קולות וראיית מראות שלא קיימים, מחשבות ורגשות שאין בהם היגיון).
- אם אתה מפתח תס敏ים, שעשוים להיות סימנים של תסמונת אנכפלופתיה אחורית הפיכה (PRES) וتسمונת כיוז' קל דם מוחית הפיכה (RCVS). אלו כוללים :
 - הופעה פתאומית של כאב ראש חמוץ
 - בחילות
 - הקאות
 - בלבול
 - פרכויסים
 - שינויים בראייה

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שימושיות ביותר ממשתמש אחד מעשרה

- כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שימושיות ב-10-1 משמשים מתוך 100

- יובש בפה או בחילות
- קשיי שינה, עצבנות או סחרחוורת

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)

- חרדה, נרעשות, הרגשות אי שקט, עצבנות, תחושת עצבנות או תחושת אישר קיצוני
- הפרעות שינה
- דופק מהיר או לא סדיר או מוגברת לדופק שלך (דפיקות לב)
- נמנום
- לחץدم גבוה
- כאבי בטן, שלשול, הקאה
- כאבים בזמן מתן שתן
- עקצוץ כמו מסיכות ומחטפים) או חוסר תחושה בכפות הידיים או הרגליים.
- רעדות
- ירידת בזם הדם לעצב הראייה (Ischaemic optic neuropathy)
- מצבים חמורים המשפיעים על כלי דם במוח הידועים כתסמונת אנטפלופתיה אחרתית
- הפיכה (PRES) ותסמונת כיווץ כלי דם מוחית הפיכה (RCVS).

אם הופעה **תופעת לוואי**, אם אחת **מתופעות הלוואי חמלה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

תופעות לוואי ותגובה בין תרופתיות בילדים

על ההורים לדוח לרופא המטפל על כל תופעות הלוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או על-ידי כניסה לקישור :

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת: תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים ואו תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין לשתמש בתרופה אחרי התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לשמור תרופה זו במקום יבש, מתחת ל-25°C.

אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתיית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיבים הפעילים בתרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, povidone, talc, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, hypromellose, titanium dioxide, macrogol/PEG 400.

כיצד נראהת התרופה ומה תוכן האריזה:
טבלייה לבנה, עגולה, קמורה משני צידיה.

בכל אריזה 20 או 30 טבליות באrizת בליסטר.
ייתכן שלא כל גדי הארץ מושוקים.

שם היוצרים ובעל הרישום וכותבו:
טבע ישראל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

העלון נערך במרץ 2024 .

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות : 057-17-21688
לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני
המינים.