

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوّق هذا الدواء حسب وصفة طبيب قفط

ستاتور 5

ستاتور 10

ستاتور 20

ستاتور 40

أقرص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص من **ستاتور 5** على:

روسوفاستاتين (كحلب الكالسيوم) 5 ملغ

Rosuvastatin (as calcium salt) 5 mg

يحتوي كل قرص من **ستاتور 10** على:

روسوفاستاتين (كحلب الكالسيوم) 10 ملغ

Rosuvastatin (as calcium salt) 10 mg

يحتوي كل قرص من **ستاتور 20** على:

روسوفاستاتين (كحلب الكالسيوم) 20 ملغ

يحتوي كل قرص من **ستاتور 40** على:

روسوفاستاتين (كحلب الكالسيوم) 40 ملغ

المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر الرجاء أنظر الفقرة "2" معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

يحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك

أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

1. لأَي غرض مخصص الدواء؟

ستاتور مخصص لخفض إرتفاع نسب الكوليسترول والشحوم الثلاثية في الدم وذلك عند فشل تحقيق ذلك بواسطة تعديرات في الحمية الغذائية وممارسة الرياضة. خلال العلاج بـ **ستاتور** يجب مواصلة إتباع حمية غذائية لخفض كمية الكوليسترول في الطعام وممارسة النشاط البدني. إن إرتفاع نسب الكوليسترول في الدم قد يؤدي إلى خظورة حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

الفصلية العلاجية: يمثبط إنزيم HMG-CoA reductase.

ينتمي **ستاتور** لفصيلة الأدوية المسماة ستاتينات، يعمل على خفض نسبة الشحوم في الدم، الأكثر شيوعاً يسمى كوليسترول. هناك عدة أنواع من الكوليسترول في الدم: "كوليسترول سيء" و"كوليسترول جيد". يعمل **ستاتور** ويساعد الجسم على حجب إنتاج "الكوليسترول السيء" وعلى تصريفه من الجسم وسيساهم في رفع نسب "الكوليسترول الجيد".

الرجاء إقرأ هذه النشرة بتمعن حتى ولو إستعملت في الماضي أدوية لخفض الكوليسترول.

كنت تتناول أدوية مخصصة لعلاج فيروس العوز المناعي البشري (HIV) مثل: ريتونافير مع لوبينافير و/أو أتانافافير. الرجاء راجع الفقرة "6"التداخلات/التفاعلات بين الأدوية".

كنت تتناول أو تناولت مضاداً حيوياً يحتوي على حمض الفوسيديك خلال الأيام الـ 7 الأخيرة (لعلاج تلوث جراثومي سواء عن طريق الفم أو بالحقن). إن مشاركة حمض الفوسيديك و**ستاتور** قد تسبب مشاكل عضلية خطيرة (إنحلال العضلات المخبطة). الرجاء راجع الفقرة "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية".

تجاوزت عمر **70 سنة** (سيختار الطبيب المقدار الدوائي الابتدائي الملائم لك من **ستاتور**).

كنت تعاني من فشل تنفسي خطير.

كنت من أصل أسوي (صيني، فيليبيني، هندي، كوري، فيتنامي، ياباني).

يختار الطبيب جرعة دوائية إبتدائية مناسبة لك من ستاتور.

إذا إنتطقت عليك إحدى الحالات المدونة أعلاه (أو إذا لم تكن واثقاً): **لا تتناول ستاتور 40 ملغ (المقدار الدوائي الأكبر) واستوضح من الطبيب أو من الصيدلي الخاص بك قبل بدء إستعمال ستاتور من أي مقدار دوائي كان.**

بلغ عن ردود فعل جلدية خطيرة تشمل متلازمة ستيفنس – جونسون ومتلازمة رد الفعل الدوائي مع فرط الحساسات والأعراض الجهازية (DRESS). وذلك بما يخص العلاج بـ **ستاتور**. توقف عن إستعمال **ستاتور** وتوجه لتلقي مساعدة طبية فورية إذا لاحظت إحدى الأعراض الموصوفة في الفقرة "4"الأعراض الجانبية".

لدى عدد قليل من المتعاملين، فإن الستاتينات قد تؤثر على الكبد، الأمر الذي يمكن تشخيصه بواسطة فحص دم إعتيادي الذي يفحص تزايد في نسب إنزيمات الكبد. لذا، يطلب منك الطبيب إجراء فحوص دم لوظائف الكبد، قبل وخلال العلاج بـ **ستاتور**.

خلال فترة علاجك بهذا الدواء، يجري طبيبك متابعة حثيثة وذلك إذا كنت تعاني من مرض السكري أو كنت معرضاً لخطورة تطوير مرض السكري. من الجائز أن تكون معرضاً لخطورة تطوير مرض السكري إذا وجدت لديك نسب مرتفعة من السكريات والشحوم في الدم، أو إذا وجد لديك وزن زائد وضغط دم مرتفع.

الأطفال والمراهقون

ستاتور غير مخصص للأطفال ومراهقين دون عمر **18** سنة.

التداخلات/ التفاعلات بين الأدوية

تحتويات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء قبل العلاج بـ **ستاتور**
إحك للطبيب إذا:

- كنت تعاني من خلل في وظيفة الكبد، الكلى أو الغدة الدرقية.
- كنت تعاني من أوجاع أو من آلام متكررة أو مجهولة السبب في العضلات، أو إذا عانيت أو عانى أحد أفراد عائلتك في الماضي من مشاكل في العضلات، أو لديك سابقة لمشاكل في العضلات عند تناول أدوية أخرى لخفض الكوليسترول. يجب إبلاغ الطبيب المعالج على الفور إذا ظهرت أوجاع أو آلام مجهولة السبب في العضلات، خاصة إذا تراكمت بشعور عام غير جيد أو سخونة. يجب إبلاغ الطوب أيضاً إذا كنت تعاني من ضعف عضلي مستمر.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الوهن العضلي الوبيل (مرض يؤدي لضعف العضلات العام الذي يشمل أحياناً العضلات المستعملة في التنفس)، أو الوهن العضلي العيني (مرض يؤدي لضعف في عضلات العين)، حيث أن الستاتينات قد تؤدي أحياناً إلى تفاقم المرض أو التسبب في حدوثه (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").
- لديك ارتفاع ذات مرة طفق جلدي خطير أو قشر في الجلد، وحيصلات و/أو آلام في الفم بعد تناول **ستاتور** أو أدوية متعلقة أخرى.
- كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول بانتظام.
- كنت تتناول أدوية إضافية لخفض الكوليسترول المسماة فيبرات.

- فيوكوسوستا (لعلاج ومنع النسب المرتفعة من حمض البول في الدم).

تيريفلونوميد (لعلاج التصلب المتعدد)

أدوية لعلاج التلوثات الفيروسية، بما في ذلك الفيروس العوز المناعي المكتسب (HIV) أو التهاب الكبد (hepatitis) مع نوع C، بشكل منفرد أو بمشاركة (الرجاء أنظر فقرة "تحدريات خاصة تتعلق

بإستعمال ستاتور"): ريتونافير، لوبينافير، أتانانافير، سوفوسوفوير، فوكسيلابريفير، أومبيتاسفير، باريتابريفير، داسابوفير، فيليباتاسفير، جرازوبريفير، إلباسفير، جليكبابريفير، بيبرينتاسفير.

إن تأثير هذه الأدوية قد يتغير بالإستعمال المتزامن مع **ستاتور** أو أنها قد تغير من تأثير ستاتور.

حمض الفوسيديك (مضاد حيوي) – إذا توجب عليك تناول حمض الفوسيديك بالإعطاء عن طريق الفم لعلاج تلوث جراثومي، يتوجب عليك التوقف بشكل مؤقت عن العلاج بـ **ستاتور**. يخبرك الطبيب متى يمكن معاودة تناول الدواء. إن تناول **ستاتور** مع حمض الفوسيديك قد يؤدي

في أحيان نادرة لضعف، حساسية أو آلام في العضلات (إنحلال العضلات المخبطة). الرجاء أنظر معلومات إضافية بخصوص إنحلال العضلات المخبطة (rhabdomyolysis) في الفقرة "4"الأعراض الجانبية".

إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول **ستاتور** بدون علاقة بالطعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا يجوز تناول ستاتور إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

إذا أصبحت حاملاً خلال فترة إستعمال **ستاتور**، فتوقفي فوراً عن تناول

ستاتور وتوجه لتلقي مساعدة طبية فورية إذا لاحظت إحدى الأعراض الموصوفة في الفقرة "4"الأعراض الجانبية".

وإستئ من حمل ملائمة خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

سابقاً يمكن تشخيصه بواسطة فحص دم إعتيادي الذي يفحص تزايد في نسب إنزيمات الكبد. لذا، يطلب منك الطبيب إجراء فحوص دم لوظائف الكبد، قبل وخلال العلاج بـ **ستاتور**.

خلال فترة علاجك بهذا الدواء، يجري طبيبك متابعة حثيثة وذلك إذا كنت تعاني من مرض السكري أو كنت معرضاً لخطورة تطوير مرض السكري.

من الجائز أن تكون معرضاً لخطورة تطوير مرض السكري إذا وجدت لديك نسب مرتفعة من السكريات والشحوم في الدم، أو إذا وجد لديك وزن زائد وضغط دم مرتفع.

الأطفال والمراهقون

ستاتور غير مخصص للأطفال ومراهقين دون عمر **18** سنة.

التداخلات/ التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل أو إذا استعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

سيكلوسبوريين (يستعمل بعد زراعة الأعضاء). وارفارين، كلوبيدوجريل، كيتاجريلو (أو كل دواء آخر لتسييع الدم). فيبرات (مثل جمفيروزيل أو سخةونة. يجب إبلاغ فيبرات) أو كل دواء آخر لخفض الكوليسترول (مثل أزيثيميب).

أدوية لعلاج فساد المعدة (تستعمل كمضادات حموضة في المعدة). إريتروميسين (مضاد حيوي). حمض الفوسيديك (مضاد حيوي - أنظر أدناه وكذلك في فقرة "تحدريات خاصة تتعلق بإستعمال ستاتور").

أقرص منع الحمل.

ريجورافينيب (لعلاج السرطان).

دارولوتاميد (لعلاج السرطان).

كايامتانيب (لعلاج السرطان).

علاج هورموني بديل.

فوستاماتييب (لعلاج تعداد الصفيحات المنخفض).

- كنت تعاني من مشاكل معتدلة في الأداء الوظيفي الكلوي.

- كنت معرض لخطورة المعاناة من آلام عضلية (اعتلال عضلي).

رفع الجرعة الدوائية وجرعة دوائية يومية عظمى

من الجائز أن يقرر الطبيب رفع الجرعة الدوائية التي تتناولها لكي تتاسبك. إذا بدأت بجرعة دوائية من ستاتور 5 ملغ، فمن الجائز أن يضاعف الطبيب الجرعة الدوائية إلى ستاتور 10 ملغ، بعد ذلك إلى 20 ملغ وعند الحاجة

يرفعها إلى 40 ملغ. إذا بدأت بجرعة دوائية من ستاتور 10 ملغ، فمن الجائز أن يضاعف الطبيب الجرعة الدوائية إلى 20 ملغ، وبعد ذلك وعند

الحاجة يرفعها إلى 40 ملغ. بين كل رفع للجرعة الدوائية يكون هناك فاصل زمني قدره 4 أسابيع. إن الجرعة الدوائية العظمى اليومية هي 40

ملغ وتعطى عادة لمرضى لديهم نسب مرتفعة جدا من الكوليسترول وخطورة مرتفعة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وذلك عندما لا تنخفض بشكل كاف نسب الكوليسترول بإستعمال جرعة دوائية ذات 20 ملغ.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

إذا تم تناول مضادات الحموضة من نوع أملاح الألومنيوم أو المغنيزيوم، يجب تناول **ستاتور** على الأقل ساعتين قبل تناول مضادات الحموضة من نوع أملاح الألومنيوم/المغنيزيوم.

يجب فحص نسب الكوليسترول بشكل دائم، للتأكد من بلوغ الكوليسترول لديك للنسبة المرغوبة وبأنه يتم الحفاظ على هذه النسبة.

من الجائز أن يقرر الطبيب رفع المقدار الدوائي للمستحضر من أجل أن تحصل على الكمية اللائمة لك من **ستاتور**.

بالإمكان تناول الدواء في أي ساعة من اليوم مع أو بدون طعام.

يوصى بتناول الدواء يوميا في ساعة محددة.

يجب بلع الأقرص بشكلها الكامل مع الماء.

لا يجوز شطط ستاتور 15 إذا دعت الحاجة بالإمكان شطر **ستاتور 10، ستاتور 20 وستاتور 40** للإستعمال الفوري.

لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

السياقة وإستعمال الماكناات

يماكان غالبية المتعاملين سياقة المركبات وتشغيل الماكناات أثناء إستعمال **ستاتور** – لن يضعف الدواء من كفاءتهم في إجراء هذه النشاطاات. لكن قد يشعر بعض المتعاملين بدوار خلال إستعمال **ستاتور**. إذا شعرت بدوار

فعليك التوجه للطبيب قبل تشغيل الماكناات أو سياقة المركبة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لكتوز. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة (لكتوز أو سكريات الحليب)، فإستشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء. "معلومات إضافية"

الأعراض التي تقتضي إهتماماً خاصاً، توقف عن العلاج بـ ستاتور وتوجه للطبيب فوراً إذا:

وجدت لديك واحدة من ردود الفعل لفرط الحساسية (اليرجيا) التالية:

صعوبة في التنفس مع أو بدون إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان و/أو في الحنجرة.

- إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان و/أو في الحنجرة، الذي قد يسبب صعوبات في البلع.

- حكة حادة في الجلد (مع ظهور حويصلات بارزة).

- قيع مائلة للون الأحمر غير بارزة، شبيهة بالهدف أو دائرية على الجسم، أحيانا مع حويصلات في المركز، تقشر للجلد، تقرحات في الفم، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية وفي العينين. يمكن أن يسبق حالات الطفح الجلدي الخطيرة هذه سخونة وأعراض طفح مثير للإنتفاخ(أو متلازمة ستيفنس - جونسون).

مشكلة متفشية، سخونة مرتفعة وتضخم الغدد الليمفاوية (متلازمة DRESS أو متلازمة فرط الحساسية للدواء).

كانت لديك آلام في العضلات وآلام غير إعتيادية، التي تستمر لفترة أطول من المتوقع. كما هو الحال مع ستاتينات أخرى، لقد عانى عدد قليل من المتعاملين من تأثير غير مستحب في العضلات، وفي أحيان نادرة تحول هذا العرض لأمر يشكل خطراً على الحياة، بلحق الضرر بالعضلات ويعرف باسم إنحلال العضلات المخبطة (rhabdomyolysis).

وجد لديك تمزق في العضل.

وجدت لديك متلازمة شبيهة بالذئبة (lupus-like disease syndrome) (بما في ذلك طفح، إضطرابات في المفاصل وتأثير على خلايا الدم).

تضخم الصدر لدى الرجال (gynecomastia).

أعراض جانبية شيوها غير معروف (أعراض شيوها لم يحدد بعد):

وجدت لديك متلازمة شبيهة بالذئبة (lupus-like disease syndrome) (بما في ذلك طفح، إضطرابات في المفاصل وتأثير على خلايا الدم).

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

صداع.

آلام في البطن.

إسهال.

الشعور بوعكة.

آلم في العضلات.

ضعف عام.

دوار.

إرتفاع في كمية البروتين في البول - هذه عادة إلى المستوى الطبيعي بدون حاجة للتوقف عن تناول المستحضر (فقط بخصوص **ستاتور 40** ملغ).

سكري - إن الخطورة في أن يتطور لديك مرض السكري تكون أكبر إذا كان لديك إرتفاع في نسب الشحوم والسكر في الدم، لديك وزن زائد وضغط دم مرتفع. عليك الخضوع لمعاينة طبية خلال فترة العلاج.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

رد فعل تحسسي خطير حيث أن علاماته تشمل: إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحنجرة، صعوبة في البلع والتنفس، حكة خطيرة في الجلد (مع حويصلات بارزة). إذا كنت تعتقد بأن لديك رد فعل تحسسي،

يعدبا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي 119098010

119098010

توقف عن تناول **ستاتور** وتوجه فوراً لتلقي مساعدة طبية.

تضرر العضلات لدى كبار - إحتياطاً، توقف عن تناول **ستاتور** وتحدث

مع طبيبك فوراً إذا شعرت بأوجاع أو آلام عضلية غير إعتيادية التي تستمر لفترة أطول من المتوقع.

آلم شديد في البطن (التهاب البنكرياس).

أرتفاع في إنزيمات الكبد في الدم.

نزف أو ميل زائد لحدوث كدمات بسبب إنخفاض نسب الصفيحات في الدم.

متلازمة شبيهة بالذئبة (lupus-like disease syndrome) (بما في ذلك طفح، إضطرابات في المفاصل وتأثير على خلايا الدم).

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

التهاب الكبد (إصفرار الجلد والعينين).

آثار دم في البول.

ضرر للأعصاب في الذراعين وفي الرجلين (مثل خدر أو شعور بتمثل).

آلام مفصليّة.

فقدان الذاكرة.

تضخم الصدر لدى الرجال (gynecomastia).

أعراض جانبية شيوها غير معروف (أعراض شيوها لم يحدد بعد):

إسهال.

سعال.

ضيق تنفس.

وذمة (إنتفاخ نتيجة تراكم سوائل).

إضطراب في النوم، يشمل أرق وكوابيس.

مشاكل في الأداء الجنسي.

اكتئاب.

مشاكل تنفسية تشمل سعال متواصل و/أو ضيق في التنفس أو سخونة.

إصابة في الوتر.

ضعف عضلي دائم.

الوهن العضلي الوبيل (Myasthenia gravis. مرض يؤدي لضعف العضلات العام وفي بعض الحالات أيضاً لضعف العضلات المشاركة في التنفس).

الوهن العضلي العيني (مرض يؤدي لضعف في عضلات العين).

إستشر طبيبك إذا كنت تقاسي من ضعف في الذراعين أو في الرجلين والذي يتفاقم بعد فترات من النشاط، رؤية مزدوجة أو تدلي الجفون،

صعوبة في البلع أو ضيق في التنفس.

إذا تظهر عرض جانبي، إن تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم.م.ض."

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمس! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي

إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Microcrystalline cellulose, Lactose anhydrous, Magnesium oxide heavy, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Opadry white, Opadry brown, Opadry yellow.

كل قرص من **ستاتور 5** يحتوي على 14.5 ملغ لكتوز.

كل قرص من **ستاتور 10** يحتوي على 29 ملغ لكتوز.

كل قرص من **ستاتور 20** يحتوي على 58 ملغ لكتوز.

كل قرص من **ستاتور 40** يحتوي على 116 ملغ لكتوز.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

ستاتور معبأ داخل لوحيات (بإبسترات) التي يتم إدخالها داخل علبة كرتون. تتوفر لـ **ستاتور** أحجام علب ذات 7، 10، 14، 21، 28، 30 قرصاً.

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

ستاتور 5 هي أقرص مطلية مستديرة، لونها بيج، محببة الجانبين، **ستاتور 10** هي أقرص مطلية مستديرة، لونها بيج، محببة الجانبين، مع خط للشطر في جانب واحد.

ستاتور 20 هي أقرص مطلية مستديرة، لونها بيج، محببة الجانبين، مع خط للشطر في جانب واحد.

ستاتور 40 هي أقرص مطلية مطاولة، لونها بيج، محببة الجانبين، مع خط للشطر في جانب واحد.

إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم م.ض.، ص.ب. 21429، تل أبيب، 6121301.

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض.، بارك الصناعة "مافو كرمل".

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ستاتور 5: 143 12 33069 02

ستاتور 10: 143 13 31932 02

ستاتور 20: 143 14 31933 02

ستاتور 40: 143 15 31934 02

تم إعدادها في شباط 2024 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين

لمزيد من المعلومات حول المستحضر والنشرات المحدّثة باللغات العبرية، العربية والإنجليزية، قوموا بمسح الكود التالي:

For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:

ستاتور 10 (Stator 10):