

אפקטול 250 מ"ג

గרגנוות באיזיות אישיות

הרכב

כל ארזה אישית מכילה:

פראצטמול 250 mg (Paracetamol 250 mg)

למיידע על מריכבים בלתי פעלים ואלרגנים בתכשיך: ראה סעיף 2 - "מיידע

חשיבות על חלק מריכבי התרופה" סעיף 6 - "מיידע נסוף".

קיים בעין את העלוון עד סופ' בטמת תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מיידע נגמץ' על הרופאה. אם שך לרשות נסופות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת לילדים מגיל 2 שנים ומעלה. עליך ליטול את התרופה על פי

התהווות אספליין המביבן עלון זה. היושע ברוקח אם יזכיר ליטול נסוף.

יש לפנות לרופא אם החום מושך יותר מ- 3 מ'ים או אם סטמי המחלת

סימפטומטיים מחמירים או אין חולפים תוך 5 מ'ים, למרות השימוש בתרופה.

1. מה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ומוריד חום.

משכך כאבים ומוריד חום.

2. לפני השימוש בתרופה:

אי להשתמש בתרופה אם:

- ATA רג'יס (אלרג') לפראצטמול או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

اذירות מיוחדות המוגעות לשימוש בתרופה:

- אם פחתת בערב תופעות לאויר תופעות מתואזרת תכשיך המיכלים פראצטמול, אין ליטול תכשיך המיכלים שופעת עוריות חמורות.

* אם כהיר מכיל פראצטמול, עלול לגרום לנקב בכבד כאשר:

- ניתן במינון הנומולץ או לתוכפה ממושך

* במניט פיטול שותם נסופות המשפשעות על תפוקד הכבד.

* אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות מבלי היועץ ברופא.

- אין ליטול תרופות נסופות מ- "משפחת אקמול" או תכשיך המיכלים ללא התיעצויות עם רפואי או רוקח, למינעת מין יתר או הרעה של הצענותם.

- אין מושיע מליקית מין גובה (גם אם בתוך טווח המינון המומלץ) של תרופה זו בזמן כו.

לפקי התחלת הטיפול באקמול, ספר לרופא אם אתה (או ילך) סובל או

כבלת עבר:

- רג'ישות לחץ כלשהו או לתרופה כלשהי

* מחלת כבד או ליקוי בתפקוד הכבד

* ליקוי בתפקוד הכליה

* אלכוהוליזם

* צהבת

* אם את בהירין או מניקה

ילדים ונתבגרים

- תרופה זו או מיעדר לילדים מגיל 4 שנים ומעלה, ראה סעיף 3 – "יצד תשמש בתרופה?"

על ההורים לדוחו לרופא המטפל על כל תופעות הלוואי וכן על כל תרופה נסופה הניתנתילד.

תגובה בגין-תרופתיות:

אם אתה אודק או לך לחות לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות לא:

* תרופות נגד קריישט דם כגון וופרין

* תכשיך המזרדים יצור אנדמיים בכבד (לדוגמה: ריפמפיקין, ברביטוריטים)

* תרופות לאפליפילין – פוטיאזין, קרבצטפין

* תכשיך נוגדי דלקת שאים טרואידים וטולופרמיד או דומפראידן (טיפול בחילה, הקאה וביעות עיקול נסופת)

* קלורופנקיל (אנטיביטוקה)

* פוטובנדי (טיפול בשידוד)

* ליוקטראמין (להחפתת ריר שומניים בדם)

- פוקולוקאצילין (אנטיביטוקה). קיטין הופיעות בדם ובנווזל הגוף (חמצת מטבולית עם כוחים עם פגיעה לכלי-הדם המזרחי, אלין דם (צב המחיב טיפול דוח), עלול לקות בכוחיד בחולמים עם מינאים בדם ומוביילים לפחות באיברים), לת תזונה, אלכוהולים רוכין ובישמש במינון מוגטימייל של פראצטמול.

שימוש בפראצטמול ורכרכת לכחול

אין לצורך אלכוהול בזמן הטיפול בפראצטמול בגלל עלייה בסיכון לנזק לכבד.

הירין והנקה

אם יזכיר בהירין או מניקה לשהיועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

ש请你 ליטול את הקוצר ביוטר האפשר. היועץ ברופא אם אין הקלה בכאב או בחום או אם את צריכה ליטול את התרופה על ידי תכופות תכופות יותר.

הגבוק

תמכה בתרופה נסופה של פראצטמול עבורות לחלב אם. לשהיועץ ברופא לפני השימוש.

הירגה ושימוש במוניות

פראצטמול אין שפע על היכולת להרגז או להפעיל מכונות.

מיידע חשוב על חלק מריכבי התרופה

- מכיל סורביטול בכמות של 601 מ'ג בכל ארזה אישית. سورביטול הוא מקור

לפרוקטוז. אם יזכיר אורה לר סר (או ילך) ומה שורות סופר זר (HFI), מצב גנטני דבר של

איך יולת פפרקוטז, לשהיועץ ברופא לפני השם. سورביטול עלול לגרום לכאבים בסיסים וחלש.

לגרום לכאב בסיס וחלש.

- מילוי סורז. אם אמר לך על ידי הרופא כי אתה (או ילך) רגש לסתורים

מסוכרים, היועץ ברופא לפני נטילת התרופה זו.

3. כיצד תשמש בתרופה?

- מכל סולפיטים. עלולים לגרום לעיתים רחוקות לתגובה הגישה יתר חמורה לאירועים כבוגרים וילדים (עד גיל 4 שנים):

אירוע אישיות אחד של אבקמול 250 מ'ג כל 4-6 שעות, לפחות, לפני ה壯ור.

אין ליטול יותר מ-4 אריזות אישיות ביום (גרם פראצטמול).

4. תופעות לוואי:

עליך ליטול לרופא אם החום מושך יותר מ- 3 מ'ים או אם תסמי המחלת (סימפטומטיים) מחמירים או אין חולפים תוך 5 מ'ים, למרות השימוש בתרופה.

אוף השימוש:

אין לחתה עם מזון. יש לפתח את הארזה האישית של אבקמול 250 מ'ג, לרוקן את תוכחה ישירות לתוך הפה, על הלשון, ולבלוע. אין צורך בכך.

אם נטלה מזון יתר או אם בטשות בעל יילן התהוופה, פה מיד לגרום לתקאה לאלה תרואה מופרשת מהרופה. גם אם הרגתשן טוביה, טיפול מיידי הוא חיוני, במליל התיכון להתקפתות נזק מזור לבבד. תופעות לוואי יכולות להיות כבילה ותקאה, שלשול, אובדן תיאבו, כאבי בטן, נפיחות, הדעה מוגברת, כאב או

ריגשות בطن העלייה/וינו/וינק שנן לא משקפות את חומרת הדק לבבד.

אין ליטול תופעות בחושך! בזק התהוופה והמנה **בכל פעם** שהירק נטול.

אם שאלות נוספות נסופות בוגע בשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

5. איך לאחסן את התרופה?

שיש להפקיד את הפעיל והנוסף לרופא מידי:

• אם מופעות תגובות אלרגיות חריפות כגון התנפחות היפות, השפעות, הריגשה, והשלשון או אף עליה.

• אם מופעות, כולל ברקרים דיריטם, מחלות עור חמורות שלחן יוכלים נסימנה או ביליה.

• אם מופעות, שיטוות או פגיעה עורית נורית נורית.

• אם מופעים סימנים של שיינרים מבערת הדם כגון: דימומים, הופעת חבורות נוריות, עישות מתמשכת, התפתחות דלקות ביצור (למשל כאבי גרון) נצצהה מרידת חמורה בחספור תא הדם הלבני.

• אם מופעים סימניים של שיינרים מבערת הדם כגון: דימומים, הופעת חבורות נוריות, עישות מתמשכת, התפתחות דלקות ביצור (למשל כאבי גרון) נצצהה מרידת חמורה בחספור תא הדם הלבני.

• אם מופע קוצר נשימה (דידי).

• אם מופעות בעיות נשימה. יש שוכר שירקו אם חווית עבר בעיות נשימה בעיתות מחלת, ירידת פטאומיה במישקל, אובדן תיאבו והצחבה של העיניים והעור.

אם הפעילה תופעת לוואי, אם אתה מטופעת הלוואי חמירה, או כאשר אתה

ובגל תופעת לוואי שאלא צינה בעلون, עליך להתייעץ עם הרופא.

דוחות על תופעות לוואי:

יינתן לדוחות על תופעות לוואי עוקב טיפול התרופה דם גונג היחה על הקישור

"זיווח על תופעות לוואי עוקב טיפול התרופה" שמנצאת בדף התרופה (www.health.gov.il) המפנה לטלפון המזקן לדווח על תופעות לוואי.

או על-ידי"כ" כיסיה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור, מחוץ

לילדים ומושך אליו עוקב תרופה מופרשת מרפואת (שקיות) מאלומיניות. אל-

תגרום להקצר לאלא תרואה מופרשת מרפואת.

• אין להשתמש בתרופה מתייחסים לילם לאחר הרוגה (הטוף על גביה).

• יש לאחסן מתחת ל- 25°C באירוע המקורית, כדי להגן מפני ולחות.

6. מידע נוסף:

נכס על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sorbitol, talc, basic butylated methacrylate polymer, strawberry flavor, vanilla flavor, magnesium oxide, carmellose sodium, sucralose, magnesium stearate, hypromellose, stearic acid, sodium laurisulfate, titanium dioxide, simeticone.

7. כיסיה וניהול:

כיסיה נורית התרופה ומה תונן הארזה:

קופסת אבקמול 250 מ'ג מכילה אריזות אישיות (שקיות) מאלומיניות. כל

ארזה אישית אחת של התרופה בפנסק התהוופה הממלכית במשרד הבריאות.

ממסר ראשם התרופה בפנסק התהוופה הממלכית במשרד הבריאות:

עלון זה נערך בדצמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

148.51.33446

שם היצרן וגעל הרישום וכנתבון:

טבר ישראל בע"מ, רוחוב הדורה הבניה 124, תל אביב 6944020

לשם הפטשות והקלת הקריהה, עלון זה נגיש בלשון זכר. על אף זאת, התהוופה

מיידע רצפת לבני שנוי המינים.

DOR-Avcamol-250mg-PIL-1223-08