

فأرامل، حبسولات، 500 ملغ

تحتوي كل حبسولة على 500 ملغ من الباراسيتامول (Paracetamol) 500 ملغ. المواد غير الفعالة ومبيبات الأروحية في الدواء - النظر البند 6 "معلومات إضافية" في البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".
أقرأ النشرة باصباح حتى تتفهم قبل تناولك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يعطى هذا الدواء (للتسويق العام) دون الحاجة إلى وصفة طبية وهو مخصص للبالغين. يجب عليك استعمال الدواء وفقاً للتعليمات المذكورة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.
يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتأثر خلال 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لتسكين الآلام ولخفض الحرارة (الحمى) الناتجة عن أسباب مختلفة، مثل الصداع، آلام الأسنان، الزكام، الإنفلونزا، الآلام الروماتيزية وآلام الحوض.
الفصيلة العلاجية: مسكن للآلام وخافض للحرارة.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أروحية) للمادة الفعالة (باراسيتامول) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء
إذا نشأت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لاستعمال مستحضرات تحتوي على باراسيتامول، فلا يجوز استعمال المستحضرات التي تحتوي على باراسيتامول، كي لا تسبب أعراضاً جلدية خطيرة مرة أخرى.
يحتوي المستحضر على باراسيتامول، الذي قد يسبب ضرراً للكبد عندما:
○ يعطى جرعة دوائية أعلى من الجرعة الموصى بها أو لفترة مطوّلة.
○ يتم شرب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.
○ يتم استعمال أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.
لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة دون استشارة الطبيب.

لا يجوز استعمال أدوية إضافية لخفض الحرارة وتسكين الآلام أو أدوية للألم دون استشارة الطبيب، والصيدلي وذلك لمنع فرط الجرعة الدوائية أو التسبب من باراسيتامول.
لا يجوز استعمال الأدوية إضافية من فصيلة بارامول وآل مستحضرات إضافية تحتوي على باراسيتامول.
يجب الامتناع عن استعمال جرعة دوائية عالية (ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.

أخبر الطبيب قبل البدء بالعلاج إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من:
• حساسية لغذاء ما أو لدواء ما.
• مرض في الكبد أو خلل في وظيفة الكبد.
• خلل في وظيفة الكلية.

- الكحولية.
- اليرقان.
- إذا كنت حاملاً أو مرضعاً.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:
• أدوية مسددة لتخثر الدم، مثل وارفارين.
• مستحضرات تخثر إنتاج الأنزيمات في الكبد (على سبيل المثال: رفابميسين، باريتوترا).
• أدوية للتصرح - ميتوغلين، كاربامازيبين.
• مستحضرات مضادات التهاب الستيرويدية.
• ميتوكلوراميد أو ديميدريدون (لعلاج الغثاين، التقيؤ ومشاكل الهضم الأخرى).
• كورامفيتول (مضاد حيوي).
• بروفينيسيد (لعلاج الفرس).

• كوليستيرامين (التقليل لفرط البهتات في الدم).
• فلوكسالوسيلين (مضاد حيوي)، بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي السوائل (High anion gap metabolic acidosis).
• ما يستوجب العلاج المستعمل، وقد يحدث خاصة في حالات التضرر الكلوي الخطير، الإلتان (وضع تتواجد فيه الجراثيم وموسوماها في الدم وتؤدي إلى تضرر الأعضاء)، سوء التغذية، الكحولية المزمنة، وفي حالات شُبعول فيها الجرعة اليومية القصوى من باراسيتامول.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بالباراسيتامول بسبب الارتفاع في خطر حدوث ضرر للكبد.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً فطبعك استشارة الطبيب قبل البدء باستعمال الدواء.

الحيل:

يجب تناول أقل جرعة فعالة بالنسبة لك لتسكين الألم أو لخفض الحرارة، ولا تطرح دقة زمنية لمكثى استشرى الطبيب إذا لم يضر أحد فضع للألم أو للحمى. أو إذا كان عليك استعمال الدواء في أحيان أكثر تقرباً.

الإرشاح:

تنتقل كميات صغيرة من باراسيتامول إلى حليب الأم. يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.

السيفاق واستعمال الماكينات

لا يؤثر باراسيتامول على الفترة على السيفاق في الماكينات.

الأولاد

هذا الدواء، للتسويق العام، مخصص للبالغين، انظر البند 3.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على sunset yellow FCF (E110) -aluminium lake الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.
يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليون من الصوديوم (23 ملغ) في كل حبسولة، يعني أنه عالياً "خال من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.
عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب، الجرعة الدوائية المتبعة عادةً هي:
• البالغون: حبسولة/حبسولتان (1-2 حبسولات) كل 4-6 ساعات بحسب الحاجة. يُمنع تجاوز جرعة دوائية من 8 حبسولات في اليوم.
• يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتأثر خلال 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

كيفية تناول:

يجب بلع الدواء مع القليل من الماء. يُسمح بشطر الحبوبلات. لا تتوفر معلومات بخصوص المضغ أو الهرس.

إذا تناولت جرعة دوائية أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. لا تتأثر التقيؤ بعد تعليمات صريحة من الطبيب؛ حتى لو كان شعورك جيداً، فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب خطر ضرر شديد للكبد. قد تكون الأعراض الجانبية عبارة عن غثاين وتقيؤ، إسهال، فحان الشبيهة، آلام في البطن، انتفاخ، تعرؤ متراً، آلام أو حساسية في الجزء العلوي من البطن وقد لا تعكس هذه الأعراض شدة الضرر للكبد.

لا يجوز تناول الأدوية في العمدة! راجع الملصق وتكلم مع الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواءً. ضع النشرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال فأرامل إلى نشوء أعراض جانبية مثل الوار، عند بعض المستعملين. لا تتلق عن قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.
قد تكون الأعراض الجانبية أكثر خطورة لدى المسنين.

أعراض جانبية خطيرة:

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب عند ظهور:

- ردود فعل تحسسية حادة مثل الطفح الجلدي والحكة، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحلق، مما قد يؤدي إلى صعوبات في التنفس أو البلع، انتفاخ الأطراف.
- في حالات نادرة، أمراض جلدية حادة قد تكون علامتها: الاحمرار، الطفح الجلدي، الحوصلات، التضرر الجلدي الموضعي. قد تظهر الأعراض الجانبية الجلدية الحادة أيضاً إذا استعملت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركب الفعال الباراسيتامول دون حدوث مشاكل.
- إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، فيجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري.
- علامات على حدوث تغيرات في الجهاز الهضمي مثل: حالات نزيف دموي، ظهور كميات بسهولة، مثل مواصل، تطور التهابات بكتيرية أكثر (مثلاً الأم في الحلق) نتيجة لانخفاض خطير في عدد خلايا الدم البيضاء.
- ضيق التنفس (نادر).
- مشاكل في التنفس. على الأرجح أن تحدث إذا نشأت لديك في الماضي مشاكل في التنفس عند استعمال مسكنات أخرى للآلام مثل إيبوبروفين والأمبيرين.
- غثاين، انخفاض فحان في الوزن، فحان الشبيهة واصفرار العينين والجلد.

إذا ظهر عرض جانبي، أو تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فطبعك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دعونا نعلم" (www.health.gov.au) والذي يوجه إلى الاستمارة في الصفحة الزمنية لموقع وزارة الصحة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق

الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسبب هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأول الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستضمن التسبب. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (التاريخ (تفوه) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- ظروف التخزين: لا يجوز التخزين فيما يزيد عن 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Povidone, hypromellose, titanium dioxide (E171), croscarmellose sodium, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF aluminum lake (E110), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

حبسولة متطابقة صفراء اللون مع خط للسطح في كلا الجانبين.

أحجام العبوة المصالح عليها (للتسويق العام): 8، 16 حبسولة. قد لا تتوفّر جميع أحجام العبوات.

تم تحرير النشرة في كانون الأول/ديسمبر 2023 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 127-96-30764-00

من أجل التبسيط وتسهيل الفراء، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المتكرر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكل الجنسين.

المضغ ومصالح التسجيل:

بشكل مرض، شارع بكميل 1، أور عاكفا 3060000، إسرائيل