

دكسامول، حبسولات، 500 ملغ

تحتوي كل حبسولة من پاراسيتامول (Paracetamol) 500 ملغ المواد غير الفعالة ومبيبات الأروحية في الدواء - انظر البند 2 "معلومات إضافية" في البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".
افرا الشرة باعمان حتى نهائية قبل استعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا تورفت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يعطى هذا الدواء (للتسويق العام) دون الحاجة إلى وصفة طبيب وهو مخصص للبالغين. يجب عليك استعمال الدواء وفقاً للتعليمات المذكورة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء". في هذه النشرة استمر الصيدلي الذي كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.
يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقت الأعراض أو لم تتلاش خلال 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لتسكين الألم ولخفض الحرارة (الحمى) الناتجة عن أسباب مختلفة، مثل الصداع، الألم الأسنان، الزكام، الإنفلونزا، الألم الروماتيزمية وآلام العضل.
الفصلية العلاجية: مسكن للألم وخفض للحرارة.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أروحية) للمادة الفعالة (پاراسيتامول) أو لأي من المركبات الإضافية التي تحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء
إذا نشأت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لاستعمال مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فلا يجوز استعمال المستحضرات التي تحتوي على پاراسيتامول، كي لا تسبب أعراضاً جلدية خطيرة مرة أخرى.
يحتوي المستحضر على پاراسيتامول، الذي قد يسبب ضرراً للكبد عندما:

- يعطى جرعة دوائية أعلى من الجرعة الموصى بها أو لفترة مطوّلة.
- يتم شرب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.
- لا يجوز استعمال دوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة دون استشارة الطبيب.
- لا يجوز استعمال دوية إضافية لخفض الحرارة وتسكين الألم أو دوية الزكام دون استشارة الطبيب، والصيدلي وذلك لمنع فرط الجرعة الدوائية أو التسمم من پاراسيتامول.
- لا يجوز استعمال الدوية إضافية من فصيلة دكسامول (وأي مستحضرات إضافية تحتوي على پاراسيتامول).
- يجب الامتناع عن استعمال جرعة دوائية عالية (ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.

أخبر الطبيب قبل البدء بعلاج إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من:

- حساسية لغذاء ما أو لدواء ما.
- مرض في الكبد أو خلل في وظيفة الكبد.
- خلل في وظيفة الكلى.

- الكحولية.
- اليرقان.
- إذا كنت حاملاً أو مرضعاً.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأكبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:

- أدوية متصادمة لتخثر الدم، مثل وارفارين.
- مستحضرات تخثر إنتاج الإنزيمات في الكبد (على سبيل المثال: ريفامبين، ريبونوترال).
- أدوية الصرع - فينيتوين، كاربامازيبين.
- مستحضرات مضادات الالتهاب الستيرويدية.
- ميتوكلوراميد أو ديميدريدون (لعلاج الغثيان، القيء ومشاكل الهضم الأخرى).
- كلورامفينول (مضاد حيوي).
- بروبينيد (العلاج الفكري).
- كوليستيرامين (التقليل لفرط الدهون في الدم).
- فلوكساسولين (مضاد حيوي)، بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي الكلى (High anion gap metabolic acidosis).

مما يسبب أعراض التشنج الكلوي الحاد، (وضع) تتواجد فيه البروتينات ومسموماً في الدم وتؤدي إلى تضمر الأعضاء)، سوء التغذية، الكحولية الزمّنة، وفي حالات تُستعمل فيها الجرعة اليومية القصوى من پاراسيتامول.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بپاراسيتامول بسبب الارتفاع في خطر حدوث ضرر للكبد.

الاحتياطات

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً فطبعك استشارة الطبيب قبل البدء باستعمال الدواء.

الحمل:

يجب تناول أقل جرعة فعالة بالنسبة لك لتسكين الألم أو لخفض الحرارة، لأقصى مدة زمنية ممكنة. استشر الطبيب إذا لم يطرأ تحسّن خلال أو للحمى أو إذا كان عليك استعمال الدواء في أحيان أكثر تقارباً.

الإرضاع:

تنتقل كميات صغيرة من پاراسيتامول إلى حليب الأم. يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.

السياقة واستعمال الماكينات

لا يؤثر پاراسيتامول على القدرة على السياقة أو تشغيل الماكينات.

الأولاد

هذا الدواء، للتسويق العام، مخصص للبالغين، انظر البند 3.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على sunset yellow FCF (E110) aluminum lake الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية. مسكّنات أخرى للألم مثل إيبوبروفين والأسيتامين.

عُثِرَ انخفاض فحائي في الوزن، فدان الشبيهة واصفرار العينين والجلد.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية تناول الدواء.
عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب، الجرعة الدوائية المستحقة عادةً هي:
• البالغون: حبسولة/حبسولتان (1-2 حبسولات) كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. يُمنَع تجاوز جرعة دوائية من 8 حبسولات في اليوم.
• يُمنَع تجاوز الجرعة الموصى بها.

عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقت الأعراض أو لم تتلاش خلال 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

كيفية تناول:

يجب بلع الدواء مع الفيل من الماء. يُسمح بشطر الحبوبلات. لا تتوفر معلومات بخصوص المضغ أو الهرس.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخبر صديق عربة الدواء، لا تسبق التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب؛ حتى لو كان مشوك جدياً، فإن العلاج الثوري ضروري، بسبب خطر تطور ضرر شديد للكبد. قد تكون الأعراض الجانبية عبارة عن غثيان وتقيؤ، إسهال، فدان الشبيهة، الألم في البطن، انتفاخ، تعرّق مفرط، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن وقد لا تمكّن هذه الأعراض شدة الضرر للكبد.

لا يجوز تناول الأدوية في التعمّد! راجع الملصق وتأكّد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا تورفت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال دكسامول إلى نشوء أعراض جانبية مثل الدوار، عند بعض المستعملين. لا تتلقّى عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.
قد تكون الأعراض الجانبية أكثر خطورة لدى المسنّين. أعراض جانبية خطيرة:

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب عند ظهور:

- ردود فعل تحسسية حادة مثل الطفح الجلدي والحكة، انتفاخ الوجه، التشنج، السعال، الحلق، مما قد يؤدي إلى صعوبات في التنفس أو البلع، انتفاخ اللسان.
- في حالات نادرة، أمراض جلدية حادة قد تكون علائها: الاحمرار، الطفح الجلدي، الحبوبلات، التضمر الجلدي المومع. قد تظهر الأعراض الجانبية الجلدية الحادة أيضاً إذا استعملت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركب الفعال پاراسيتامول دون حدوث مشاكل.
- إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، فيجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري.
- علامات أو حدوث تغيرات في الجهاز الدوري مثل: حالات زيف دموي، ظهور كميات بسهولة، تعب متواصل، تطور التهابات بسهولة أكبر (مثلاً الأم في الحلق) نتيجة لانخفاض خطير في عدد خلايا الدم البيضاء.
- ضيق التنفس (نادر).
- مشاكل في التنفس. على الأرجح أن تحدث إذا نشأت مثلك في الماضي مشاكل في التنفس عند استعمال مسكّنات أخرى للألم مثل إيبوبروفين والأسيتامين.
- غثيان، انخفاض فحائي في الوزن، فدان الشبيهة واصفرار العينين والجلد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فطبعك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دواء لا توفرت لرواها" عقب تسجيل موقع وزارة الصحة في الصفحة الرئيسية للوزارة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق

كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأول الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستعنى التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تأريخ الصلاحية) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من مجال رؤيتهم.
- ظروف التخزين: لا يجوز التخزين فيما يزيد عن 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Povidone, hypromellose, titanium dioxide (E171), croscarmellose sodium, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF aluminum lake (E110), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

حبسولة مطوّلة صفراء اللون مع خط للسطح في كلا الجانبين.

أحجام العبوة المصاحبة عليها (للتسويق العام): 8، 16 حبسولة. قد لا تتسوّق جميع أحجام العبوات. تم تحرير النشرة في كانون الأول/ديسمبر 2023 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 0394-25921-06

من أجل التبسيط والتسهيل الفزارة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المصنع وصاحب التسجيل:

دكسل م.ض.

شارع دكسل 1، أور عاكباً 3060000، إسرائيل