

1. למה מיועדת התרופה?

טרוספומילט 20 מ"ג מכילה את החומר הפעיל Trospium chloride ומשמשת להרפיה של שלפוחית השתן.

התרופה ניתנת לטיפול בתסמינים הקשורים בבריחת שתן בלתי רצונית (הרטבה) ו/או תכיפות גבוהה במתן שתן ודחף למתן שתן אצל מטופלים הסובלים מפעילות יתר של שלפוחית השתן (פעילות יתר בשריר השלפוחית ממקור עצבי או ממקור לא ידוע).

קבוצה תרפיטית: אנטי-כולינרגי אנטי-מוסקרני.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה (רגישות לתרופה עלולה לקבל ביטוי כפריחה, גרד או קוצר נשימה) – לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6.
- הנ סובל מאצירת שתן (ההשתנה מתרחשת בתדירות נמוכה יותר מהרגיל).
- הנ סובל מגלאוקומה צרת זווית.
- הנ סובל מקצב לב מהיר מהרגיל.
- הנ סובל מחולשת שרירים חמורה (מיאסטניה גרביס).
- הנ סובל מבעיות חמורות במערכת העיכול כגון Toxic megacolon

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בטרוסומילט 20 מ"ג, ספר לרופא אם:

- הנ סובל מכל סוג של חסימה בקיבה או במעיים.
- הנ סובל מחסימה בדרכי השתן ו/או מזרימת שתן לקויה (הפרעות בערמונית אצל גברים).
- הנ סובל מנירוספטיה (זק עצבי).
- הנ סובל מבקע סרעפתי עם חוזר (רפלוקס) ושטי המלווה בדרך כלל בצרבת המחריפה במצבים של שכיבה או התכופות.
- הנ סובל מפעילות יתר של בלוטת התריס.
- הנ סובל מבעיות בלב כגון מחלית לב כללית או אי ספיקת לב.
- הנ סובל ממצב בו קצב לב מהיר עשוי להיות מסוכן לך כגון פעילות יתר של בלוטת התריס (היפרתירואידיזם).
- הנ סובל מבעיות כבד.
- הנ סובל מחלוצה מבעיות בכליות.

מטופלים עם תפקוד כבדי לקוי

אין לעשות שימוש בתרופה במידה והנך סובל מהפרעת כבד חמורה. במידה והנך סובל מליקוי כבד קל עד בינוני יש לפנות לרופא שלך לפני התחלת השימוש בתרופה.

מטופלים עם תפקוד כליתי לקוי

במידה ואתה סובל מבעיות בכליות ספר לרופא שלך לפני התחלת השימוש בתרופה. הרופא שלך, במידת הצורך, ירשום לך מינון נמוך יותר (ראה סעיף 3 "כיצד שתמש בתרופה", תחת "במטופלים הסובלים מבעיות בכליות").

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

- תרופות לטיפול במצבי דיכאון (לדוגמה אמיתרפילטין או אימיפראמין).
- תרופות לטיפול באסתמה אשר עלולות להחיש את קצב הלב (לדוגמה, סילבוסטמול).

- תרופות אחרות עם פעילות אנטיכולינרגית (לדוגמה תרופות המשמשות לטיפול במחלת הפרקינסון, באסתמה ובהתכווצויות בקיבה).

- תרופות להרצמת פעילות מערכת העיכול המשמשות לטיפול בעיכוב ריקון הקיבה או בהחזר קיבתי־ושטי (רפלוקס) של חומצת הקיבה (לדוגמה מטקולופראמיד).

- תרופות המכילות את החומרים גואר (Guar), כולסטיפול או כולסטיראמין אשר אין לעשות בהן שימוש במקביל לשימוש בטרוסומילט 20 מ"ג.

השימוש בטרוסומילט 20 מ"ג עלול לגרום לתרופות אחרות לא לעבוד כראוי.

אם אינך בטוח לגבי סוג התרופות אשר אתה נוטל, התייעץ עם הרופא או הרוקח.

שימוש בתרופה ומזון

דיאטה עשירה בשומנים עשויה להשפיע על הפעילות של טרוסומילט 20 מ"ג.

יש ליטול את הטבלה לפני הארוחה על קיבה ריקה.

הריון והנקה

ספרי לרופא במידה והנך בהריון, חושבת שהנך בהריון או מניקה. הרופא יחליט אם תרופה זו מתאימה לך.

נהיגה ושימוש במכוונת

השימוש בטרוסומילט 20 מ"ג עלול לגרום לטשטוש ראיה. במידה ואתה חווה תופעה זו אין לנהוג או להפעיל מכוונת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ועל כן נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד שתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

למבוגרים וילדים מעל גיל 12 – טבליה אחת פעמיים ביום (השוויים 40-ל מ"ג של טרוספיום כלוריד ליום).

במטופלים הסובלים מבעיות בכליות ייתכן כי הרופא יתאים את המינון.

- במידה וההפרעה בתפקוד הכלייה שלך הינה קלה עד בינונית, אין צורך בהתאמת מינון.

במידה וההפרעה בתפקוד הכלייה שלך הינה חמורה, הרופא יתאים את המינון ויוריד אותו לטבליה אחת ביום או לטבליה אחת פעם ביומיים.

עליך להתייעץ עם הרופא לגבי המינון המתאים לך.

אין לנבוער על המנה המומלצת.

יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם כוס מים לפני הארוחה על קיבה ריקה.

משך הטיפול

הרופא יקבע את משך הטיפול. הצורך בהמשך הטיפול יבדק על ידי המטופל במרווחי זמן קבועים של שלושה עד שישה חודשים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם נשחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש לקחת את התרופה ברגע שנזכרת אך אין לקחת יותר משתי טבליות ביום אלא אם הרופא שלך ציין אחרת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

במידה והנך מחליט להפסיק את הטיפול בטרוסומילט 20 מ"ג לפני תום תקופת שינקיבה על ידי הרופא, התסמינים עלולים לחזור. מומלץ להמשיך ליטול טרוסומילט 20 מ"ג למשך כל תקופת הטיפול שנרשמה על ידי הרופא. מומלץ להתייעץ עם הרופא במידה והנך מעוניין להפסיק את הטיפול.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בטרוסומילט 20 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים, אל תיבטל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות הלוואי האופייניות לסוג התרופה הזו החלות בתדירות גבוהה, כוללות יובש בפה, קשיי עיכול ועצירות.

תופעות הלוואי הבאות הן חמורות ובמידה וכן מופיעות דרושה תגובה מיידית.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים

התסמינים הבאים:

- נפיחות בפינים, בלשון ובקנה הנשימה העלולה לגרום לקשיי נשימה (מתרחש פחות ממשמשש 1 ב מתוך 10,000).
- תגובה אלרגית פתאומית המלווה בקוצר נשימה, פריחה, צפופים וצניחה בלחץ הדם (מתרחש בתדירות בלתי ידועה)
- תגובת רגישות חמורה המלווה בשלפוחיות חמורות, התקלפות העור ו/או הרקמות הריריות כגון: שפתיים, עיניים, פה, אף ואיברי המין. ייתכן וילווה עם התסמינים הבאים: חום, צמרמורות, כאבי שרירים ותחושה כללית לא טובה (מתרחש בתדירות לא ידועה).

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - תופעות שמופיעות ביותר ממשמשש אחד מעשרה:

- יובש בפה
- תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100:**
- עצירות, בחילה, כאבי בטן קשיי עיכול
- תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000:**

- דופק מהיר (טכיקרדיה)
- כאבי ראש
- גזים, שילשול
- כאבים בחזה

תופעות לוואי נדירות (rare) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000:

- סחרחורת
- קושי בריקון השלפוחית, אצירת שתן
- קושי בראיית עצמים מקרוב
- פריחה
- כאבי שרירים ומפרקים

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- דופק מהיר ובלתי סדיר (טכיאיריתמיה)
- קשיי נשימה
- גרד ופריחה
- תחושה קלילת של חולשה
- עליה קלה עד בינונית בערכי כבד מסוימים (סרום טראנסאמינאז)
- מקרים מבודדים של הזיות, בלבול ועצבנות ניצפו לרוב באוכלוסייה בוגרת של מטופלים כנראה בעקבות מחלות ניוירולוגיות ו/או כתוצאה מנטילת תרופות אחרות עם מגננן פעולה דומה שלקחו בו זמנית

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צויינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

לדיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על"כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il/

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הערלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הערלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- על לך גבי להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-C°25.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate.

ציפוי:

Hypromellose, titanium dioxide, polydextrose, talc, maltodextrin, medium chain triglycerides, iron oxide.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

טבליות עגולות בצבע צהוב בהיר-חום, מקורות משני הצדדים באריזת משולש של 50 או 100 טבליות. יתכן ולא כל גדלי האריזות משקולים.

בעל הרישום/היצרן וכתובתו:
כצט תעשיות כימיות בע"מ, קרית מלאכי.
עלון זה נערך בתאריך 03/2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
00-35071-44-159

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.



LFL 350 03/24