



תאריך: מרץ 2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבה/ה

חברת טבע מודיעיה על העדכוןים הבאים בעלון לצריכן של התבשישר

### אкамול צינון ליקויג'יל לילה, במוסות

### Acamol Tsinun Liquigel Night, Capsules

Contains: *Paracetamol 250mg, Pseudoephedrine hydrochloride 30mg,  
Chlorpheniramine maleate 2 mg*

### עדכוניים בעלון לצריכן

#### התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

For the relief of common cold and nasal congestion associated with fever and pain.  
Night care medicine.

**ברצוננו להודיע שהעלון לצריכן עודכן, בפירוט שלහן כוללים העדרconiים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות **באדום** והסיות מידע בטקסט מוחק):**

אין להשתמש בתרופת זו:

[...]

• אם אתה סובל ממחלת לב או מלחץ דם גבוה. אם הינך סובל מלחץ דם גבוה מאד (יתר לחץ דם חמור) או יתר לחץ דם שאינו נשלט על ידי תרופות, מחלת לב או כל דם או היסטוריה של שbez.

[...]

• אם אתה סובל ממחלת חמורה של הכליזות. אם יש לך מחלת כליות חריפה (פטואומית) או כרונית (ארוכת טווח) או אי ספיקת כליות.

## ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה

- מקרים של תסמנת אנצפלופתיה אחורית הפיכה (PRES) ותסמנת כיווץ כל' דם מוחית הפיכה (RCVS) דווחו בעקבות שימוש בתרופות המכילות פסיאודואפדרין. ו- RCVS הם מצבים נדירים שכולים להיות קרככים באספקת דם מופחתת למוח. הפסק מיד להשתמש באקמול ליקוויג'ל יומן ופנה לעזרה רפואית מיידית אם אתה מפתח תסמינים שעשויים להיות סימנים של PRES או RCVS (لتסמינים ראה סעיף 4 "תופעות לוואי אפשריות")

## 4. תופעות לוואי

### תופעות לוואי חמורות

יש להפסיק את הטיפול באופן מיידי ולפנות לטיפול רפואי דחומי:

אם אתה מפתח תסמינים שעשויים להיות סימנים של תסמנת אנצפלופתיה אחורית הפיכה (PRES) ותסמנת כיווץ כל' דם מוחית הפיכה (RCVS) הסימנים כוללים:

- הופעה פתאומית של כאב ראש חמור
- בחילות
- הקאות
- בלבול
- פרכוסים
- שינויים בראיה

[...]

אם אתה חווה אחת מתופעות הלואוי הבאות, יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מייד:

[...]

• כאב ראש פתאומי וחמור, בחילות, הקאות, בלבול, פרכוסים, הפרעות בראשיה

[...]

### תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)

• מצבים חמורים המשפיעים על כל' דם במוח הידועים כתסמנת אנצפלופתיה אחורית הפיכה (PRES) ותסמנת כיווץ כל' דם מוחית הפיכה (RCVS)

[...]



## עדכוניים בעליון לרופא

**בפירות שלහן כלולים העדכוניים העיקריים בלבד (תוספות מסוימות באدوים וסחרות מידע בטקסט מוחק):**

### 4.3 Contraindications

[...]

Severe hypertension or uncontrolled hypertension

[...]

Severe acute or chronic kidney disease/renal failure

### 4.4 Special warnings and precautions for use

[...]

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) and reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS)

Cases of PRES and RCVS have been reported with the use of pseudoephedrine containing products (see section 4.8). The risk is increased in patients with severe or uncontrolled hypertension, or with severe acute or chronic kidney disease/renal failure (see section 4.3).

Pseudoephedrine should be discontinued and immediate medical assistance sought if the following symptoms occur: sudden severe headache or thunderclap headache, nausea, vomiting, confusion, seizures and/or visual disturbances. Most reported cases of PRES and RCVS resolved following discontinuation and appropriate treatment

[...]

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות

. וניתן לקבללו מודפס ע"י פניה לחברות טבע.

<https://israeldrugs.health.gov.il>