

20.3.2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

## **Wegovy 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 1.7mg and 2.4mg Solution for injection**

חברת נובו נורדייסק בע"מ שמחה לבשר על תוספת התוויה של ויגובי לשימוש במתבגרים מגיל 12 שנים ומעלה.

### **חומרים פעילים:**

Wegovy 0.25 mg - semaglutide 0.68 mg/ml

Wegovy 0.5 mg - semaglutide 1.34 mg/ml

Wegovy 1 mg - semaglutide 1.34 mg/ml

Wegovy 1.7 mg - semaglutide 2.27 mg/ml

Wegovy 2.4 mg - semaglutide 3.2 mg/ml

### **התוויה הרשומה למכשיר:**

#### **Adults**

Wegovy is indicated as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity for weight management, including weight loss and weight maintenance, in adults with an initial Body Mass Index (BMI) of

- $\geq 30 \text{ kg/m}^2$  (obesity), or
- $\geq 27 \text{ kg/m}^2$  to  $<30 \text{ kg/m}^2$  (overweight) in the presence of at least one weight-related comorbidity e.g. dysglycaemia (prediabetes or type 2 diabetes mellitus), hypertension, dyslipidaemia, obstructive sleep apnoea or cardiovascular disease.

#### **Adolescents ( $\geq 12$ years)**

Wegovy is indicated as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity for weight management in adolescents ages 12 years and above with

- obesity\* and
- body weight above 60 kg.

Treatment with Wegovy should be discontinued and re-evaluated if adolescent patients have not reduced their BMI by at least 5% after 12 weeks on the 2.4 mg or maximum tolerated dose.

\*Obesity (BMI  $\geq 95$ th percentile) as defined on sex- and age-specific BMI growth charts (CDC.gov) (see Table 1).



**Table 1 BMI cut-off points for obesity ( $\geq 95^{\text{th}}$  percentile) by sex and age for paediatric patients aged 12 and older (CDC criteria)**

Age (years)	BMI ( $\text{kg}/\text{m}^2$ ) at $95^{\text{th}}$ Percentile	
	Males	Females
12	24.2	25.2
12.5	24.7	25.7
13	25.1	26.3
13.5	25.6	26.8
14	26.0	27.2
14.5	26.4	27.7
15	26.8	28.1
15.5	27.2	28.5
16	27.5	28.9
16.5	27.9	29.3
17	28.2	29.6
17.5	28.6	30.0

בוצעו עדכוניים בעלון לרופא. בהודעה זו מצוינים העדכוניים המהותיים בלבד. טקסט עם קו תחתי מצין טקסט שהוסף לעלון ואילו טקסט עם קו חוצה מסמן טקסט שהוריד מהעלון. החומרה מסומנת ברקע צהוב. כא לעין בעלונים המצורפים להודעה זו המכילים את כל העדכוניים.

#### עדכוניים לעלון לרופא:

#### **4.2 Posology and method of administration**

##### Adolescents

For adolescents ages 12 years and above, the same dose escalation schedule as for adults should be applied (see Table 2). The dose should be increased until 2.4 mg (maintenance dose) or maximum tolerated dose has been reached. Weekly doses higher than 2.4 mg are not recommended.

....

##### Paediatric population

No dose adjustment is required for adolescents ages 12 years and above.

The safety and efficacy of semaglutide in children and adolescents below 18 12 years of age have not yet been established. No data are available.

Safety and efficacy data in pediatric (12 to less than 18 years) patients with type 2 diabetes mellitus are limited.



#### 4.8 Undesirable effects

**Table 3 Adverse reactions from controlled phase 3 trials in adults**

MedDRA system organ class	Common
Nervous system disorders	Dizziness <sup>b</sup> <b>Dysgeusia<sup>b,c</sup></b>

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לבעל הרישום: נובו נורדייסק בע"מ, רח' עתיר ידע 1, כפר-סבא 4464301, ישראל.  
טלפון: 09-7630444, פקס: 09-7630456.

בברכה,

יילט אנדריא, רוקחת ממונה

nobonordisk@novo-nordisk.com