

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"א - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

טלפסט 180 מ"ג טבליות מצופות

חומר פעיל

כל טבליה מכילה פקסופנאדין הידרוכלוריד (fexofenadine hydrochloride) 180 מ"ג.

חומרים לא פעילים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 " מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעalon זה. היועץ ברוקח אם אתהzekוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמנני המחלת (סימפטומים) חמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת להקלת התסמינים הקשורים לתפרחת מתמשכת המלאוה בגרד.

קבוצה רפואיית: אנטיהיסטמי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לפקסופנאדין או לכל אחד ממרכיבי התרופה הנוספים (ראה פרק 6).

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בטיפול התיעץ עם הרופא אם:

- אתה סובל מליקוי בתפקוד הכללי או הכבד.
- אתה סובל או סבלת בעבר ממחלת לב, כיוון שתרופה מסווג זה עלולה לגרום لكצב לב מהיר או לא סדיר.
- אתה קשיש.

אם אחד מהמצבים האלו רלוונטי לך או אם איןך בטוח, ספר לרופא לפני שאתה נוטל טלפסט.

ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במילוי אם אתה לוקח:

- אפלוטמיד (תרופה לטיפול בסרטן הערמוני), כיוון שההשפעה של טלפסט עלולה לדגדת.
- תרופות לביעות עיכול שמכילות אלומיניום או מגנזיום. אלו עשויות להשפיע על פעילות טלפסט בכך שהן מקטינות את כמות התרופה שננספה.

מומלץ ליטול תרופות אלה לביעות עיכול שעתיים לפני או אחרי ניתילת טלפסט.

שימוש בתרופה ומזון
יש לבלוע את התרופה עם מים לפני האוכל.

הירiox והנקה

אם את בהירiox או מניקה, חושבת שאת בהירiox או מתכנתת הירiox, יש להיעז ברופא לפני השימוש בתרופה.
אין לקחת טלפסט בהירiox אלא אם זה הכרחי.
טלפסט אינו מומלץ בזמן הנקה.

היגיה ושימוש במכונות

לא סביר שטלפסט ישפייע על היכולת לנוהג או להפעיל מכונות, אולם, עליך לוודא לפני שאתה נוהג או מפעיל מכונות שהטבליות לא גורמות לך לשינויות או לSchedulerות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה לפחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבלייה, אך ניתן לומר שהיא "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעוח בוגר למינון ואופן הטיפול בתכשיט.

למבוגרים וילדים מגיל 12 ומעליהם המינון המקביל בדרך כלל הוא טבלייה אחת (180 מ"ג)
פעם ביום. יש לבלוע את התרופה עם מים לפני האוכל.

אין מידע לגבי כתישה או ריסוק הטבלייה.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אם נטלה בטיעות למינון גבוהה יותר

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד לצדמן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. תסמינים של מנת יתר בקרבים הם סחרחות,
ישנוניות, עייפות ויבש בפה.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן
הרגיל כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אם אתה רוצה להפסיק לקחת טלפסט לפני סיום הטיפול שהומלץ על ידי הרופא, ספר זאת
לרופא.

אם תפסיק לקחת טלפסט מוקדם מהמתוכנן התס敏ינים עלולים לחזור.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נטול תרופה. הרכיב
משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטפלפסט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

פנה לרופא מיד והפסיק לקחת טפלפסט אם אתה סובל מנפיחות בפנים, בשפטים, בלשון או בגרון ומקשיים בנשימה, מכיוון שגם עשויים להעיד שאתה סובל מתגובה אלרגית חמורה.

תופעות לוואי הבאות דוחו בKİΝז'ים קליניים, עם שכיחות דומה לאלו שנצפו בחולה שלא קיבל את התרפיה (פלצבן).

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות לאחר משתמש אחד מתוך עשרה):
כאב ראש, נמנום, בחילה, סחרחות.

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שמופיעות לאחר משתמש אחד מ-100):
עיפות/ישננות.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):
נדודי שינה, הפרעות שינה, חלומות רעים, עצבנות, דפוקות לב מהירות או לא סדירות, שלשול, פריחה בעור וגרד, חרלה, תגובות אלרגיות חמורות העולות לידיים לנפיחות בפנים, בשפטים, בלשון או בגרון, הסמקה, לחץ בחזה וקשי נשימה, ראייה מוטושטשת.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il)
המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרפיה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-30°C.
- אל תזרוק תרופה כלשהי באמצעות שפכים או פסולת ביתית. שאל את הרוקח איך לזרוק את התרופות שאתה כבר לא משתמש בהן. צעדים אלו יסייעו להגן על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל התרפיה מכילה גם:

Tablet core: microcrystalline cellulose, pregelatinised maize starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate.

Film-coating: macrogol 400, hydroxypropyl methylcellulose E-15, titanium dioxide (E171), hydroxypropyl methylcellulose E-5, colloidal anhydrous silica, povidone, yellow iron oxide blend, pink iron oxide blend.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האrizה:
טבליות מצופות בצביע אפרסק, צורתן דומה לכמוסה. על צד אחד של הטבליה מסומן "018" ועל צידה השני "e".
טלפנסט 180 מ"ג משוק באrizת מגשיות (בליסטרים). האrizה מכילה 2, 10 או 15 טבליות.
יתכן שלא כל גודלי האrizות משוקקים.

בעל הרישום והיבואן וכתובתו: פרמשלום בע"מ, רח' המלאכה 21, ראש העין 4809157

נערך במרץ 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 21 29136 22 109
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני
שני המינים.