

רגולקס

אפקה מסיסת להכנת משקה

החומר הפעיל ורכיביו:

פוליאתילן גליקול 3350, 3350 w/w 99.973%

(polyethylene glycol 3350, 99.973%)

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 לעלון: " מידע נוסף".

קרא בעין את העלון עד סוף בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה.

היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמננו המחלת (סימפטומים) מחמורים או אינם משתפרים.

רגולקס אינו מכיל סוכר ולכן מתאים לסוכרתיים.

1. **למה מיעשתת התרופה?**

התרופה מיועדת לטיפול בעצירות. רגולקס מרכיב את הצואה על ידי העלאת תחולת המים בצוואה, גורם לפעילות מעיים נורמלית וכן מקל על עצירות.

קבוצה רפואייתית:
משלשל אוסומוטי.

2. **לפוי השימוש בתרופה**

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (פוליאתילן גליקול 3350) או למרכיב הנוסף (סוכרלווז) אשר מכילה התרופה.
- אתה סובל ממחלה מייע או מעי גס (כגון דלקת כבית של המעי הגס, מחלת קרונה).
- אתה סובל מאכבי בטן מסיבה לא ידועה.
- יש לך או שיש חשד כי יש לך התנקבות במערכת העיכול.
- יש לך או שיש חשד כי יש לך חסימת מעיים.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
לפני הטיפול ברגולקס, ספר לרופא אם:

- יש לך שלשול ואתה בעל נתיחה לתכשירים מעתנים [diuretics]. הרופא ישקול מעקב אחר רמת אלקטROLיטים.
 - התרופה מכילה פוליאתילן גליקול (Macrogol). נצפו מקרים מעטים בוירור של תגובות רגשות יתר (פריחה, סרפהת או בזקתק).
- ספיקתן של תרופות אחרות עלולה להיות מופחתת עקב עלייה בקצב הפעילות של מערכת העיכול הנגרמת על ידי פוליאתילן גליקול (ראה סעיף "אינטראקטיות/תגובה בין תרופות").

מידע הכרחי טרם נטילת התרופה

עצירות המופעה מידי פעם

יתכן כי היא קשורה בשינוי שלلاحונה בהרגלי ההיגיינה. קיימות תרופות לטיפול קצר טוויה. היוועץ רפואי במקורה של עצירות שהחלה לאחרונה, אשר אינה ניתן להסביר על ידי שינויים באורך החיים שלך או במקורה של עצירות הכרוכה בכאב, בחום או בנפיחות בטנית.

עצירות כרונית (עצירת ארכתט טוועט)

עלולה להתרחש כתוצאה מה:

- מחלת מעיים המחייבת ייעוץ רפואי
- ליקוי בתפקוד המעיים (חווסר איזון) בשל הרגלי אכילה ואורח חיים הטיפול כולל בין היתר:
- העלאת אחוז המוציאים ממוקר צמחי בתזונה (ירקות, לחם, פירות)
- העלאת צריכה המים ומיצי פירות
- הגברת הפעולות הגוףוניות (ספורט, הליכה)
- שייקום רפלקס עשיית הצריכים (צואה)

ילדים וمتבגרים

היוועץ רפואי טמן טיפול זה לילדך על מנת לשולב כל סיבה אורגנית לעצירות. לאחר 3 חודשים טיפול, על הרפואי להעיר את מצבו הקליני של ילךך.

בדיקות ומעקב

איבוד נזלים חמור בשל שלשול או הקאה עלול להזכיר טיפול לאיזון חדש של הפרעות אלקטROLיטים (דרהינו רמות נמוכות של נתרן ואשלגן בדם), ויש לשקל מעקב אחר רמת האלקטרוליטים.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופות

אם אתה לוקחת או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. הסיפה של תרופות אחרות עלולה להיות מופחתת במהלך השימוש ברגולקס. ההשפעה התרופיתית של תרופות בעלות אינדיקס רפואיי צר עשויה להיות מושפעת במיוחד (למשל תרופות אנטי-אפילpticיות, דיגוקסין ותרופות מדכאות חיסון).

שימוש בתרופה ומדוזן
ניתן ליטול עם או בלי אוכל.

הירין והנקה

היוועץ ברופא או ברוקט טרם השימוש בתרופה כלשהי.

אם את בהירין, חושבת שתת בהירין או אם את מניקה, ספרי על כר לרופא.

הירין

לא צפויות השפעות במהלך ההירין, מאחר שהחשיפה הסיסטמית לרגולקס היא זניחה. ניתן להשתמש ברגולקס במהלך ההירין.

לא צפויות השפעות על היילוד/התינוק הינוק לאחר שחשיפה הסיסטמית של האם המיניקה היא זניחה. ניתן להשתמש ברגולקס במהלך ההנקה.

התרופה אינה משפיעה על יכולת נהוג או להפעיל מכונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

גיל	מינון יומי	למהיס ב...	מס' מנות יומיות
6 חודשים עד שנה	4 גרם (רביע כוס)	50 מ"ל (רביע כוס) פעם ביום	למהיס ב...
שנה עד 4 שנים	8-4 גרם	יש ל מהיס כל 4 גרם אבקה ב- 50 מ"ל משקה (רביע כוס) לשתי מנות: בוקר וערב	שנה עד 4 שנים
	8-16 גרם	יש ל מהיס כל 8 גרם אבקה ב- 100 מ"ל משקה (חצי כוס)	8-4 שנים
מבוגר ומבוגרים	17 גרם	כוס מלאה (כוס 230 מ"ל) פעם ביום	למהיס ב...

השפעה של רגולקס מופיעה תוך 24 עד 48 שעות ממועד המtan. בהמשך הטיפול, פעילות המעיים תהיה סדירה.
הSHIPOR הזמני בפעולות המעיים בעקבות הטיפול, יתחזק באמצעות אורת ח'ים בריא ואמצעים תזונתיים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

לאירוע המוצר מצורפת כוסית למדידה מדעית של המנה. שננות מסומנות בצד' כוסית המדידה ומורות על כמות האבקה שיש למלא בכוסית המדידה לקבלת המנה הדורשיה.

משך הטיפול -

משך הטיפול המומלץ לילדים הוא עד שלושה חודשים. במידה ונדרש טיפול ממושך יותר יש להתיעץ עם הרופא המטפל.

צורת הנטילה

יש ל מהיס את המנה היומית בכל משקה מועדף, כגון: מים, מיץ, משקאות קרמים, קפה, תה, חלב, פורמוללה לתינוקות.
רגולקס מתומס לחלוין ובמהירות בכל משקה ובכל טמפרטורה.
יש לשות את המנה במלואה, רצוי ליטול את המנה בבוקר.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר

אתה עלול לפתח שלשול, אשר יחלף לאחר הפסקת טיפול זמנית או הפחתת מינון.

אובדן יתר של נזלים בשלשול או הקאות עשוי להצריך טיפול לאיזון אלקטROLיטי מחדש.

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד לידן התרופה, פנה מיד לחדר מינון של בית חולים והבא את אריזת התרופה אליו.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנת כפולה כדי לפצות על מנת שנשכחיה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופה בחושר! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספת בנוגע לשימוש במסגרתו, היוועץ ברופא או ברוקט.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברגולקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לבית החולים באופן מיידי אם אתה סובל מ:

קשה נשימה, סומך או כל תסמין אחר העול להעד על תגובה אלרגית חמורה. ידוע על מקרהבודד של שוק אנפיפילקטטי.

תופעות לוואי שדוחות בambilגרים

תופעות לוואי שכיחות מאוד (מופיעות ביותר ממשתמש 1 מתוך 10):

כאבי בטן, תחושת נפיחות, שלשול, חילה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000): הקאות, דחיפות ביציאות, חוסר שליטה בעשיית צרכים (צואה).

תופעות לוואי נדירות מאוד (מופיעות בפחות ממשתמש 1 מתוך 10,000):

תגובה של רגשות יתר (גרד, סרפת, פריחה, בזקת בפנים, בזקת ע"ש קוינקה [Quincke].).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):
הפרעות במאזן האלקטרוליטים (היפונתרמיה, היפוקלמייה) ו/או התיבשות במילוי חולמים מבוגרים, אדמנת (אריתמה).

תופעות לוואי שכיחות מאד (מופיעות ביותר ממשתמש 1 מתוך 10):
כאבי בטן, שלשול.

תופעות לוואי שאין שכיחות (מופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000):
הקרנות, נפיחות, בחילה.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):
תגובה של רגשות יתר.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעת הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דוחת תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

/https://sideeffects.health.gov.il
בנוסף ניתן לדוח באמצעות [שליחת דוא"ל ליחידת בטיחות המטופלים של בעל הרישום:](mailto:drugsafety@neopharmgroup.com)

5. איך לאחסן את הטיפול?

- מן הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראיתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אין לאחסן להקה לא הוראה ללא מרופשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך הת滂גה (exp. date) המופיע על גבי הקבוק והקרטן. תאריך ת滂גת התכשיר לאחר פתיחה ראשונה זהה לתאריך הת滂גה המוטבע על-גביה האריזה.

תנאי אחסון:

- אחסן במקומות קרים ויבש סגור היטב, מתחת ל-25°C.
- אין להשתמש בתרופה אם אתה מבחין בסימני קלקל הנראים לעין.

6. מידע נוספת

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
Sucralose 0.027% w/w

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
רגולקס הימ אבקה בצעב לבן.

האריזה מכילה קבוק בונפה של 500 מ"ל ובתוכו 250 גרם אבקה מסיסה של רגולקס.
לאירוע המוצר מצורפת כוסית למדידה מדיקת של המנה.

על הרישום וכותבות:
ニアופרム モズチ ジリッカ バイ"ם,
השילוח 6, ת.ד. 7641, פתח-תקווה 4917001.

שם היצרן וכותבות:
בן שמעון פלורייש בע"מ, פארק תעשייה מSEG 20174.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

150-25-33953-00

נערך במרץ 2024.

לשם הפניות ולהקלת הקיריה עליון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.