

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

# פגלקס נוטראל

אבקה להכנת תמיסה לשתייה

החומר הפעיל וריכוזו:

פוליאתילן גליקול 3350, 99.973% w/w

(polyethylene glycol 3350, 99.973% w/w)

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 בעלון - "מידע נוסף".

# פגלקס תפוז

אבקה להכנת תמיסה לשתייה

החומר הפעיל וריכוזו:

פוליאתילן גליקול 3350, 99.365% w/w

(polyethylene glycol 3350, 99.365% w/w)

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 בעלון - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך

שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה.

היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או

אינם משתפרים.

פגלקס אינו מכיל סוכר ולכן מתאים לסוכרתיים.

## 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בעצירות. פגלקס מרכז את הצואה על ידי העלאת תכולת המים בצואה, גורם

לפעילות מעיים נורמלית וכך מקל על עצירות.

קבוצה תרפויטית:

משלשל אוסמוטי.

## 2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (פוליאתילן גליקול 3350) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פירוט מרכיבים לא פעילים בסעיף 6 בעלון - "מידע נוסף").
- אתה סובל ממחלת מעי או מעי גס (כגון דלקת כיבית של המעי הגס, מחלת קרוהן).
- אתה סובל מכאבי בטן מסיבה לא ידועה.
- יש לך או שיש חשד כי יש לך התנקבות במערכת העיכול.
- יש לך או שיש חשד כי יש לך חסימת מעיים.

## אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- התרופה מכילה פוליאיתילן גליקול (Macrogol). נצפו מקרים מעטים ביותר של תגובות רגישות יתר (פריחה, סרפדת או בצקת).

- ספיגתן של תרופות אחרות עלולה להיות מופחתת עקב עלייה בקצב הפעילות של מערכת העיכול הנגרמת על ידי פוליאיתילן גליקול (ראה סעיף "אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות").

**לפני הטיפול בפגלקס, ספר לרופא אם:**

- אתה משלשל ואתה בעל נטייה להפרעות במאזן האלקטרוליטים (למשל אם אתה בגיל מבוגר, אם אתה סובל מהפרעות בתפקוד הכבד או הכליות או אם אתה משתמש בתכשירים משתנים [diuretics]). הרופא ישקול מעקב אחר רמת האלקטרוליטים.

## מידע הכרחי טרם נטילת התרופה

### עצירות המופיעה מדי פעם

ייתכן כי עצירות זו קשורה בשינוי שחל לאחרונה בהרגלי ההיגיינה. קיימות תרופות לטיפול קצר טווח בעצירות. היוועץ ברופא במקרה של עצירות שהחלה לאחרונה, אשר אינה ניתנת להסבר על ידי שינויים באורח החיים שלך או במקרה של עצירות הכרוכה בכאב, בחום או בנפיחות בטנית.

### עצירות כרונית (עצירות ארוכת טווח)

עלולה להתרחש כתוצאה מ:

- מחלת מעיים המחייבת ייעוץ רפואי
- ליקוי בתפקוד המעיים (חוסר איזון) בשל הרגלי אכילה ואורח חיים

הטיפול כולל בין היתר:

- העלאת אחוז המוצרים ממקור צמחי בתזונה (ירקות, לחם, פירות)
- העלאת צריכת המים, כולל מיצי פירות
- הגברת הפעילות הגופנית (ספורט, הליכה)
- שיקום רפלקס עשיית הצרכים (צואה)

## ילדים ומתבגרים

היוועץ ברופא טרם מתן טיפול זה לילדך על מנת לשלול כל סיבה אורגנית לעצירות. לאחר 3 חודשי טיפול, על הרופא להעריך את מצבו הקליני של ילדך.

## בדיקות ומעקב

איבוד נוזלים חמור בשל שלשול או הקאה עלול להצריך טיפול לאיזון מחדש של הפרעות אלקטרוליטים (דהיינו רמות נמוכות של נתרן ואשלגן בדם), ויש לשקול מעקב אחר רמת האלקטרוליטים.

## אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

הספיגה של תרופות אחרות עלולה להיות מופחתת במהלך השימוש בפגלקס. ההשפעה התרפויטית של תרופות בעלות אינדקס תרפויטי צר, עשויה להיות מושפעת במיוחד (למשל תרופות אנטי-אפילפטיות, דיגוקסין ותרופות מדכאות חיסון).

## שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול עם או בלי אוכל.

## היריון והנקה

היוועצי ברופא או ברוקח טרם השימוש בתרופה כלשהי.  
אם את בהיריון, חושבת שאת בהיריון או אם את מניקה, ספרי על כך לרופא.

### היריון

לא צפויות השפעות במהלך ההיריון, מאחר שהחשיפה הסיסטמית לפגלקס היא זניחה. ניתן להשתמש בפגלקס במהלך ההיריון.

### הנקה

לא צפויות השפעות על היילוד/התינוק היונק מאחר שהחשיפה הסיסטמית של האם המניקה היא זניחה. ניתן להשתמש בפגלקס במהלך ההנקה.

### נהיגה ושימוש במכונות

התרופה אינה משפיעה על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות.

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.  
המינון המקובל בדרך כלל הוא:

גיל	מינון יומי	להמיס ב...	מס' מנות יומיות
6 חודשים עד שנה	4 גרם	50 מ"ל (רבע כוס)	פעם ביום
שנה עד 4 שנים	4-8 גרם	יש להמיס כל 4 גרם אבקה ב-50 מ"ל משקה (רבע כוס)	ניתן לחלק את המינון היומי לשתי מנות: בוקר וערב
		יש להמיס כל 8 גרם אבקה ב-100 מ"ל משקה (חצי כוס)	
4-8 שנים	8-16 גרם	כוס מלאה (230 מ"ל)	פעם ביום

ההשפעה של פגלקס מופיעה בתוך 24 עד 48 שעות ממועד המתן. בהמשך הטיפול, פעילות המעיים תהיה סדירה.

השיפור הזמני בפעילות המעיים בעקבות הטיפול, יתוחזק באמצעות אורח חיים בריא ואמצעים תזונתיים.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

לאריזת המוצר מצורפת כוסית למדידה מדויקת של המנה. שנתות מסומנות בצידי כוסית המדידה ומורות על כמות האבקה שיש למלא בכוסית המדידה לקבלת המנה הדרושה.

### משך הטיפול

משך הטיפול המומלץ בילדים הוא עד שלושה חודשים. במידה ונדרש טיפול ממושך יותר יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

### צורת הנטילה

יש להמיס את המנה היומית בכל משקה מועדף, כגון: מים, מיץ, משקאות קרים, קפה, תה, חלב, פורמולה לתינוקות.

פגלקס מתמוסס לחלוטין ובמהירות בכל משקה ובכל טמפרטורה.

פגלקס תפוז מכיל חומרי טעם. הוספתו למשקה בטעם אחר עלולה לשנות את טעם התכשיר. כדי לשמור על טעם התכשיר מומלץ להוסיף את האבקה למים. יש לשתות את המנה במלואה. רצוי ליטול את המנה בבוקר.

#### **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

אתה עלול לפתח שלשול, אשר יחלוף לאחר הפסקת טיפול זמנית או הפחתת מינון. אובדן יתר של נוזלים בשלשול או בהקאות עשוי להצריך טיפול לאיזון אלקטרוליטי מחדש. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

**אם שכחת ליטול את התרופה** בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה.** הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בפגלקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות לבית החולים באופן מיידי אם אתה סובל מ:**

קשיי נשימה, סומק או כל תסמין אחר העלול להעיד על תגובה אלרגית חמורה. ידוע על מקרה בודד של שוק אנפילקטי.

#### **תופעות לוואי שדווחו במבוגרים**

**תופעות לוואי שכיחות מאוד** (מופיעות ביותר ממשמש 1 מתוך 10): כאבי בטן, תחושת נפיחות, שלשול, בחילה.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות** (מופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000): הקאות, דחיפות ביציאות, חוסר שליטה בעשיית צרכים (צואה).

**תופעות לוואי נדירות מאוד** (מופיעות בפחות ממשמש 1 מתוך 10,000): תגובה של רגישות יתר (גרד, סרפדת, פריחה, בצקת בפנים, בצקת ע"ש קווינקה (Quincke)).

**תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה** (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה): הפרעות במאזן האלקטרוליטים (היפונטרמיה, היפוקלמיה) ו/או התייבשות, במיוחד בחולים מבוגרים, אדמנת (אריתמה).

#### **תופעות לוואי שדווחו בילדים**

**תופעות לוואי שכיחות מאוד** (מופיעות ביותר ממשמש 1 מתוך 10): כאבי בטן, שלשול.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות** (מופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000): הקאות, נפיחות, בחילה.

**תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה** (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה): תגובה של רגישות יתר.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

## דיווח תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>  
בנוסף, ניתן לדווח באמצעות שליחת דוא"ל ליחידת בטיחות המטופלים של בעל הרישום: [drugsafety@neopharmgroup.com](mailto:drugsafety@neopharmgroup.com)

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הבקבוק והקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש. תאריך תפוגת התכשיר לאחר פתיחה ראשונה זהה לתאריך התפוגה המוטבע על-גבי האריזה.

### **תנאי אחסון:**

- אחסן במקום קריר ויבש סגור היטב, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- אין להשתמש בתרופה אם אתה מבחין בסימני קלקול הנראים לעין.

## 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**

**פגלקס נוטראל (מרכיבים בלתי פעילים):**

Sucralose 0.027% w/w

**פגלקס תפוז (מרכיבים בלתי פעילים):**

Ascorbic Acid, Orange Flavor, Sunset Yellow Color, Sucralose 0.025% w/w

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

פגלקס נוטראל הינו אבקה בצבע לבן.

פגלקס תפוז הינו אבקה בצבע קרם.

האריזה מכילה בקבוק בנפח של 500 מ"ל ובתוכו 250 גרם אבקה מסיסה של פגלקס.

לאריזת המוצר מצורפת כוסית למדידה מדויקת של המנה.

**בעל הרישום וכתובתו:**

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ, השילוח 6, ת.ד. 7641, פתח-תקוה 4917001.

**שם היצרן וכתובתו:**

בן שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב 20174.

**מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

פגלקס נוטראל: 144-49-33236-00

פגלקס תפוז: 144-50-33237-00

נערך במרץ 2024.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Peglex pow for oral sol PIL vr 01A

