

برونخكلير® سائل للشرب

المادة الفعالة وكيفيتها في وحدة جرعة:

Fluid extract derived from ivy leaves (1:1); (extracting agent: ethanol 70% (V/V)) 16.8 mg/ml.

Fluid extract derived from thyme herb (1:2-2.5); (extracting agent: ammonia solution 10% (m/m); glycerol 85% (m/m); ethanol 90% (V/V); water (1:20:70:109)) 168 mg/ml.

خلاصة سائلة المستخلصة من أوراق العشقة (1:1); (سائل الاستخلاص: إيثانول 70% في الحجم): 16.8 مل لكل مل.

خلاصة سائلة المستخلصة من بذنة السنثير (1:2-2.5) (سائل الاستخلاص: محلول أمونيا (m/m) 10%; جليسروول 90% (m/m); ماء (1:20:70:109)) 168 مل لكل مل.

للمعلومات كل المواد غير الفعالة والمورجات (مسببات الحساسية) في الدواء – انظر بند 6.
للمعلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء – انظر بند 2.

اقرأ النشرة بأمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك استفسارات، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

الدواء برونخكلير سائل للشرب يختص بالبالغين.

عليك تناول الدواء وفقاً للتوجيهات في بند الجرعة في هذه النشرة.
يسُتَّرِّضُ الصيدلي إذا كنت تعاني من علامات المرض (الأعراض) تتفاقم أو أنها لا تتحسن بعد 7 أيام من استعمال الدواء.

1. لأى غرض مخصوص الدواء؟

الدواء من مصدر نباتي لاستعمال لدى البالغين، لتخفيف من أعراض التهاب القصبات الهوائية الحاد (التهاب الشعب الهوائية الحاد)، أثناء الركاب، المصحوب بسعال مع بلغم.

الفصيلة العلاجية: مستحضر من مصدر نباتي لأمراض في مجاري التنفس الناتجة عن رُكام

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء:

• إذا كنت حساساً (أرجي) لواحد أو أكثر من المواد الفعالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء، فاقرأ المركبات الإضافية فحصلاً في البند 6.

• إذا كنت حساساً (أرجي) لنباتات من فصيلة العشقة، لنباتات من فصيلة الشفويات (Lamiaceae or) (Birch), لنبة الشيش (Mugwort)، أو نبتة الكرفس (Celery).

- يجب التوجه إلى الطبيب إذا كانت علامات المرض (الأعراض) تتفاقم أو أنها لا تتحسن بعد 7 أيام من استعمال الدواء.
- يجب التوجه إلى الطبيب على وجه السرعة في أي حالة من صيق تنفس، سخونة، بلغم دموي أو صديدي.

الأطفال والمرأهقين: هذا الدواء غير مخصوص للأطفال والمرأهقين تحت جبل 18.

إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخرين، الطبيب أو الصيدلي بذلك. من غير المعروف عن تفاعلات بين الدواء برونخكلير سائل للشرب وبين أدوية أخرى. استعمال الدواء والطعام: يمكن تناول الدواء برونخكلير سائل للشرب مع طعام، مع شراب، أو بدون علاقة للطعم. لمعلومات إضافية، انظر البند 3 – **كيف تستعمل الدواء؟**

الحمل والإرضاع: بما أنه لا يوجد ما يكفي من المعلومات، لا يجوز استعمال الدواء برونخكلير سائل للشرب إذا كنت حاملاً أو إذا كنت مرضعة.

القيادة وتشغيل الآلات: لا توجد تحذيرات أو توجيهات خاصة بالنسبة لاستعمال الدواء برونخكلير سائل للشرب خلال القيادة أو تشغيل الآلات.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء:
الدواء برونخكلير سائل للشرب يحتوي على سائل مالتينول.
عليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء برونخكلير سائل للشرب إذا قبل لك من قبل طبيبك بذلك تعاني من عدم تحمل لمركبات معينة.

معلومات لمرضى السكري: 5.4 مل من برونخكلير سائل للشرب تحتوي بالمعدل على ما يقارب - 1.9 غرام كربوهيدرات.

الدواء برونخكلير سائل للشرب يحتوي على 7% إيثانول بالحجم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تتحقق مع الطبيب أو الصيدلي في حال كنت غير متأكد بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة العاديّة عادة هي:

مجموع الجرعة اليومية	جرعة وحدة بالي (يجبتناول 3 يومياً)	العمر
16.2 مل	5.4 مل	البالغون من جبل 18 سنة وما فوق

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها

مدة العلاج: مدة العلاج متعلقة ب重度 المرض. يجب التوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كانت علامات المرض (الأعراض) لا تتحسن بعد 7 أيام من استعمال الدواء.

طريقة التناول: يجب تناول الدواء برونخكلير سائل للشرب بمساعدة كأسقياس المرفقة 3 مرات في اليوم (صباحاً، ظهراً ومساءً) مباشرة للجسم. بحسب الحاجة، يمكن شرب القليل من سائل للشرب (يُفضل كأس ماء)





وليس مشروب كحولي، بعد تناول الدواء.

إذا كانت لديك حساسية معرفة في الجهاز الهضمي، يُوصى بتناول الدواء برونخكالير سائل للشرب بعد الوجبات.

يجب الخزن قبل الاستعمال.

إذا تناولت عن طريق المطاط جرعة مفرطة عليك إعلام طبيبك، هو سيقرر فيما إذا كان من الضروري طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معلقاً.

6. معلومات إضافية

اضافة الى المواد الفاعلة، يحتوي الدواء أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:
Purified water, maltitol liquid, hydroxypropylbetadex, potassium sorbate, citric acid monohydrate

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: الدواء برونخكالير سائل للشرب يبدو كسائل شفاف بلونبني فاتح.
حجم العبوة: الدواء برونخكالير سائل للشرب متوفّر بعبوة كرتون التي تحتوي على قيّمة زجاجية بحجم 100 مل بلونبني مزودة بكأس قياس.

صاحب التسجيل والمستورد: د. سموئيلوف استيراد وتسويقي. م.ض. ص.ب. 2486، رعنانا 4365007
هاتف: 09-7483769، عنوان البريد الإلكتروني: info@drsamuelov.co.il
المصنع: بيونوريكـه إس.إي، شارع كارشنـشـليـزـرـ 15-11-15، نويماركت 92318، ألمانيا.

تم المصادقة عليها في حزيران 2021.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 00-35940-69-167
لتيسـيط وتسـهـيل القراءـة، تـم صـيـاغـة هـذـه النـشـرـة بـصـيـغـة المـذـكـرـ. بالـرـغـمـ منـ ذـاكـ، الدـوـاءـ مـخـصـصـ لـكـلاـ الجنـسـينـ.

إذا قمت بتناول الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستثمر الصيدلي أو الطبيب.

إذا قمت بالتوقيف عن تناول الدواء: إيقاف العلاج عادة غير مضر.

لا يجوز تناول أدوية في القلام! يجب التتحقق من المصوّر والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسلمة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء، استثمر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كم في كل دواء، قد يسبب استعمال برونخكالير سائل للشرب أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين.

لا تتفق من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تتعانى من أي واحد منها.

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية المنسوبة أدناه، يجب التوقف عن استعمال الدواء سائل للشرب واستشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن. سيددد الطبيب وجاهة الأعراض الجانبية وسيقرر فيما إذا كان من الضروري التصرف بطريقة ما.

أعراض جانبية نادرة (rare) التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين للدواء من بين 10,000:

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى عند ظهور الملامة الأولى لفترات الحساسية (رد فعل تحسسي) مثل: رد فعل جلدي (شرى، طفح أو حكة)، صعوب التنفس، انفاس في الوجه، في الفم وأو في الحلق.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين للدواء من بين 1000:

عد راحة في الجهاز الهضمي مثل تشنجات، غثيان، تقيؤ.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تتعانى من عرض جانبي الذي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج دوائي" الموجود في صفحة البيت لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه للمؤذن الإلكتروني للت bliغ عن اعراض جانبية، او عن طريق الدخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة إلى ذلك، يمكن التبليغ عن عرض جانبي لشركة د. سموئيلوف استيراد وتسويقي على عنوان البريد الإلكتروني: drsamuelov.co.il

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع وبذلك تمنع التسمم.



Bionorica®