دولوكس تيقع 30 ملغ كبسولات مضادة لحموضة المعدة

المادة الفعّالة: تحتوي كل كبسولة على:

المادة الفعّالة: تحتوي كل كبسولة على:

دولوكسيتين (على شكل هيدروكلوريد) 60 ملغ دولوکسیتین (علی شکل هیدروکلورید) 30 ملغ Duloxetine (as hydrochloride) 60 mg Duloxetine (as hydrochloride) 30 mg المواذ غير الفقالة والمثيرة للحساسية في المستحضر انظر الفصل 2 "معلومات مهمة عن قسمٍ من مركّبات الدواء" والفصل 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمغن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدّواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، يُوجّه إلى الطبيب أو الصيدلي. ىف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطِّه للأخرين؛ لأنَّه قد يضرُّ هم، حتى لوَّ بدا لكَ تشَّابه بين مرضك ومرض تزيد الأدوية المضادة للاكتتاب والقلق من خطر حدوث سلوك وأفكار انتحارية لدى الأطفال، المراهقين والبالغين الصغار حتى جبل 24 عاما. مع بدء العلاج بالدواء، على متلقى العلاج من كل الأعمار وأقاربهم، متابعة التغييرات السلوكية مثلا: تفاقم الاكتئاب، أفكار انتحارية، عدوانية وغير ذلك. إذا طرأت تغييرات كهذه، يجب التوجه إلى الطبيب فورًا.

1. لمَ أعد هذا الدّواء؟

يُستخدم دولوكس تيقع لعلاج البالغين الذين يعانون من: • حالات من الاكتئاب الكبير الدر والاستفاد الكبير

• كارك من او تعتاب المبير • ألم الاعتلال العصبي المرتبط بالاعتلال العصبي السكري المحيطي • اضطراب القلق العام (generalized anxiety disorder, GAD)

• الألم العضلي الليفي (fibromyalgiá)

ألم العضلات الهيكلية المزمن في حال لا يمكن إعطاء علاج آخر أو في حال فشل علاج سابق.
 يعتمد هذا الاستطباب على أبحاث أجريت على مرضى يعانون من ألم مزمن في أسفل الظهر
 (CLBP) وألم مزمن نتيجة التهاب عظمي مفصلي.

المجموعة العلاجية: ينتمي دولوكس تيقع إلى عائلة أدوية الـ SNRI، و هو يؤدي إلى ارتفاع مستويات السيروتونين والنور أدرينالين. 2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

كنت حساسا (لديك حساسية) للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
 كنت تعاني من مرض في الكبد.

 كنت تعانى من مرض كلوي حاد.
 كنت تتناول أو تناولت خلال ا 

(MÃOI - Monoamine Oxidase Inhibitor)، بما في ذلك ميثيلين بلو عبر الوريد، والمضاد الحيوي لينزوليد؛ لا يجوز البدء بالعلاج بادوية من نوع مثبطات مونوامين أوكسيداز إذا لم تقر 5 أيام على الأقل منذ التوقف عن العلاج بدولوكس تيقع؛ انظر "التفاعلات بين الأموية". م حرر كنت تتناول ثيوريدازين. تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدّواء

قبل العلاج بـ دولوكس تيقّع، أخبر الطبيب إذا كنت: • تعانى من مرض في الكلى • تعانى أو عانيت في الماضى من اختلاجات (نوبات) • تعانى أو عانيت في

السكر لدى بعض المرضى) • تعاني من بطء في ونيرة إفراغ المعدة • ذو ماض من سوء استعمال الأدوية أفكار انتحارية وتفاقم الاكتناب أو اضطراب القلق لديك

أفكار انتحارية وتفاقم الاكتتاب أو اضطراب الفلق لديك من المعروف أن الكثاب والاضطراب الفلق لديك من المعروف أن الاكتتاب والاضطرابات النفسية الحادة الأخرى تشكّل عوامل الخطورة الأعلى من المعروف أن الاكتتاب، والاضطرابات النفسية الحادة الأخرى تشكّل عوامل الخين تناولوا أدوية مضادة للاكتتاب، زيادة في الأفكار والأعمال الانتحارية، بالأخص عند بدء العلاج، أو عند تغيير الحرق الممكن أن تراوك لحيانا أفكار لإلحاق الضرر بنفسك أو الانتحار. قد تظهر هذه الأفكار بوتيرة أعلى عند البدء بتناول أدوية مضادة للاكتتاب، وتحدث عادة في الأشهر الأولى من العلاج، أو عند تغيير الجرعة الدوانية. يُحتَمَل أن يزداد الميل لديك التفكير بمثل هذه الأفكار إذا:

و كانت لديك في الماضى أفكار انتحارية أو أفكار لإلحاق الضرر بنفسك.

و كنت بالغاشابا. لقد أظهرت معلومات مُجمعت من تجارب سريرية خطرًا متزايدًا لسلوك انتحاري لدى البالغين الذين اعماز هم أقل من 24 عامًا، الذين بعانون من حالات نفسية، وقد عولجوا بادوية مضادة للاكتتاب.

الذين أعمار هم أقل من 24 علمًا، الذين يعانون من حالات نفسية، وقد عولجوا بالوية مضادة الاكتئاب. • كنت تعاني (أو لديك ماض عائلي) من اضطراب ثناني القطب (Manic depression).

• هنت نعاني (او لديك ماض عائلي) من اضطراب تناني القطب (Manic depression). التغيير الشه إلي أي تغيير بطرأ على المراج، السلوك، الأعمال، الأفكار أو المشاعر، وبالأخص إلى التغييرات المفاجئة. إذا كانت لديك في أي وقت أفكار لإلحاق الضرر بنفسك أو أفكار انتحارية، اتصل بطبيبك أو توجه فورًا إلى المستشفى. انتبه بشكل خاص إلى هذه التغييرات في بداية العلاج، وبعد تغيير الجرعة الدوانية لقد تم الإبلاغ عن الأحراض التالية لدى البالغين، الأولاد، والمراهقين الذين عولجوا بالوية مضادة للاكتناب: قلق، تململ، نوبات هلع، أرق، عصبية، عدائية، عدوانية، اندفاعية، تململ حركي (نقص الارتباح الفسي-الحركي)، هوس خفيف، وهوس. لم نثيت العلاقة بين ظهور هذه الأعراض وبين تفاقم الاكتناب و/أو ظهور محقرات انتحارية، لكن تبين أنها تشكل علامات أولية لسلوك انتحاري. قد يكون من المجدي أن تخبر أحد أقرباء العائلة أو صديق مقرب أنك تعابل من الاكتئاب أو من اضطراب القلق، وأن تطلب منهم قراءة هذه النشرة, يمكنك أن تطاب منهم إخبارك فيما إذا كانوا يعتقدون أن الاكتئاب أو القلق لديك أخذان في التفاقم، أو فيما إذا كانوا قلقين بشأن تغييرات تطرأ على سلوكك. إضافة إلى ذلك، عليك الحرص على حضور كل اللقاءات مع الطبيب المُعَالِح.

يوصى بان يراقب متلقو العلاج وافراد أسرتهم التغييرات التي تطرأ على المزاج والسلوك، مثلا: زيادة القلق، نوبات الهام، التململ و عدم الهدوء، الهوس أو الهوس الخفيف، العدوانية أو اضمطرابات في الدوم، بالأخص عند بدء العلاج أو عند تغيير الجرعة الدوائية. في حال حدوث تغييرات كهذه، يجب التوجه الساطيب فوزاً. يجب الحرص على العمل بشكل خاص وفق هذه النصيحة لدى متلقى العلاج الصغار الذن الم 24.5 منة التعلي الترجه التراك المعلق التعلي الناد المادي التعلي التع

لذين أعمار هم 24-18 سنة. الزرق ضيق الزاوية (Angle Closure Glaucoma) – إن توسّع البوبوين، الذي يحدث أحيانًا بسبب استعمال الأدوية المضادة للاكتناب مثل دولوكس تيقع، لدى مثلقي علاج ذوي مبنى ضيق في زاوية العين، والذين لم يخضعوا لعملية جراحية لاستنصال القزحية، قد يؤدي إلى حدوث حالة زرق من نوع ضيق الزاوية.

مشاكل اختلال الأداء الجنسي تحدّث مع طبيبك إذا كانت لدبك تغييرات في الأداء الجنسي، أو إذا كانت لدبك أسئلة أو مخاوف بشأن الأداء الجنسي خلال فترة العلاج بدولوكس تيقم. قد يستطيع الطبيب عرض الحلول عليك. لمعلومات إضافية حول التحذيرات المتعلقة باستعمال الدّواء، انظر البند 4 "الأعراض الجانبية"

الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 عامًا دولوكس تيفّع ليس معدًا لعلاج الأطفال والمراهقين دون سن 18 عامًا.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنتَ تتناول أو تناولتَ مؤخرًا، أدوية أخرى بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكمّلات غذائيّة، أخبِر

الطبيب أو الصيدلي بذلك. عليك إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بشكل خاص إذا كنت تتناول: • مستحضرات أخرى تحتوي على دولوكسينين - يجب الامتناع عن استعمالها بالتزامن مع هذا الدواء. استشر الطبيب إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على دولوكسيتين منبطات موثو أمين أوكسيداز (MAOIs - Monoamine Oxidase inhibitors) - تجنب تناول
 دولوكس تيقي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا (في الـ 14 يومًا الأخيرة)، دواءً من نوع مثبط مونو أمين

سمى حصر، عسى محيو، عبيت الانتصار بعده 14 يوما علي الاقل بعد التوقف عن تداول متبط موثو امين أو أمين المتحدد قبل أن تتوقف عن تداول متبط موثو أمين عن تداول ميدار قبل أن تتوقف عن تداول مدة 5 أيام على الأقل بعد أن تتوقف عن تداول دولوكس تيقع وقبل أن تستطيع تداول مثبط موثو أمين أو كسيدار قبل المترو تونين - تزيد هذه الأدوية المن خطر حدوث متلازمة السيروتونين - تزيد هذه الأدوية المضادة للاكتناب من مجموعة الد SSRI (انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية") • الأدوية المضادة للاكتناب من مجموعة الد SSRI مداوات الاكتناب ثلاثية الحلقات • مسكنات ألام قوية مثل: تر امادول، فينتانيل، مييريدين، ميثادون أو غير ها من الأفيونيات

 تريبتانات (لعلاج الصداع النصفي)
 تريبتوفان - حمض أميني يتواجد في الأغذية، في محاليل التسريب للتغذية، وفي المكملات الغذائية

• العرن المثقوب (هيپركوم - St. John's Wort) • بوسپيرون • أمفيتامينات • ليثيوم • العرن المثقوب

• الأدوية التي تؤثر على تخثر الدم وتكون تخثرات مثل: و آرفارين (Coumadin) - إذا كُنت تتناول وارفارين، قد يتابع الطبيب حالتك في بداية وفي

نهایّهٔ العلاخ بـ دولوکس تنیقی ادویة مضادة للالتهاب لا ستیرونیدیة (NSAIDs) مثل: ایبوپروفین، ناپروکسین او اسپرین. قد

تزيد هذه الأدوية خطر حدوث نزيف • الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي • مدرات البول • الأِدُويةِ التّي تخفض مستوى الحموضة في المعدة (قد تسبب تحرير مبكر لـ دولوكس تيقع وبذلك المس

بالفاعلية) الادوية التي تخفض ضغط الدم
 يؤثر دولوكس تيقع على تركيز أدوية أخرى في الدم:

يوسر ويوسك. ـ ثيوفيلين (لعلاج الربو) ـ مضادات الاكتناب ثلاثية الحلقات مثل: ديسيير امين، نور تريپتيلين، أميتريپتيلين وإميير امين

فيتوثيازينات أدوية العلاج اضطرابات نظم القلب: فليكانيد، پرويافينون ثيوريدازين، قد يودي الدمج إلى مشاكل صعبة في وتيرة نظم القلب أو إلى الموت المفاجئ

تؤثر الألووية التالية على تركيز دولوكس تبقع في الدم:
 كوينيدين لعلاج اضطرابات نظم القلب
 فلوكسيتين، فلوڤوكسامين، پاروكسيتين

سيميتردين و المسلم الم \_\_\_\_\_\_ حسر و حس حسم المدونونون من سيير وفلوكساسين أو إنوكساسين ذا شعرت بأي ردّة فعل استثنائية خلال تناول أحد الأدوية المذكورة أعلاه مع دولوكس تيقع، عليك أن تتوجه إلى الطبيب

يجب على طبيبك أن يقرر فيما إذا كان يمكنك تناول دولوكس تيقع مع أدوية أخرى. لا تبدأ ولا تتوقف عن تناول أي دواء، بما في ذلك الأدوية التي تم شراؤها دون وصفة طبية والأعشاب الطبية، قبل أن

شير طبيبك

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول دولوكس تيڤع مع أو من دون طعام. استعمال الدواء واستهلاك الكحول من شأن تناول دولوكس تيقع مع استهلاك الكحول الزائد أن يسبب ضررا شديدا للكبد. تجنّب استهلاك الكحول بكثرة أثناء فترة تناول دولوكس تيقع.

الحمل والإرضاع

الحمل والإرضاع

استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل أن تتناولي أي دواء.

البغي طبيبك فورًا إذا أصبحت حاملًا أو إذا كنت تعتقدين أنك أصحبت حاملًا أثناء تناولك دولوكس تبغي قط بيد أن تتحدثي مع تبغير قد يلحق دولوكس تبغي فقط بعد أن تتحدثي مع الطبيب حول الفوائد المحتملة و الأضرار التي قد تلحق بعنينك.

و تأكدي من أن قابلتك و رأو الطبيب يعلمان أنك تتعالجين بدولوكس تبغير عند تناول أدوية من نوع SSRI و حالاً الحدوث و SSRI، بما في ذلك دولوكس تبغير، خلال نهاية الثلث الثالث من الحمل، قد يزداد خطر حدوث مضاعفات تتطلب مكوث المولود في المستشفى لفترة طويلة، مساعنته على التنفس، وتغذيته عبر مضاعفات تتطلب مكوث المولود في المستشفى لفترة طويلة، مساعنته على التنفس، وتغذيته عبر و- SINKI) بما هي ذلك دولوكس تبقع، خلال نهاية الثلث الثالث من الحماً، كه يزداد خطر حدوث مضاعفات تتطلب مكوث المولود في المستشفى لفترة طويلة، مساعدته على التنفس، وتغذيته عبر انبوب تغذية قد تحدث هذه المضاعفات بعد الولادة مباشرة، وقد تتضمن ضائقة تنفسية، ازرقاق البشرة، انقطاع التنفس، تشنجات، عدم استقرار درجة حرارة الجمع، صعوبات في الأكل، تقيوات، نقص السكر في الدم، ارتخاه المصنلات، تصلب العضلات، منعكسات مفرطة، رعشه، عصبية، تململا وبكاة متواصلا إذا ظهر أي من هذه الأعراض لدى طفلك بعد الولادة، أه أذا شعرت والتاة، ما مدالاً المنافقة المنافقة المنافقة الأعداد، الأعداد أن من هذه الأعراض لدى طفلك بعد الولادة، أه أذا شعرت والتاة، ما مدالة النافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النافقة المنافقة المن

صلاً. إذا ظهر أي من هذه الأعراض لدى طفاكِ بعد الولادة، أو إذا شعرتِ بالقلق على صحة الطفل، نبري القابلة أو طبيبك. أخبري طبيك إذا كنت مرضعة أو تخططين للرضاعة. ينتقل دولوكس تيقع عبر حليب الأم، وقد يلحق ضرراً بالطفل. لا يوصى باستعمال دولوكس تيقع أثناء الرضاعة. استشيري طبيبك حول الطريقة الأفضل لإطعام طفاكي أثناء تناول دولوكس تيقع. لتعمال الماكينات سياقة واس

قد يُودي استعمال هذا الدواء إلى النعاس أو قد يؤثر في قدرتك على اتخاذ القرارات، على التفكير السليم أو على رد الفعل السريع. لذا يجب توخي الحذر أثناء سياقة المركبة، تشغيل ماكينات خطيرة، وممارسة أي نشاط يتطلب اليقظة. لا تقد سيارة ولا تستعمل أجهزة أو ماكينات قبل أن تعرف كيف يؤثر دولوكس تيڤع فيك.

معلومات مهمّة عن قسم من مكوّنات الدواء يحتوي دولوكس تيقع على سكروز . إذا أخبرك طبيبك أن لديك عدم قدرة على تحمّل أنواع معينة من السكر، استشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء. 3. كيف تستعمل الدواء؟ ، تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدليّ إذا لم

تعمال المس

تكن متأكَّدًا فيما يتعلق بالجّرعة وطريقة العُلاج بالمستَحض

الجرعة وطريقة العلاج بُحددهما الطبيب، فقط بُحدتم العثور العرب الى تغيير الجرعة حتى العثور على العثور على العثور على العثور على العرب العربية العربية المربعة المعتادة هي:

• لالم الاعتلال العصبي الناتج عن السكري: الجرعة الاعتيادية من دولوكس تيقع هي 60 ملغ مرة في اليوم. سيحدد الطبيب الجرعة المناسبة لك المربعة المناسبة لك المناسبة لك المربعة المناسبة لك المن اليوم. سيحدد الطبيب الجرعة المناسبة لك. • لألم العضائات الهيكلية المزمن واضطراب القلق العام: سيحصل معظم مثلقي العلاج على 60 ملغ مرة في اليوم، وسيحدد الطبيب الجرعة المناسبة لك. يحتاج قسم من مثلقي العلاج إلى جرعة ابتدائية مرة في اليوم، وسيحدد الطبيب الجرعة المناسبة لك. يحتاج قسم من مثلقي العلاج إلى جرعة ابتدائية مدارها

ىر دائمًا ح

تيقع 30 ملغ مرة في اليوم لمدة أسبوع، وبعد ذلك يتم تناوّل جرعة اعتيادية مقدارها

من دونوكس بيع 30 ملع مره في اليوم لمده اسبوع، وبعد ذلك يهم تداول جرعه اعبياديه مقدار ها ملم مرة في اليوم. للمكتاب سيحصل معظم متلقي العلاج على 60 ملغ مرة في اليوم. يحتاج قسم من متلقي العلاج المكتاب سيحصل معظم متلقي العلاج على 60 ملغ مرة في اليوم لمدة اسبوع، وبعد ذلك يتم تناول جرعة اعتبادية مقدار ها 60 ملغ مرة في اليوم. المسنون - يجب بدء العلاج بجرعة ابتدائية مقدار ها 30 ملغ مرة في اليوم. فقط، بتم التعقير في رفع الحرعة إلى 60 ملغ مرة في اليوم. الألم المعضلين الليفي من 30 ملغ مرة في اليوم. الألم المعضلين الليفي هي 30 ملغ مرة في اليوم. اليوم مدة أسبوع، وبعد ذلك يتم تناول جرعة اعتبادية مقدار ها 60 ملغ مرة في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يظهر تأثير العلاج الدوائي بدولوكس تيقع غالبا بعد 4-2 أسابيع من العلاج.

طريقة الاستعمال

طريقة الاستعمال دولوكس تيقع معذ التناول الفموي. ودلوكس تيقع على خبيبات مغلّفة منعًا لتفككها في المعدة. عليه ابتلاع التناول الفموي. عليه المبدئ المنافقة منعًا لتفككها في المعدة. لذلك، لمنع مضع أو سحق محتوى الكبسولة، ولا يجوز فتح الكبسولة ورش محتواها على الطعام أو الشراب على غلاف الخبيبات. كذلك منع تأثير الطعام أو الشراب على غلاف الخبيبات. كذلك، الدواء ليس معذًا التناول عن طريق أنبوب أنفي معدي لأن محتوى الكبسولة قد يسد الأنبوب. تعدث مع طبيبك حول المدة التي يتعبن عليك فيها متابعة تناول دولوكس تيقع. لا تتوقف عن تناول دولوكس تيقع. و تتوقف عن تناول دولوكس تيقع. و ان تتحدث مع طبيبك أولا.

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبية فقط دولوكس تيقع 60 ملغ كبسولات مضادة لحموضة المعدة

إذا تتاولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى، اتصل فورا بطبيبك أو بالصيدلي الخاص بك. يمكن أن تشتمل أعراض الجرعة المفرطة على نعاس، مثبات، متلازمة السير وتونين (رد فعل قد يُسبب هلوسات، عصبية، سُبات، وتيرة نظم قلب سريعة، عدم استقرار ضغط الدم، دوار، تعرق، احمرار الوجنتين، حُمّى، رعشة، تصلب العضلات، انقباض العضلات، منعكسات متزايدة، نقص التناسق، غثيان، تقيو واسهال)، اختلاجات، إغماء، ضغط دم مذخفض، ضغط دم مرتفع، تقيوات ونبض سريع. إذا تنارلت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل عن طريق الخطأ من هذا الدواء، توجّة حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابع المستشفى، مصطحبًا معك عبوة الدواء.

إلى عرف المعواري حجد المستسمى المستسمى المستسم المستبها حال تذكرك. إذا تذكرت في وقت قريب من موعد تناول الجرعة التالية، تخطّ الجرعة التي نسيتها وتناول الجرعة التالية فقط لا تتناول جرعة

ىفة من دولوكس تىڤع. مصاعبة من موبويس بيع. عليك المداومة على العلاج تبعا لتوصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا توقفت عن تناول الدواء: إذا اعتقد الطبيب أنك لم تعد بحاجة إلى دولوكس تبقع، سيوصبي لك بخفض الجر عة التي تتناولها التوقف عن تناول هذا الجر الله التوقف عن تناول هذا الدواء بسرعة كبيرة أو عندما تنتقل من الدواء فجاة دون استشارة الطبيب. عندما تنتقل من تناول الدواء بسرعة كبيرة أو عندما تنتقل من تناوُل دواء مضّاد للاكتناب بسرعة كبيرة، قد تشعر بالأعراض الحادة التالية: دوار، صداع، غيّيان، إسهال، إحساس بالخدر (لسعات ووخزات)، تعلمل وعصبية، تقيّوات، أرق، قلق، ارتباك، إحساس بعدم الإستقرار العاطفي، ظهور هوس خفيف، طنين (سماع رنين في الأنن دون وجود اي صوت خارجي)، تشنجات، تعرّق مفرط وإنهاك.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من الملصق على عبوّة الدواء ومن الجرعة الدوانيّة في كلّ مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظّارات الطنيّة إذا كنت بحاجة البها. إذا كانت لديك أسنلة أخرى تَنعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي. 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، يمكن أن يسبّب استعمال دولوكس تيقّع أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تقرّع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبيّة. فمن المحتمل ألا تعاني من أيّ منها.

الأعراض الجانبية الشديدة: أفكار وتصرفات انتحارية: يجب التوجه إلى الطبيب ف

افكار وتصرفات انتحارية:
بجب القوجة إلى الطبيب فورًا إذا شعرت بأحد الأعراض التالية، بالأخص إذا كانت أعراضًا جديدة،
متفاقمة أو إذا كانت تقلقك: محاولات انتحارية، دوافع خطيرة، عدوانية، غضب، عنف، أفكار عن
الانتحار أو الموت، ظهرر اكتئاب أو تفاقم الاكتئاب، ظهور ظأق أو تفاقم الظفي، نوبات هلم، شعور
قوي من عدم الراحة، التململ، ظهور عصبية أو تفاقم العصبية، مشاكل في النوم، ارتفاع حاد على
النشاط أو الكلام (هوس)، تغييرات أخرى في السلوك أو المزاج.
علامات تضرر الكبد - حكة، ألم في الجزء الأيمن العلوي من البطن، بول داكن، اصفر ار الجلد أو
الجزء الأبيض من العين (يرقان)، تصنحم الكبد، ارتفاع حاذ بانزيمات الكبد. في حال وجود علامات

الخراج الوليس من احتيار الروس)، عنسه أحدة الروس المنطقة الدم عند الوقوف والتسبب بالدوار أو الإغماء، بالأساس عند تناول للمنطقة أول مرة، أو عند زيادة الجرعة. قد يؤدي دولوكس تبقع لزيادة مخاطر السقوط، "«؛ أن التناسب المنطقة ا

بالأساس لدى المسنين.

متلازمة السيروتوتين - حالة قد تشكل خطرًا على الحياة؛ قد تشتمل الأعراض على: رد فعل قد يسبب الشعور بتغييرات في الحالة النفسية (مثل: عصبية، هلوسات، سبات)، عدم استقرار ذاتي (نبض سريع، ضغط دم غير مستقر، دوار، تعرق مفرط، احمرار الوجنتين، ارتفاع حرارة الجسم)، مشاكل عصبية عضلية ورعشة، تصلب، تشنجات في الحضات، منعكسات منز ايدة، نفص التناسق)، تشنجات وأو أعراض في الجهاز الهضمي (مثل: غثيان، تقيق، وغير من الأدوية المضادة للاكتناب، أن يزيد من احتمال حدوث علاية المضادة للاكتناب، أن يزيد من احتمال حدوث حالاتهاب غير السترونيدية ((NSAIDs)) أو أسيرين, يُحتمل أيضًا حدوث نزيف بوتيرة أعلى بعد الولادة. للالتهاب غير السترونيدية ((NSAIDs)) أو أسيرين, يُحتمل أيضًا حدوث نزيف بوتيرة أعلى بعد الولادة. و لدود فعل خلاية شديدة قد تةدي الى أروق في الاستعمال.

مدسهب عبر مسروبيبه (NOAILDS) او اسپرين, يحدما ايضا خدوت نزيف بوتيرة اعلى بعد الولادة. و ردود فعل جلدية شديدة - قد يسبب دولوكس تيقع رذات فعل جلدية شديدة قد تؤدي إلى وقف الاستعمال.
قد تكون هذالك حاجة لملاح هذه الإعراض في المستشفى وهي قد تشكّل خطرا على الحياة. توجّه فورا الطبيب أو لخدمة الطوارئ الطبية إذا كانت لديك بثرات على الجلد، طفح جلدي يتقشر، جروح في الفع، شرى أو أعراض تحسسية أخرى.

الفم، شرى أو أعراض تحسسية أخرى.

• حالات من الهؤس - طاقة (ائدة جدا، اضطرابات نوم شديدة، زحام فكري، سلوك متهؤر، أفكار كبيرة بصبورة استثنائية، عصبية أو سعادة شديدين، كلام أكثر أو أسرع من العادة.

• زرق ضيق الزاوية (مشاكل في الروية) - آلام في العينين، تغييرات في الروية، انتفاخ أو احمرار حول العين. يتواجد قسم من الناس فقط ضمن الخطورة للإصبابة بهذه الأعراض الجانبية. قد تر غب بإجراء فحص للعينين لمعرفة إن كنت في دائرة الخطور ولتلقي العلاج الوقاتي في حال كان الأمر كذلك.

• نوبات الصرع والتشنيجات

• سعوبات منخفضة من الصوديوم في الدم - (يتواجد المسنون ضمن الخطورة الزائدة للإصابة بهذا العرض): قد تشمل الأعراض على الشعور بالم الرأس، الضعف أو انعدام التوازن، البليلة، صعوبة التركيز أو التفكير أو مشاكل في الذاكرة. من بين الأعراض الأكثر خطورة الهذيان، فقدان الوعي، نوبات الصرع، الخييوبة، توقف التنفس والموت.

• مشاكل متعلق بالتبول - قد تشمل الأعراض قلة تدفق البول، انعدام القدرة على التبرل. شُعاكل تتعلَق بالتبوّل - قد تشمل الأعراض قلّة تدفّق البول، انعدام القدرة على التبوّل. • اضطرابات في الأداع الجنسي - قد يؤدي تناول السيروتونين ومثبطات استرداد السيريتونين

والنور أدرينالين (SNRIs)، وبضمن ذلك دولوكس تيقع، لمشاكل في الأداء الجنسي. قد تشتمل الأعراض لدى الرجال على: • القذف المتأخر أو انعدام القدرة على الوصول إلى القذف • تراجع الرغبة الجنسية • مشاكل في الوصول إلى الانتصاب أو الحفاظ عليه

قد تشمل الأعراض لدى النساء على: • تراجع الرغبة الجنسية • تأخير النشوة أو انعدام القدرة على الوصول للنشوة

تحدّث مع طبيبك إذا حصلت لديك تغييرات في الأداء الجنسي، أو إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن الأداء الجنسي خلال فترة العلاج بدولوكس تيقع. قد يستطيع الطبيب عرض الحلول عليك. الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً التي تمت مشاهدتها لدى البالغين في التجارب السريرية الأعراض الجانبية التي تمت مشاهدتها بشيوع واسع لدى البالغين ممن تلقوا العلاج بدولوكس تيقع

الأعراض الجانبية ، مسر الأعراض الجانبية التي تمت مشاهدتها بسبور (بحسب مختلف الاستطبابات) هي: السائد المعتدل العصبي المرتبط بالاعتلال العصال العصافي المرتبط بالاعتلال العصافي الفرة و الا والمعلمية الاستطاعيات المستطيعيات الموتبط بالاعتلال العصبي السكري المحيطي - غثيان، شعور بالنعاس، تراجع وألم الم والشهية، إمساك، فرط التعرق وجفاف الغم • الألم العصلي التلقي - غثيان، جفاف الفم، إمساك، شعور بالنعاس، فرط التعرق، عدم الراحة، تراجع الشهية • ألم مزمن نتيجة الالتهاب عظمي مفصلي - غثيان، تجب، إمساك، جفاف الفم، ارق، شعور بالنعاس والدوار • ألم مزمن أسفل الظهر - غثيان، جفاف الفم، أرق، شُعور بالخدر، إمساك، دوار وتُعب

عراض جانبية تمت مشاهدتها بشيوع %5 أو أكثر بالنسبة لمجموعة الرقابة في التجارب السريرية على البسعين: غثيان؛ آلام في الرأس (صُداع)؛ جفاف في الفم؛ شعور بالخدر؛ تعب؛ اضطرابات النوم (أرق)؛ إمساك؛ دوار؛ حالات إسهال؛ تراجع الشهية؛ فرط التعرق؛ ألم البطن (مغص)

أعراض جانبية تمت مشاهدتها بشيوع 2% أو أكثر بالنسبة أمجموعة الرقابة في التجارب السريرية على البالغين الذين يعانون من الاكتتاب الكبير واضطراب الهلع العام: رس جابيه نمت متناهدتها بتنبوع %2 أو اكثر بالنسبة لمجموعة الرقابة في التجارب السريرية على البلغين الذين يعانون من الاكتئاب الكبير واضطراب الهلم العاني والون من الاكتئاب الكبير واضطرابات في العينين - روية مشوشة واضطرابات في الجهاز الهضمي - غثيان، جفاف الفو، إمساك، حالات إسهال، ألم البطن (مغض)، حالات تقيو و اضطرابات عامة - تعب و اضطرابات أيضية (تبادل المواد) وغذائية - تراجع الشهية و اضطرابات في الجهاز العصبي - آلم في الرأس (صداع)، دوار، شعور بالنعاس، رجفة و اضطرابات نفسية - أرق (اضطرابات الذم)، تململ، حالات الهلم و اضطرابات في الجهاز التناسلي والتدبين نفسوة المتدبين منافرة استثنائية و المنطن العلم المناسبة والمناسبة والتناسبة والتناسبة التناسبة المناسبة في الجلد - فرط التعرق واضطرابات تنفسية تمت مشاهدتها شده على 10 على 11 المناسبة تمت الجلد - فرط التعرق أعراض جانبية تمت مشاهدتها شده على 20 اله أكثر القذة المناسبة أعداد القدة قد العداد - فرط التعرق أعراض جانبية تمت مشاهدتها شده على 20 اله أكثر القذة المناسبة أعداد المناسبة تمت مشاهدتها شده على 20 اله أكثر القذة المناسبة أعداد المناسبة المناسبة المناسبة أعداد المناسبة المناسبة

أعراض جانبية تمت مشاهدتها بشيوع %2 أو أكثر بالنسبّة لمجموعة الرقابة في التجارب السريرية على البالغين الذين يعانون من ألم الاعتلال العصبي المرتبط بالاعتلال العصبي السكري المحيطي، الألم العضلي التليقي، التهاب عظمي مفصلي وألم أسفل الظهر:

العضلي انتيفي، النهاب عظمي مفصلي والم اسفل الظهر: 

- اضطرابات في الجهاز الهضمي - غنيان، جفاف القرء إسبال، الم البطن، حالات تقيو، صعوبات في البهاز البطن، حالات تقيو، صعوبات في البهاز المنطقة و المنطقة - تراجع الشيعية و العضلات الهيكلية التنفس العلوي، إنفلونزا و اضطرابات أوسطن الهيكلية تتنفج العضلات و أصطرابات في الجهاز العصبي - ألم في الراس (صنداع)، شعور بالخدر، دوار، مذل، رجفة و اضطرابات نفسية - اضطرابات الهيكلية، النفره الراس (صنداع)، شعور بالخدر، دوار، مذل، رجفة و اضطرابات نفسية - اضطرابات الهيكلية، المنطقة و الشيين - انحدام القدرة على الوصول للانتصاب، اضطرابات المناسقية وفي الصدر - سعال و اضطرابات في الجلد والانسجة تحت الجلد - فرط المناسقة وفي الصدر - سعال و اضطرابات في الجلد والانسجة تحت الجلد - فرط المناسقة وفي الصدر - المعال و المناسقة المنا أعراض جانبية أخرى تمت مشاهدتها خلال تقييم التجارب السريرية على دولوكسيتين لدى البالغين: • اضطرابات في القلب - الشائعة: خفقان القلب (ضربات/نبضات القلب). غير الشائعة: نوبة قلبية، و تيرة نبض قلب سريعة، متلازمة اعتلال تلكوتسوبو القلبي (takotsubo cardiomyopathy)

وتيرة نبض قلب سريعة، متلازمة اعتلال تاكوتسوبو القلبي (lakotsubo cardiomyopathy) والطين (cakotsubo cardiomyopathy) والطين والطنين والطنين والطنين والطنين والطنين والطنين والطنين والطنين المسلماء غير الثنائعة: قار والفرتيجو. غير الثنائعة: الما الأنذين والطنين المسلماء غير الثنائعة: الشائعة: الشائعة: ورية منوح المسلماء غير الثنائعة: عاد التي الروية و اضطرابات المهضمة مشوشة. غير الثنائعة: عاد التي الجهاز الهنائعة: علات التي المهائلة المنوعة في البنع، حازوقة، التهاب المعددة، نزيف الجهاز الهنمية، وتصمية والمنائعة: التهاب الفرة والشفتين. النادرة: تقرحات في المعددة واضطرابات المهضمة المنائعة: الشمور بعدم الراحة (malaiss) والعطش النادرة: اضطرابات في المشيء وحلات العدوى والأقات غير الثنائعة: التهاب في المعددة والأمعاء والتهاب الأوتار الصوتية وقحوص إضافية - الشائعة: ارتفاع غير الثنائعة: التهاب في المعددة والأمعاء والتهاب الأوتار الصوتية وقحوص إضافية - الشائعة: ارتفاع الشائعة: التهاب المعائلة والأمعاء والشائعة: التفاعة عير الشائعة: شد المصلات الهيكلية والأسمجة الضائمة الشائعة: الله في المحسلات الهيكلية عير الشائعة: شد المصلات وتشيخ الحسائلة الذوق، تعب ومذل غير وتشائعة: اصطرابات في الانتباه، حركات متكررة لاإرادية (dyskinesia))، تشنجات لاإرادية في المضلات الوجودة نوم سيئة النادرة: انعدام القدرة على الكلام (dyskinesia))، تشنجات لاإرادية في المنائعة: التبول وتيادة وصطوابات لتصار النائعة: التبول وتشرة على الكواب نقيادية والمسائلة البولية والمائلة: التبول بوتيرة عالية. غير الشائعة: التبول وتيرة عالية. غير الشائعة: التبول ورائحة بول غير اعتيادية المنطرة على الشؤل، رغية شديدة بالتبول، القيلة المؤلون، والشعة شدية التبول، الشعة التبول الشعودة على الشول، عير الشائعة: التبول والشعة ولم غير الشائعة: التبول والشعة بول غير الشائعة: التبول والشعة بول غير الشائعة التبول الشعودة على الشول، عير الشائعة التبول والشعة بول غير اعتبائية التبول الشعودة على الشول، عير الشائعة التبول الشعودة على الشول المؤلفة المنول الشعودة التبول الشعودة على الشول المنائعة التبول الشعودة على الشول المنائعة التبول الانتجار • اصطرابات هي الكلى والمسالك البولية - الشائعة: التبول بوتيرة عالية. غير الشائعة: التبول بوتيرة عالية. غير الشائعة: التعدام القدرة على التبوق ورائحة بول غير اعتيادية • اضطرابات في الجهاز التناسلي والثنيون الثانون الشائعة: أعراض سن انقطاع الطمث، العجز الجنسي والألم في الخصيتين. النادرة: اضطرابات غير الشائعة: أعراض سن انقطاع الطمث، العجز الجنسي والألم في الخصيتين. النادرة: اضطرابات الدين والصدر - الشائعة: التناوب الم الليعوم. غير الشائعة: صغط في الحاملي، من رائد للإصابة بالكندس والصدر - الشائعة: عكم النادرة: كمة (ecchymosis) من الرائد الإصابة بالكندس، ميل زائد للإصابة بالكنوب الهومية - الشائعة: عقب الدائرة: كمة (ecchymosis) من الورم الدموي) • اضطرابات الأوعية المدوية - الشائعة: هيات الحرارة. غير الشائعة: احمر الوجه، انخفاض ضغط الدم عند الوقوف والشعور بالبرودة في الأطراف الأعراض الجانبية التي تمت مشاهدتها بعد بدء التسويق:

الاعراض الجانبية التي تمت مشاهدتها بعد بده التسويق:
التهاب شديد في البنكرياس، صدمة تأقية، عدوانية و غضب (وخصوصا في المراحل المبكرة من التهاب شديد في البينكرياس، صدمة تأقية، عدوانية و غضب (وخصوصا في المراحف، الزّرق متضيق العلاج أو بعد وقف العلاج)، وذمة في الوجه، في تجويف الفم، في البطن والأطراف، الزّروعة الدموية التي على سطح الجلد (التهاب القولون (التهاب القولون)، المصدون دن دن المشخص)، التهابات الأوعية الدموية التي على سطح الجلد (التهاب نزيف أمراض النساء، هذيان، مستويات سكر مرتفعة في الدم، فرط يروككتين الدم، فرط التحسس، أزمة ارتفاع في ضغط الدم، تشنجات في العضلات، طفح جلدي، يوركتين الدم، فرط التعسل عسر عبد وقف العلاج، اضطراب نبض القلب فوق البطيني، طنين (بعد وقف العلاج)، صرّز - تشنج الفك (trismus) والشرى إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أيِّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبيَ لم يُذكّر في النشرة، عليك استشارة الطبيب. التبليغ عن الأعراض الجانبية يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على الرابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدواني"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ((www.health.gov.il) للذي يوجهك الى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو بواسطة الذخول إلى الرابط:

كيف يُخزّن الدواء؟

https://sideeffects.health.gov.il

تيض يسري المواجء
 و تجلّب التسمّم! بجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال روية الأولاد و/أو الأطفال، و هكذا تتجلّب التسمّم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
 لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوّة. تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من نفس الشهر.
 و يجب التغزين بدرجة حرارة أقل من 2°25.
 فيمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو القمامة المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الادية التي تدخي من الاستعمال بعد. تساعد هذه الوسائل في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية بالإضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضًا على المواد غير الفعّالة التالية: Sugar spheres, hypromellose phthalate, hypromellose, triethyl citrate, hydroxypropylcellulose, talc, titanium dioxide, black iron oxide (E172),

imprinting ink black. brilliant blue FCF – FD&C blue 1 المركّب 2 ملغ يحتوي أيضا على المركّب (E133)كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة دولوكس تيقع هو كيسولة مقاومة للهضم في المعدة. تحتوي كل كيسولة من **دولوكس تيقع على** كبيبات دولوكس تفكها في المعدة. دولوكسيتين هيدر وكلوريد مغلّفة بغلاف معوي يحميها من حموضة المعدة ويمنع تفككها في المعدة.

دولوكس تيقع 30 ملغ: كبسولة ذات رأس أزرق وجسم بلون رمادي. مطبوع عليها 30 DLX. دولوكس ت**يقَّة 60 ملغ**: كيسولة ذات رأس أبيض وجسم بلون رمادي. ومطبوع عليها DLX 60. دولوكس تيفَّة 30 ملغ ودولوكس تيفَّة 60 ملغ مُغلفة ببليستر (شريط). تحتوي العبوة على 7، 10، 14، 28، 30، 56 أو 100 كيسولة. قد لا تُسوق كل أحجام العبوّات.

المُنتج وصاحب التسجيل: تيڤع إسرائيل م.ض. شَارَعُ دَقُورًا هَنَقْيِنًا 124، تَلَ أَبِيبِ 6944020.

تمّ تحرير النشرة في تشرين الثاني 2023. رَقَم تَسْجَيل الدّواء في سَجَل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: دولوكس نيقع 30 ملغ: 35976-88-166 دولوكس

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين

لمزيدٍ من المعلومات عن المستحضر وللاطلاع على النشرات المحدِّثة باللغة العبرية، العربية والْإِنَّجُليزية، امسحوا الرَّمز التالي: For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in Hebrew, Arabic and English, please scan the code:



دولوكس تيڤع 60 ملغ

teva

دولوكس تيقع 60 ملغ: 36004-99-166