

نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

لـ Levodopa 20 ملغم / مل

موتوهيدرات) 5 مل
المواد غير الفعالة:
إقرأ النشرة بتمعن
على معلومات موجزة

يُوصى هذا الدواء لعلاج مرضك / من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضره
ولو بذاك أن مرضهم مشابه لمرضك / حالتهم الطبية مشابهة.
الدواء غير مخصص للأطفال والمرأة دون عمر 18 سنة.
بالإضافة للنشرة، تتوفّر للمستحضر ديدودوبا بطاقة معلومات حول الأمان للمتّ
تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجّب عليك معرفتها
بعد العلاج وخلال العلاج بديدودوبا والتصرّف وفقها. يجب قراءة بطاقة المعل
 حول الأمان للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر.
حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

(1) لأي غرض مخصوص الدواء؟

ديدودوبا مخصوص لمعالجة مرض الباركينسون في مرحلة متقدمة، الذي يستجيب
بليقودوبا، المترافق بحركة مفرطة شاذة وخطيرة وإضطرابات لا إرادية في ا
حيث أن المزيج الحالي للمستحضرات الطبية لعلاج الباركينسون لم يكن ناجح
الفصيلة العلاجية: مركبات مضادة للباركينسون
ليقودوبا - من مشتقات الدوپامين
كاربيدوبا (على شكل مونوهيدرات) - مثبط للإنزيم دوبا - ديكاربوكسيلاز
يتتمي ديدودوبا لفصيلة الأدوية التي تستعمل لعلاج مرض الباركينسون. هو عب
جل الذي ينتقل عبر مضخة وأنبوب الذي يدخل في الأمعاء (الأمعاء الدقيقة).
بحته، لديه به باع على م كبس: فعالبه: ليقو دوباه كاربيدوبا (عل شكا، منه بعده

يحتوي ديدروپا على مركبين فعاليين: ليقودوپا وكاربیدوپا (على شكل مونوهيدرات).

طريقة عمل الدواء:

- يتحول ليقودوپا في الجسم إلى دوبامين، الذي يضاف للدوبامين الموجود أصلًا في الدماغ والحبل الشوكي. يساعد الدوبامين في نقل الإشارات بين الخلايا العصبية.
- إن وجود أقل مما ينبغي من الدوبامين يسبب أعراض مرض الباركنسون، مثل: رجفة، الشعور بتصلب، حركة بطيئة، ومشاكل في الحفاظ على توازن الجسم.
- إن العلاج بليقودوپا يرفع من نسبة الدوبامين في جسمك وبذلك يقلل من تلك الأعراض.
- إن وظيفة كاربیدوپا (على شكل مونوهيدرات) هي التحسين من تأثير ليقودوپا والتقليل من الأعراض الجانبية الخاصة بليقودوپا.

(2) قبل إستعمال الدواء

2.1 لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية»).
- كنت تعاني من مشكلة في العين تسمى «چلوكوما ضيقية الزاوية».
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في القلب.

2.2 تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- قبا العلاج بـ**ديودوبا**، احك للطبيب اذا:
- لا يجوز استعمال ديودوبا إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات التي ذكرت أعلاه. إذا لم تكن واثقاً، راجع الطبيب قبل إستعمال الدواء.
- عانيت في الماضي من سرطان الجلد أو لديك شامات شاذة أو علامات على الجلد التي لم تفχص من قبل الطبيب.
- أو هورمونات الغدة الدرقية (**hyperthyroidism**).
- لديك مشاكل هورمونية مثل فرط إنتاج هورمون الكورتيزول (متلازمة كوشينج)،
- لديك ورم في الغدة الكظرية (**pheochromocytoma**).
- موكلوبيميد أو فينيلزيدين].
- كنت تتناول أدوية معينة لعلاج الإكتئاب [مستحضرات من فصيلة مثبطات MAO-A (monoamineoxidase) اللا إنتقائية أو مثبطات MAO-A الإنتقائية، مثل:
- إجتازت حادث (سكنة) دماغي شديد.
- كنت تعاني من إضطرابات خطيرة في نظم القلب (لا نظمية).

- إجتازت ذات مرة نوبة قلبية، إنسدا مشاكل أخرى في القلب، بما في ذلك
- كنت تعاني من مشكلة في الرئتين

- عانيت ذات مرة من مشكلة هورمونية.
- عانيت ذات مرة من الإكتئاب مع ميل للإنتشار أو من أية مشكلة نفسية أخرى.
- كنت تعاني من مرض في العين يسمى «جلوكوما واسعة الزاوية».
- حدث لديك ذات مرة قرحة في المعدة (ulcer).
- عانيت ذات مرة من إختلالات (تشنجات).
- إجتررت ذات مرة عملية جراحية في منطقة أعلى البطن.
- تم التبليغ عن ضعف عام يتفاقم مع الوقت، ألم، تنميل أو خدر في الأصابع أو في القدم [إلتهاب متعدد الأعصاب (إعتلال الأعصاب المتعدد)] لدى متعالجين الذين تم علاجهم بليليقوودوبا / كاربيدوپا جل الذي يُعطي مباشرة في الأمعاء. سيتحقق طببيك مما إذا وجدت هناك علامات وأعراض أمراض الجهاز العصبي المحيطي (الإعتلال العصبي)، قبل بدء العلاج بليليقوودوبا / كاربيدوپا جل الذي يُعطي مباشرة في الأمعاء

العصبي المحيطي أو حالة طبية متعلقة بأمراض الجهاز العصبي المحيطي.
إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة سابقاً (أو إذا لم تكن واثقاً)، إستشر الطبيب
قبل إستعمال الدواء.

من المهم أن تكون على دراية بالمعلومات التالية وبالاعراض الجانبية التي قد
تتطور عند إستعمال ديدوپيا:

المتلازمة العصبية الخبيثة:

لا تتوقف عن العلاج أو تخفض المقدار الدوائي من ديدوپيا إلا إذا أخبرك الطبيب
بذلك، لأن التوقف أو خفض المقدار الدوائي بشكل مفاجئ من ديدوپيا الخاص بك قد
يسبب سريعاً عرض خطير يسمى: «المتلازمة العصبية الخبيثة» (Neuroleptic
Malignant Syndrome (Malignant Syndrome (Anظر الفقرة 3 «كيفية إستعمال الدواء»؛ والفقرة 4
«الأعراض الجانبية»).

- لا تقم بالسيادة ولا تستعمل أدوات أو ماكنات إلى أن تشعر بأنك يقطأ بشكل تام ثانية أو عندما لا تشعر بدور بعد (أنظر فقرة «السيادة وإستعمال الماكنات»).

الشعور بنعاس ودوار:

إذا كنت تتغفو بشكل مفاجئ (نوبات من النوم)، أو تشعر بنعاس شديد، أو إذا كنت تشعر بدور:

«الأعراض الجاببية».

الجلد: في تغيرات
إذا كنت تلاحظ على الطبيب، إلّا
(أنظر الفقرة 4 «الأعراض الجلدية»)
اضطرابات في السسطة على

إصرارات في السيطرة على الدوا
إحك للطبيب إذا لاحظت أنت، عائلتك
تشوق للتصرف بشكل شاذ أو أنه غ
للتصرف بشكل الذي قد يلحق بك أو بآ

- السيطرة على الدوافع» ويمكن أن تشمل:

 - الإدمان على القمار
 - الأكل أو التبذير المبالغ فيهما
 - رغبة جنسية زائدة أو زيادة الأفكار أو الأحساس الجنسية من الجائز أن يضطر طبيبك إلى أن يفحص من جديد العلاجات التي تلقاها أنت.
 - يتناقش معك الطبيب حول سبل السيطرة أو تقليل تلك الأعراض (أنظر الفقرة 4 «الأعراض الجانبية»).

Dopamine Dysregulation Syndrome:

احك لطبيبك إذا لاحظت أنت، عائلتك أو الأشخاص الذين يعالجونك بتطور مؤشرات تشبع الإدمان، التي تؤدي إلى التلهف لمقدار دوائي مرتفع من ديودوبا وأدوية أخرى لعلاج مرض الباركنسون.

صعوبات في استعمال المضخة أو الأنبوب:

من الجائز أن تواجه صعوبات معينة تتعلق بإستعمال المضخة والأنبوب:

 - كنت تقاسي من تدني في القدرة على تشغيل المضخة والأنبوب، طرأ تفاقم في أعراض مرض الباركنسون لديك أو تواجه صعوبة أكبر في الحركة (bradykinesia) - هذه الأعراض من شأنها أن تدل على أن المضخة والأنبوب لا يعملان كما ينبغي.
 - إذا شعرت بألم في منطقة البطن، غثيان وكنت تتقيأ - راجع الطبيب حالاً (أنظر الفقرة 4 «الأعراض الجانبية»).
 - من الجائز أن تحدث لديك أعراض جانبية أخرى التي تؤثر على الأمعاء وعلى منطقة ولوح الأنابيب إلى الأمعاء (أنظر الفقرة 4 «الأعراض الجانبية»).

ديودوبا والسرطان:

يتفكك كاربيديوبا (إحدى المواد الفعالة في ديودوبا) في الجسم إلى المادة المسماة هييدرازين. هذه المادة قد تسبب ضرراً للمادة الوراثية لديك الأمر الذي قد يؤدي لحدوث سرطان. مع ذلك، لا يعرف فيما إذا كانت كمية الهيدرازين التي تنتج في المقادير الدوائية الموصى بها من ديودوبا يمكنها أن تسبب ذلك.

الأطفال والمرأهقون:

لا يجوز إعطاء ديودوبا لأطفال ولمرأهقين دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة

من الجائز أن يجري لك طبيبك فحوص الدم إذا كنت تتلقى هذا الدواء.

العمليات الجراحية:

قبل أن تجتاز عملية جراحية (بما في ذلك عملية جراحية لها صلة بالأسنان)، احك للطبيب (أو لطبيب الأسنان) بأنك تستعمل ديودوبا.

2.3 التداخلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

لا يجوز إستعمال ديودوبا إذا كنت تتناول أدوية لعلاج الإكتئاب من نوع المثبطات الإنقائية للإنزيم MAO-A أو مثبطات MAO-B غير الإنقائية، مثل موكلوبينيد أو فينيلازين.

قبل بدء العلاج بـ ديودوبا، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية إضافية لعلاج:

 - فقر الدم - مثل: أقراص الحديد.
 - السلس - مثل: آيزونيازيد.
 - القلق - مثل: بينزوديازيبينات.
 - غثيان - مثل: ميتوكلوبراميد.
 - ارتفاع ضغط الدم - مثل: مضادات ارتفاع ضغط الدم.
 - تقلصات في الأوعية الدموية - مثل: پاپاچيرين.
 - إختلالات (تشنجات) أو صرع - مثل: فينيتيوتين.
 - مرض الباركنسون - مثل: تولكاكاپون، إنتاكاپون، أماناتادين.
 - إضطرابات نفسية - مثل مضادات الذهان، بما في ذلك: فينوتيازينات، بوتيروفينونات وريسيپيريدون.
 - ردود فعل تحسسية خطيرة، ربو، إلتهاب مزمن في القصبات الهوائية، أمراض في القلب وإنخفاض ضغط الدم - مثل أدوية مضادة للفعل الكوليوني وملقطة للجملة العصبية الودية.
 - كنت تتناول دواء الذي قد يؤدي إلى إنخفاض ضغط الدم. هذا الأمر قد يؤدي إلى عرض يسمى «orthostatic hypotension» (هبوط ضغط الدم الإنفصابي) - عند نهوضك من الفراش أو من الكرسي أنت قد تشعر بدوار. قد يفاقم ديودوبا هذه الحالة. دائمًا يجب الإنتحال من وضعية إلى وضعية أخرى ببطء.

2.4 إستعمال ديودوبا مع الطعام والشراب:

لدى بعض المتعالجين، من الجائز لا يعمل ديدوپا جيداً إذا تم إستعماله مع، أو بعد فترة قصيرة من تناول طعام غني بالبروتينات - مثل: اللحوم، الأسماك، منتجات الحليب، البذور والجوز. إذا كنت تعتقد بأن هذا الأمر ينطبق عليك، إستشر طبيبك.

2.5 الحمل والإرضاع:

- إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدين بأنك قد تكوني حاملاً أو تخططين للحمل إستشيري طبيبك قبل بدء العلاج بـ ديدوپا.

- لا تستعمل ديودوپا إذا كنت في فترة الرضاعة.

2.6 السيادة وإستعمال الماكنات:

- لا يجوز السيادة أو إستعمال الأدواء أو الماكنات قبل أن تعرف كيف يؤثر ديودوپا عليك.
- قد يسبب لك ديودوپا النعاس الشديد، أو أحياناً، قد تتم بشكل مفاجئ (نوبات نوم).
- قد يخفض ديودوپا من ضغط الدم لديك ونتيجة لذلك يحدث دوار.

لا يجوز السيادة أو إستعمال الماكنات أو الأدواء إلى أن تشعر ثانية بأنك يقظ تماماً أو إلى أن يزول الدوار.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب إستعمال الدواء دائمًا حسب تعليمات الطبيب.
- المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

- عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء..
- معلومات بشأن ديدودوبا جل والمضخة
- ديدودوبا هو جل الذي يدخل بواسطة المضخة والأنبوب إلى داخل الأمعاء (الأمعاء الدقيقة) لديك.
- يتم تخزين الجل داخل حافظة بلاستيكية. الحافظة موصولة بالمضخة.
- المضخة موصولة بالأنبوب الذي في الأمعاء لديك (الأمعاء الدقيقة).
- خلال ساعات اليوم أنت ستلتقي بشكل متواصل مقداراً دوائياً منخفضاً من الدواء. هذا يعني أن نسبة الدواء في دمك تبقى ثابتة وبعض الأعراض الجانبية التي تتعلق بالحركة ستقل.

- يحدد لك طبيبك المقدار الدوائي والفتررة الزمنية للعلاج بديودوبا.
- عادة، يعطى في الصباح مقدار دوائي أكبر (مقدار دوائي تحميلى). هذا الأمر يتبع لك بلوغ نسبة الدواء المرغوب بها في دمك بسرعة. بعد هذا المقدار الدوائي، يعطى مقدار دوائي متواصل من الدواء (مقدار دوائي داعم).
- إذا دعت الحاجة، من الجائز أن تتلقى مقادير دوائية إضافية - يقرر طبيبك هذا الأمر.
- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً أكبر

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر مما ينبغي من ديودوپا أو إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

في هذه الحالات قد تظهر الأعراض التالية:

- صعوبة في فتح العينين.
- تقلصات عضلية خارجة عن السيطرة التي تؤثر على العينين، الرأس، العنق والجسم (dystonia).
- حركات لا إرادية (dyskinesia).
- ضربات قلب سريعة، بطيئة أو غير منتظمة بشكل شاذ (اضطرابات في نظم القلب).

إذا نسيت إستعمال ديودوپا

• تشنن الماء النقي أولاً ثم اغسله بالماء البارد الاتساع النازل

لا تتناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ديودوبا قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين.

لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن لا تعاني أي منها.

أعراض جانبية خطيرة نتيجة إستعمال ديودوبا:

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا لاحظت أحدي الأعراض الجانبية التالية - من الجائز أن تحتاج إلى علاج طبي طارئ:

- ألم شديد في العينين، صداع، تشوش الرؤية، غثيان ونقيض. يمكن أن تكون هذه علامات لجلوكوما ضيقية الراوية. هذا العرض ليس شائعاً (عرض يظهر لدى 10-1% من مستعملين من بين 1,000).

- سخونة، ألم في الحنجرة أو في الفم أو صعوبة في التنفس. من شأنها تلك أن تكون علامات مشكلة في خلايا الدم البيضاء المسماة «نقص الكريات المحببة». يجري لك طبيب فحص دم ليشخص ذلك. إن شروع هذا العرض نادر جداً (عرض قد يظهر في أقل من مستعمل واحد من بين 10,000 شخص).

- انتفاخ الوجه، اللسان أو الحنجرة، الذي قد يؤدي إلى صعوبة في البلع أو التنفس، أو طفح في الجلد من نوع شرى. من شأنها تلك أن تكون علامات لعرض تحسيسي خطير («رد فعل إستهادي»). إن شروع هذه العرض غير معروف من المعلومات المتوفرة.

توجه حالاً إلى طبيبك إذا لاحظت أحدي الأعراض الجانبية الخطيرة التالية:

• «المتلازمة العصبية الخبيثة» (Neuroleptic Malignant Syndrome): علامات هذا العرض يمكن أن تشمل:

- نظم قلب سريع، تغير في ضغط الدم وتعرق الذي يتراافق بسخونة.
- تسرع التنفس، تصلب في العضلات، تدني الوعي وسبات.
- نسب مرتفعة أكثر من البروتين في دمك (إنzyme يسمى «كرياتين فوسفوكيناز»). يتم قياسه من قبل طبيبك.

إن شروع هذا العرض هو نادر (عرض قد يظهر لدى 10-1% من مستعملين من بين 10,000).

أنظر الفقرة 3 «كيفية إستعمال الدواء» والفقرة 2.2 «تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء».

أعراض جانبية إضافية نتيجة إستعمال ديودوبا:

بلغ الطبيب إذا لاحظت أحدي الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):

- سقوط.
- تناقص الوزن.
- غثيان، إمساك.
- قلق، اكتئاب، أرق.
- حركات لا إرادية (dyskinesia)، تفاقم أعراض مرض الباركنسون.
- الشعور بدوران عند الوقوف أو تغيير الوضعية («orthostatic hypotension») نتيجة انخفاض ضغط الدم. قم بتغيير الوضعيات ببطء - لا تقف بسرعة.
- تلوثات في المسالك البولية.

أعراض جانبية شائعة (common) (أعراض تظهر لدى 10-1% من مستعملين من بين 100):

- زيادة الوزن.
- عدم إنظام نظم القلب.
- فقدان الشهية للطعام.
- الشعور بآهات، ضعف عام.
- إرتفاع أو إنخفاض ضغط الدم.
- فقر الدم - نسب منخفضة من الحديد في الدم.
- ألم، ألم في العنق، تقلصات عضلية، ضعف عضلي.
- النوم المفاجئ (نوبات نوم)، ميل مفرط للنوم، إضطرابات في النوم.
- إرتفاع نسبة الأحماض الأمينية أو هوموسيسين في الدم، إنخفاض نسب فيتامين B6 و-B12 أكثر مما ينبغي.
- الشعور بدوران/ الشعور بآهات، غثاء، أو إغماء.
- صعوبة في البلع أو جفاف في الفم، تغير في حاسة التذوق (مزاق مر في الفم).
- صداع.
- شعور متقدم لضعف أو ألم أو فتور أو خدر في الأصابع أو في راحتي القدمين (polyneuropathy).

- طفح، حكة، زيادة التعرق، إنتفاخ نتيجة زيادة زيادة السوائل (وذمة).
- صعوبة التبول (احتباس البول) أو عدم السيطرة على التبول (سلس البول).
- رؤية، سماع أو الشعور بأشياء غير موجودة (هذيان)، إرباك، أحلام غير عادية، عدم هدوء، سلوك إندفاعي، إضطراب ذهاني.
- إنتفاخ في المعدة، إسهال، نفحة (غازات في البطن)، عسر الهضم (dyspepsia)، تقيؤ.

- أعراض مرض الباركنسون التي تعود بسرعة أو عندما تكون غير متوقعة - يسمى ذلك «عرض Off-On».
- تناقص في حاسة اللمس، تقلصات عضلية خارجة عن السيطرة - التي تؤثر على العينين، الرأس، العنق والجسم (dystonia)، رجفة.

إضطرابات في السيطرة على الدوافع - تغيرات في التصرف لديك. تلك أعراض شائعة، التي قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص.

هناك أشخاص ليس بمحظوظ لهم مقاومة دافع للقيام بنشاط الذي قد يضرهم أو يضر الآخرين. ذلك الأمر يمكن أن يشمل:

- دافع قوي للمقامرة بشكل مبالغ فيه رغم الإنعكاسات الخطيرة عليك أو على عائلتك.
- تغير أو زيادة في الأفكار وفي السلوك الجنسي، الأمر الذي يثير قلقك أو قلق المحظوظ بك بشكل ملحوظ، قد يشمل زيادة الرغبة الجنسية.

- التبذير أو الإفراط في الشراء، بشكل خارج عن السيطرة.
- المبالغة في الأكل - تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة، أو الأكل القسري - تناول طعام أكثر من المعتاد وأكثر مما يلزم جسمك.

إحكام للطبيب إذا لاحظت أنت، عائلتك أو الأشخاص الذين يعالجونك بإحدى تلك التصرفات. من الجائز أن يشخص طبيبك العلاج الخاص بك من جديد، ويتحقق معك حول سبل علاج أو تقليل الأعراض.

أعراض جانبية نادرة (uncommon) (أعراض تظهر لدى 1-10% من مستعملين من بين 1,000):

- بول داكن.
- بحة، ألم في الصدر.
- تساقط الشعر، إحمرار في الجلد، شرى (hives).
- زيادة اللعاب.

- إنتفاخ الأوردة (إلتهاب الأوردة).
- تغير في طريقة المشي لديك.
- محاولة الانتحار.

- الشعور بآهات أو شعور عام سيء.
- ضربات قلب سريعة وغير منتظمة (خفقان القلب).
- تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء أو تغيرات في تعداد خلايا الدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث نزف.

إرتباك، الشعور بشوشة (mazag مرهف بشكل شاذ)، زيادة الرغبة الجنسية، كوابيس ليلية، خرف (dementia)، الشعور بالخوف.

- صعوبة السيطرة على الحركات، ونشاط لحركات قوية خارجة عن سيطرتك.
- صعوبة في فتح عينيك، إزدجاج الرؤية، تشوش الرؤية، تضرر عصب الرؤية (إحتشاء عصب الرؤية = optic ischaemic neuropathy).

أعراض جانبية نادرة (rare) (أعراض تظهر لدى 1-10% من مستعملين من بين 10,000):

- أفكار شاذة.
- تنفس بنمط غير منتظم.
- إنتصاب متواصل ومؤلم للقضيب التناسلي.

ظهور أو تفاصيم علامات شاذة على جلدك، أو ورم في الجلد (ورم ملاني خبيث).

- لعاب أو عرق داكن، الشعور بحرقة في اللسان، كرحة الأسنان، حازوة.

أعراض جانبية شديدة غير معروفة (أعراض لم يحدد شيوخها بعد):

• التلهف لمقدار دوائي مرتفع عن المقدار الدوائية التي يتجاوز المقدار الدوائي للسيطرة على الأعراض الجانبية، المعروفة بمثلازمة عدم توازن الدوپامين (dysregulation syndrome).

• يقاومي بعض المتعالجين من حرکات لا إرادية (dyskinesias)، تغيرات في الحالة النفسية أو أعراض جانبية أخرى بعد إستعمال مقدار دوائي كبير من ديودوبا.

احذر للطبيب إذا لاحظت أحدي الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه.

أعراض جانبية جراء إستعمال المضخة أو الأنابيب:

بلغ عن الأعراض الجانبية التالية بخصوص المضخة والأنابيب. راجع الطبيب أو الممرضة إذا قاسيت من تدني في القدرة على تشغيل المضخة والأنابيب.

- إذا قاسيت من تدني في القدرة على إدخال الأنابيب أو تواجه صعوبة أكبر في الحركة (bradykinesia) - هذه الأعراض من شأنها أن تدل على أن المضخة والأنابيب لا يعملان كما ينبغي.

- إذا شعرت بألم في منطقة البطن، شعرت بغثيان وتنقيأ - راجع الطبيب حالاً، من الجائز أن لديك مشكلة في المضخة أو الأنابيب.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) (أعراض تظهر لدى 10-1% من مستعملين من بين عشرة):

- ألم في البطن.
- تلوث في المكان الذي يدخل فيه الأنابيب إلى البطن - ناتج عن العملية الجراحية.

- زيادة سماكة الندبة في مكان دخول الأنابيب إلى بطنه.
- مشاكل ناتجة عن إدخال الأنابيب - ألم أو إنتفاخ في الفم أو في الحنجرة، صعوبة البلع، إنزعاج في المعدة، ألم أو إنتفاخ، إصابة في الحنجرة، الفم أو البطن، نزف، نقبي، نفحة (غازات في البطن).

- مشاكل في المنطقة التي يدخل فيها الأنابيب داخل البطن، إحمرار أو إصابة الجلد، جروح، إفرازات، ألم أو تهيج.

أعراض جانبية شائعة (common) (أعراض تظهر لدى 10-1% من مستعملين من بين 100):

- إلتهاب في الأمعاء أو في منطقة الجرح، تلوث بعد مسيرة إدخال الأنابيب إلى الأمعاء.
- إلتهاب في جدار المعدة.

- إنسداد أو تحرك الأنبوب بشكل حر في الأمعاء - الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إنسداد كميات أقل من المعتاد وأكثر مما يلزم جسمك.

إحكام للطبيب إذا لاحظت أنت، عائلتك أو الأشخاص الذين يعالجونك بإحدى تلك التصرفات. من الجائز أن يشخص طبيبك العلاج الخاص بك من جديد، ويتحقق معك حول سبل علاج أو تقليل الأعراض.

أعراض جانبية نادرة (uncommon) (أعراض تظهر لدى 1-10% من مستعملين من بين 1,000):

- إلتهاب البكتيريا.
- إختراق الأنابيب جدار الأمعاء الغليظة (colitis).

- إثناء جزء من الأمعاء داخل الأنابيب قريب آخر من الأمعاء (intussusception).

- إنسداد الأنابيب جراء طعام عالق حول الأنابيب.

- خراج (abscess) - يمكن أن يحدث بعد مسيرة إدخال الأنابيب إلى البطن.

أعراض جانبية بشيوع غير معروفة (أعراض لم يحدد شيوخها بعد):

- ضعف في جريان الدم في الأمعاء الدقيقة.

- إختراق الأنابيب جدار الأمعاء الدقيقة.

- تلوث في الدم [إنتان دموي (Sepsis)].

تم ملاحظة الأعراض الجانبية التالية في الأدوية الحاوية على ليثودوبا / كاربيدوبيا بالإعطاء الفموي:

بلغ عن الأعراض الجانبية التالية عند إستعمال ليثودوبا وما يعادلها (Dilantin). هذه الأعراض الجانبية يمكن أن تحدث عند إستعمال ديودوبا:

• لعاب أو عرق داكن، الشعور بحرقة في اللسان، كرحة الأسنان، حازوة.

أعراض جانبية شديدة غير معروفة (أعراض لم يحدد شيوخها بعد):

• التلهف لمقدار دوائي مرتفع عن المقدار الدوائية التي يتجاوز المقدار الدوائي للسيطرة على الأعراض الجانبية، المعروفة بمثلازمة عدم توازن الدوپامين (dysregulation syndrome).

• يقاومي بعض المتعالجين من حرکات لا إرادية (dyskinesias)، تغيرات في الحالة النفسية أو أعراض جانبية أخرى بعد إستعمال مقدار دوائي كبير من ديودوبا.

احذر للطبيب إذا لاحظت أحدي الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه.

أعراض جانبية جراء إستعمال المضخة أو الأنابيب:

بلغ عن الأعراض الجانبية التالية بخصوص المضخة والأنابيب. راجع الطبيب أو الممرضة إذا قاسيت من تدني في القدرة على تشغيل المضخة والأنابيب.

- إذا قاسيت من تدني في القدرة على إدخال الأنابيب أو تواجه صعوبة أكبر في الحركة (bradykinesia) - هذه الأعراض من شأنها أن تدل على أن المضخة والأنابيب لا يعملان كما ينبغي.

- إذا شعرت بألم في منطقة البطن، شعرت بغثيان وتنقيأ - راجع الطبيب حالاً، من الجائز أن لديك مشكلة في المضخة أو الأنابيب.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) (أعراض تظهر لدى 10-1% من مستعملين من بين عشرة):

- ألم في البطن.
- تلوث في المكان الذي يدخل فيه الأنابيب إلى البطن - ناتج عن العملية الجراحية.

- زيادة سماكة الندبة في مكان دخول الأنابيب إلى بطنه.

- مشاكل ناتجة عن إدخال الأنابيب - ألم أو إنتفاخ، إصابة في الحنجرة، الفم أو البطن، نزف، نقبي، نفحة (غازات في البطن).

- مشاكل في المنطقة التي يدخل فيها الأنابيب داخل البطن، إحمرار أو إصابة الجلد، جروح، إفرازات، ألم أو تهيج.

أعراض جانبية شائعة (common) (أعراض تظهر لدى 10-1% من مستعملين من بين 100):

- إلتهاب في الأمعاء أو في منطقة الجرح، تلوث بعد مسيرة إدخال الأنابيب إلى الأمعاء.
- إلتهاب في جدار المعدة.

- إنسداد أو تحرك الأنبوب بشكل حر في الأمعاء - الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إنسداد كميات أقل من المعتاد وأكثر مما يلزم جسمك.

إحكام للطبيب إذا لاحظت أنت، عائلتك أو الأشخاص الذين يعالجونك بإحدى تلك التصرفات. من الجائز أن يشخص طبيبك العلاج الخاص بك من جديد، ويتحقق معك حول سبل علاج أو تقليل الأعراض.

أعراض جانبية نادرة (uncommon) (أعراض تظهر لدى 1-10% من مستعملين من بين 1,000):

- إلتهاب البكتيريا.
- إختراق الأنابيب جدار الأمعاء الغليظة (colitis).

- إثناء جزء من الأمعاء داخل الأنابيب قريب آخر من الأمعاء (intussusception).

- إنسداد الأنابيب جراء طعام عالق حول الأنابيب.

- خراج (abscess) - يمكن أن يحدث بعد مسيرة إدخال الأنابيب إلى البطن.

أعراض جانبية بشيوع غير معروفة (أعراض لم يحدد شيوخها بعد):

- ضعف في جريان الدم في الأمعاء الدقيقة.

- إختراق الأنابيب جدار الأمعاء الدقيقة.

- تلوث في الدم [إنتان دموي (Sepsis)].

تم ملاحظة الأعراض الجانبية التالية في الأدوية الحاوية على ليثودوبا / كاربيدوبيا بالإعطاء الفموي:

بلغ عن الأعراض الجانبية التالية عند إستعمال ليثودوبا وما يعادلها (Dilantin). هذه الأعراض الجانبية يمكن أن تحدث عند إستعمال ديودوبا:

• لعاب أو عرق داكن، الشعور بحرقة في اللسان، كرحة الأسنان، حازوة.

أعراض جانبية شديدة غير معروفة (أعراض لم يحدد شيوخها بعد):

• التلهف لمقدار دوائي مرتفع عن المقدار الدو