

מרץ 2024

## Paramol® Af & Shiul night care, Caplets

צוות רפואי נכבד,

חברת דקסל בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון בעלון לצריך של התכשיר פראמלול® אַפּ וְשִׁיעוֹל לְטִיפּוֹל בְּלִילָה. בהודעה זו מפורטים העדכנים המהווים החמרה במידע הבטיחותי בלבד. למידע מלא, יש לעיין בעלון. העלון לצריך נשלח לפרסום במ Lager התרופות שבראש מושרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פנינה לבעל הרישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל, טל': 04-6364000.

### הרכב התכשיר:

Each caplet contains Paracetamol 500mg, Pseudoephedrine hydrochloride 25mg, Dextromethorphan hydrobromide 10mg and Chlorpheniramine maleate 2mg

### התוויות מאושרות:

For the symptomatic relief of cold, cough and nasal congestion accompanied by fever and pain, for treatment at night.

העלון לצריך עודכן במרץ 2024. להלן העדכנים המהווים החמרה במידע הבטיחותי (מוסומנים באדום):

[...]

### 2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

[...]

• אתה סובל ממחלת לב או מיתר לחץ דם.

• יש לך לחץ דם גבוה מאוד (יתר לחץ דם חמוץ) או יתר לחץ דם שאין נשלט על ידי התרופות שלך, מחלת לב או כלי דם או היסטוריה של שבץ.

[...]

• אתה סובל ממחלת חמורה של הפלזות.

• יש לך מחלת כליות חמורה חריפה (פתואומית) או כרונית (ארוכת טווח) או אי ספיקת כליות.

[...]

### اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

•

מרקמים של תסמנת אנצפלופתיה האחראית לפיכה (PRES) ותסמנת התכווצות הפיכה של כלי הדם המוחיים (RCVS) דוחו בעקבות שימוש בתרופות המכילות פסואודואפדרין. PRES ו-RCVS הם מצבים נדירים שיכולים להיות כרוכים באספקת דם מופחתת למוח. יש להפסיק מיד את השימוש בפראמול אַפּ וְשִׁיעוֹל לטיפול בלילה ולפנות מיד לקבالت טיפול רפואי, אם אתה מפתח תסמינים שעשוים להיות סימנים של PRES או RCVS (ראה תסמינים בסעיף 4 "תופעות לוואי").

[...]

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפראמול אַפּ וְשִׁיעוֹל לְטִיפּוֹל בְּלִילָה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן.

### תופעות לוואי חמורות

יש להפסיק מיד את השימוש בתרופה ולפנות לטיפול רפואי דוחוף:

אם אתה מפתח תסמינים שעשוים להיות סימנים של תסמנת אנצפלופתיה האחראית לפיכה (PRES) ותסמנת התכווצות הפיכה של כלי הדם המוחיים (RCVS). התסמינים כוללים:

- כאב ראש פתואומי חמוץ
- בחילות
- הקאות

- **בלבול**
- **פרקסיסים**
- **שינויים בראיה**

**יש להפסיק את השימוש בתרופת ולפנות מיד לרופא בהופעת:**

[...]

- **כאב ראש-פתאומי-וחטוף, בחילות, הקאות, בלבול, פרקסיסים, הפרעות-ראיה**  
**תופעות לוואי נוספות:**

[...]

**תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):**

- **מצבים חמורים המשפיעים על כל דם במוח הידועים כתסمونת אנטפלופתיה אחוריית הפיכה (PRES) ותסamonת התכווצות הפיכה של כל הדם המוחיים (RCVS)**

[...]