

מרץ 2024

Dexamol cold® night care, Caplets

צוות רפואי נכבד,

חברת דקסל בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון בעלון לצריך של התכשיר דקסמל קולד[®] לטיפול בלילה.
בהתודה זו מפורטים העדכנים המהווים החמרה במידע הבטיחותי בלבד. למידע מלא, יש לעיין בעלון.
עלון לצריך נשלח לפרסום במ Lager התרומות באתר משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פנינה לבעל
הרישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל, טל': 04-6364000.

הרכב התכשיר:

Each caplet contains Paracetamol 500mg, Pseudoephedrine hydrochloride 25mg,
Dextromethorphan hydrobromide 10mg and Chlorpheniramine maleate 2mg

התוויות מאושרות:

For the symptomatic relief of cold, cough and nasal congestion accompanied by fever and pain, for treatment at night.

העלון לצריך עודכן במרץ 2024. להלן העדכנים המהווים החמרה במידע הבטיחותי (מוסומנים באדום):

[...]

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

[...]

• אתה סובל ממחלת לב או מיתר לחץ דם.

• יש לך לחץ דם גבוה מאוד (יתר לחץ דם חמוץ) או יתר לחץ דם שאין נשלט על ידי התרופות שלך,
מחלת לב או kali dem או היסטריה של שבע.

[...]

• אתה סובל ממחלת חמורת של הפלזות.

• יש לך מחלת כלות חמורה חריפה (פתואומית) או כרונית (ארוכת טווח) או אי ספיקת כלות.

[...]

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

• מקרים של תסמנת אנטפלופתיה אחורית הפיכה (PRES) ותסמנת התכווצות הפיכה של כלי הדם המוחיים (RCVS) דווחו בעקבות שימוש בתרופות המכילות פסואודואפדרין. PRES ו-RCVS הם מצבים נדירים
שיכולים להיות כרוכים באספקת דם מופחתת למוח. יש להפסיק מיד את השימוש בדקסמל קולד לטיפול
בלילה ולפנות מיד לקבالت טיפול רפואי, אם אתה מפתח תסמינים שעשוים להיות סימנים של PRES או
RCVS (ראה תסמינים בסעיף 4 "תופעות לוואי").

[...]

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדקסמל קולד לטיפול בלילה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת משתמשים.
אל תיבהל במקרה רשיתם תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מאי אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

יש להפסיק מיד את השימוש בתרופה ולפנות לטיפול רפואי דחוף:

אם אתה מפתח תסמינים שעשוים להיות סימנים של תסמנת אנטפלופתיה אחורית הפיכה (PRES)
ותסמנת התכווצות הפיכה של כלי הדם המוחיים (RCVS). התסמינים כוללים:

- כאב ראש פתואומי חמור
- בחילות
- הקאות

- **בלבול**
- **פרכסיסים**
- **שינויים בראיה**

יש להפסיק את השימוש בתרופת ולפנות מיד לרופא בהופעת:

[...]

- **כאב ראש-פתאומי-וחטוף, בחילות, הקאות, בלבול, פרכסיסים, הפרעות-ראיה**
תופעות לוואי נוספות:

[...]

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- **מצבים חמורים המשפיעים על כל דם במוח הידועים כתסمونת אנטפלופתיה אחוריית הפיכה (PRES) ותסamonת התכווצות הפיכה של כל הדם המוחיים (RCVS)**

[...]