

עלון לצרcn לפi תקנות הרווקחים (תקנירם) התשמ"י – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

אסבררייט 101 מ"ג טבליות מצופות כל טבליה מכילה: פירfenידון 267 מ"ג pirfenidone 267 mg	הרכב: כל טבליה מכילה: פירfenידון 801 מ"ג pirfenidone 801 mg
--	---

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. שמור את העalon. יתכן שתצטרכך לקרוא אותו שוב.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתן. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזין להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אסבררייט מכילה את החומר הפעיל פירfenידון (pirfenidone) ומשמש לטיפול במקרים קלים עד בינוניים של פיברוזיס ריאתי אידיופטי (Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF) במוגדים.

קבוצה טיפולית:
אסבררייט הינה תרופה מדכאת מערכת חיסון (immunosuppressant).

פיברוזיס ריאתי אידיופטי הינו מצב שבו רकמות הריאות מתנפחות ומצטלקות עם הזמן, וכתוצאה לכך קשה לנושם עמוק. הדבר מקשה על התפקוד התקין של הריאות. **אסבררייט** מסייעת בהפחחת ההצטלקות וההתנפחות בריאות ועזרה לך לנושם טוב יותר.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה אלרגי (רגיש) לחומר הפעיל פירfenידון או לאחד ממרכיבי התרופה הננספים המוזכרים בפרק 6 "מידע נוספת".
- היתה לך בעבר אנגיואדמיה עם פירfenידון כולל סימפטומים כגון נפיחות בפנים, בשפטים ואו בלשן שכולה להיות קשורה לקשי נשימה או צפצופים
- אתה נוטל תרופה בשם פלווקסמין (המיועדת לטיפול בדיכאון ובഫראה טורדנית כפייתית)
- אתה סובל ממחלה כבד בדרجة חמורה או סופנית
- אתה סובל ממחלה כלות בדרגה חמורה או סופנית הדורשת טיפול בדיאליזה

אם אחד מהמצטבים הנזכרים לעיל חלים עלייך אין להשתמש **אסבררייט**. אם אין בUCH, התיעץ עם הרופא המטפל או הרוקח.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
יש להיוועץ ברופא לפני Nutzung **אסבררייט**.

- יתכן שתיהיה יותר רגיש לאור שמש (tagovist רגישות לאור) בעת Nutzung **אסבררייט**. הימנע מחשיפה לשמש (כולל מנורות שיזוף) בעת Nutzung **אסבררייט**. השתמש במסנני קרינה באופן יומי וכשה את זרועותיך, רגליך וראשך להפחחת החשיפה לאור שמש (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").
- אין ליטול תרופות אחרות כגון אנטיביוטיקה מסווג טריציקלון (לדוגמה דוקסיציקlein), העולות להגביר את רגישותך לאור השמש.
- יש לידע את הרופא שלך אם אתה סובל מביעיות בכליה.
- יש לידע את הרופא שלך אם אתה סובל מביעיות קלות עד בינוניות בכבד.
- עליך להפסיק לעשן לפחות ובמהלך הטיפול **אסבררייט**. עישון סיגריות עלול להפחית את השפעת התרופה.
- **אסבררייט** עלולה לגרום לScheduler ועייפות. נאג במשנה זהירות בפעולותיוות שבahn עלייך להיות ערני ובתפקוד.
- **אסבררייט** יכולה לגרום לירידה במשקל. הרופא שלך יטאר את משקלך בעת Nutzung התרופה.
- תסמנות סטיבנס-ג'ונסון, נמק אפידרמי רעלני (טוקסיק אפיידרמאל נקרוליזיס) ותגובה תרופתית עם אוזינופיליה ותסמים מערכתיים (DRESS) דוחו בקשר עם טיפול **אסבררייט**. אם אתה מבחן באחד מהתסמים הקשורים בתגובה העור החמורים המתוארות בסעיף 4, הפסיק להשתמש **אסבררייט** ופנה מיד לטיפול רפואי.

שימוש:

עליך להפסיק לעשן לפני ובמהלך הטיפול **אסבררייט**. עישון סיגריות עלול להפחית את השפעת התרופה.

ילדים ומתבגרים
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

בדיקות ומוקב
אסבריט עלולה לגרום לביעות כבד חמורות כאשר מקרים מסוימים הובילו לתמותה. תצטרכן לבדוק לפני התחלת הטיפול התרופפה, אחת לחודש במשך ששת חודשים הראשונים, ואחת לשושה חמודשים לאחר מכן בעת נטילת התרופפה זו, על מנת לבדוק שהכבד שלך אכן רפואי. חשוב שתעשה את בדיקות הדם השגרתיות האלה כל עוד אתה נוטל **אסבריט**.

אם אתה לוקחת, אם לך חת לאחרונה או אתה עלול לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד יש לדוד את הרופא או הרוקח אם אתה לוקחת את התרופות הבאות, הואיל והן עלולות לשנות את ההשפעה של **אסבריט**:

- תרופות אשר עלולות להגבר את תופעות הלואוי של **אסבריט**:
 - אנטקסטין (סוג מסויים של אנטיביוטיקה)
 - צ'ירופולקסצין (סוג מסויים של אנטיביוטיקה)
 - אמיודרון (משמשת לטיפול בסוגים מסוימים של מחלות לב)
 - פרופאפנון (משמשת לטיפול בסוגים מסוימים של מחלות לב)
 - פלובוקסמין (משמשת לטיפול בדיכאון ובהפרעה טורדנית כפניתית)
- תרופות אשר עלולות להפחית את יעילות התרופפה:
 - אומפרازול (משמשת לטיפול במצבים כגון הפרעות בעיכול וריפלוקס קיבטי וישטי)
 - ריפאמפיצין (סוג מסויים של אנטיביוטיקה)

שימוש באסבריט - מדzon ושתייה
יש לבלוע את התרופות בשלמותן עם מים, במהלך או אחריו הארוחה על מנת להפחית תופעות לוואי, כגון בחילות וסחרחות (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").
אין לשנות מיצ' אשכליות במהלך הטיפול **אסבריט**, מיצ' אשכליות עשויו מנוע מאסבריט לעבוד נכון.

הירין והנקה
כאמצצע זיהירות, עדיף להימנע משימוש **אסבריט** אם הינך בהריון, מתכוננת להריון או חרוצה עלולה להיות בהריון, הואיל והסיכון הפוטנציאליים לעובר לא ידועים.

אם הינך מניקה, או מתכוננת להניק עליך לידע את הרופא או הרוקח לפני נטילת **אסבריט**. לא ידוע אם התרופפה עוברת לחלב האם. אם תחליט להניק, הרופא ידוע עימך בסיכונים וביתרונות של נטילת התרופפה במהלך ההנקה.

ניגזה והפעלת מכונת
אין לנוהג או להפעיל מכונות אם אתה מרגיש סחרחות או עייפות לאחר נטילת **אסבריט**.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופפה
אסבריט מכילה נתרן.
תרופה זו מכילה פחוט מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל TABLET ולכן נוחש את נטולות נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופת?

יש להשתמש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

רופא מומחה בעל ניסיון באבחון וטיפול בפיברוזיס ריאתי אידיופטי יחליט על תחילת הטיפול בתכשיר **אסבריט** ויבצע מעקב אחר הטיפול.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא:

- ב-7 ימי הטיפול הראשוני: יש ליתול מנה של 267 מ"ג, 3 פעמים ביום עם הארוחה (סה"כ 801 מ"ג/יום)
- מיום 8 עד יום 14: יש ליתול מנה של 534 מ"ג (2 יחידות **אסבריט** 267 מ"ג), 3 פעמים ביום עם הארוחה (סה"כ 1,602 מ"ג/יום)
- מיום 15 ואילך (מינון אחזקתי): יש ליתול 801 מ"ג 3 פעמים ביום עם הארוחה (סה"כ 2,403 מ"ג/יום)

המינון האחזקתי היומי המקביל של **אסבריט** הוא 801 מ"ג (1 TABLET **אסבריט** 801 מ"ג) 3 פעמים ביום עם הארוחה, סה"כ 2,403 מ"ג/יום.

יש לבלוע את התרופות בשלמותן עם מים, במהלך או לאחר הארוחה על מנת להפחית את הסיכון לתופעות לוואי, כגון בחילה וסחרחות. פנה לרופא שלך אם התס敏ינים ממשיכים.

אין לעובר על המנה המומלצת.

הפחחת מינון במקורה של תופעות לואן

"יתכן שהרופא יפחית את המינון אם אתה סובל מתופעות לואן, כגון בעיות בבטן, תగבות עוריות לאור השימוש או למטרות שיזוף או שניים ממשמעותיים באגדמי הכאב".

אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר

אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא, לרוקח או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה אליו.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרושים, יש לחקח אותה ברגע שנזכרת, אך להפריד כל מנה לפחות בשלוש שעות. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפוצות על זו שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהוא על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק ליטול את התרופה

במצביים מסוימים, הרופא ייעץ לך להפסיק את נטילת התרופה **אסבריריט**.

אם מסיבה כלשהי עלייך ליטול **אסבריריט** לפחות יותר מ-14 ימים רצופים, הרופא יתחליל מחדש את הטיפול בתכשיר **אסבריריט 267 מ"ג** וינהה אותך ליטול בתחילת ייחידה אחת 3 פעמים ביום, ולאחר מכן יגדיל את המינון באופן הדרגתי ל-801 מ"ג 3 פעמים ביום.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זוקק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייoused ברופא או ברוקח.

4. תופעות לואן

כמו בכל תרופה, השימוש **אסבריריט** עלול לגרום לתופעות לואן בחalk מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. "יתכן שלא תסבול מכך אפילו מעתה מהן".

הפסק ליטול אסבריריט ופנה לקבלת טיפול רפואי באופן מיידי אם אתה מבחין בסימן או תסמין כלשהו מה הבאים:

- נפיחות בפנים, בשפתית ו/או בלשון, גרד, סרפדת, קשי נשימה או צפיפות, או תחושת עילפון, שהם סימנים לאנגיואדמה, תגובה אלרגית חמורה או אנפילזיס.
- הצהבהה של העיניים או של העור, שタン כהה, שייתכן שילו גם בגירוד עור, כאב בחלק העליון לצד ימין של הבطن, אובדן תיאבון, הופעת דימומיים או חבורות בклות יותר מעבר או תחושת עייפות. אלה עלולים להיות סימנים לתפקוד כבד לקוי ויכולם להעיד על פגיעה כיבידית אשר הנה תופעת לואן שאינה שכיחה לאסבריריט.
- כתמיים אדמדמים לא מגובחים או עגולים באזורי הגן, לעיתים קרובות עם שלפוחיות במריצם, קילוף העור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניהם. פריחות עור חמורות אלו עשויות להופיע לאחר חום ותסמיינים דמו"י שפעת [תסמנת סטיבנס-ג'ונסון או נמוך אפידרמי רעלני (טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס)].
- פיריה מפותשת, טמפרטורת גוף גבוהה ובלוות לימפה מוגדלות (תסמנת הנקראט DRESS או תסמנת רגישות יתר לתרופה).

תופעות לואן נוספת:

יש לידע את הרופא אם אתה מرجיש כל תופעת לואן.

תופעות לואן שכיחות מאוד (עשויות להשפיע על יותר ממטופל אחד מתוך 10 מטופלים):

- זיהומים בגרון או בדרכי הנשימה העורבים לריאות ו/או דלקת גת (סינוסיטיס)
- בחילה
- בעיות בקיבה, כגון ריפלוקס חומצי, הקאה, תחושת עצירות שלשול
- הפרעות בעיכול או כאב בטן
- ירידת משקל
- ירידת בתיאבון
- קושי לשון
- עייפות
- סחרחות
- כאב ראש
- קוצר נשימה
- שיעול
- כאבי מפרקים

תופעות לואן שכיחות (עשויות להשפיע על עד מטופל אחד מתוך 10 מטופלים):

- זיהומים בשלפוחית השתן
- ישנונות
- שינויים בחוש הטעם
- גלי חום
- בעיות בקיבה, כגון תחושת נפיחות, כאבי בטן וחוסר נוחות, צרבת וגזים

- בדיקות דם אשר עלולות להצביע על עלייה ברמת אנטימי הכבד
- תגבורות בעור לאחר חיסיפה לשמש או שימוש במינורות שיזוף
- בעיות בעור כגון גירוד, אדמומיות בעור, עור אדום, עור יבש ופרירה בעור
- כאבי שרירים
- תחושת חולשה או היעדר אנרגיה
- כאב בchnerה
- כוויות שימוש

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עשויות להשפיע עד 1 מתוך 100 מטופלים):

- רמה נמוכה של נתון בدم אשר עלולה לגרום לכראב ראש, סחרורת, בלבול, חולשה, התכווצויות שרירים או בחילה והקאה
- בדיקות דם אשר עלולות להצביע על ירידה בתאי דם לבנים

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או אם אתה סובל מטופעת לוואי שלא הזכרה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (א.י. www.health.gov.il) המפנה לטופס המוקן לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מונע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי קר תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הבקבוק והארזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותן חודש.
- אין להשליך תרופות למי השפכים או לפחות האשפה הביתית. היועץ ברוקח כיצד להשליך תרופות שאין בהן צורך. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

אסבריט מכילה את החומר הפעיל פירפנידין.

אסבריט 267 מ"ג: כל טבילה מכילה 267 מ"ג חומר פעיל.

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, povidone K30, silica colloidal anhydrous, croscarmellose sodium (ראה סעיף 2 – אסבריט מכילה נתון), polyvinyl alcohol, titanium dioxide (E 171), macrogol 3350, talc, magnesium stearate, iron oxide yellow (E 172).

אסבריט 801 מ"ג: כל טבילה מכילה 801 מ"ג חומר פעיל.

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, povidone K30, silica colloidal anhydrous, croscarmellose sodium (ראה סעיף 2 – אסבריט מכילה נתון), polyvinyl alcohol, titanium dioxide (E 171), macrogol 3350, talc, magnesium stearate, iron oxide red (E 172), iron oxide black (E 172).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארייה:

אסבריט 267 מ"ג מגיעה כטבליות מצופות בזכבב צהוב, אוביולות וקמורות. על הטבילה מוטבע: "PFD".

אסבריט 801 מ"ג מגיעה כטבליות מצופות בזכבב חום, אוביולות וקמורות. על הטבילה מוטבע: "PFD".

אסבריט 267 מ"ג ואסבריט 801 מ"ג טבליות: התרופה זמין בארייזת בקבוק המכילה 90 טבליות.

בעל הרישום וכותבותו: רוש פרמצטטיקה (ישראל) בע"מ, ת.ד. 6391, הוד השרון 4524079.

שם היצרן וכותבותו: הופמן-לה רוש בע"מ, באזל, שווייץ.

עלון זה נערך במרץ 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אסבריט 267 מ"ג: 162-66-35826-00-00

אסבריט 801 מ"ג: 160-86-35231-00

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.