

עלון לצרcn לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ג - 1986
התרופה משוקחת על פ' מרשם רופא בלבד

אולומיאנט 2 מ"ג אולומיאנט 4 מ"ג

טבליות מצופות

מרכיב פעיל – בריסיטיניב (baricitinib)
 כל טבלייה של אולומיאנט 2 מ"ג מכילה 2 מ"ג בריסיטיניב.
 כל טבלייה של אולומיאנט 4 מ"ג מכילה 4 מ"ג בריסיטיניב.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בפרק 2 ופרק 6 "מידע נוספת".
קריאה בעיון את העلون עד סוף בטרכם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעalon, לתכשיר אולומיאנט קיימים כרטיסים מייד בעיתות לטיפול. כרטיס זה מכיל מידע בעיתות לטיפול חשוב לדעת לפני הначלה הטיפול באולומיאנט ובמהלכו, ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיסים המידע הבוטיחותי לטיפול ובעalon לצרcn לפניה תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמר את הcartis לuin נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid Arthritis)
 אולומיאנט משמשת לטיפול במובגרים הסובלים מדלקת מפרקים שגרונית מתונה עד חמורה, בהם טיפול קודם בתרופה אנטי ריאומטיות אחת או יותר מקבוצת DMARD לא היה יעיל די או היה בלתי נסבל.
 ניתן להשתמש באולומיאנט כתכשיר יחיד או בשילוב עם מטוטרקסאט (methotrexate).

אולומיאנט פועלת על ידי הפחתת פעילותן של אנזים המציג בגוף המכונה "ג'אנוס קינינאז" (Janus kinase), אשר מעורב בתהליכיים דלקתיים. באמצעות הפחתת פעילותן של אנזים זה, אולומיאנט מסייעת בהפחיתה כאב, נזקשות ונפיחות במפרקים, עיפות, וועזרת בהאטת הפגיעה בעצם ובסחוס במפרקים. השפעות אלו יכולות לעזור לך ביצוע פעילויות יומיומיות, תוך שיפור איכות החיים הקשורה לבריאות עבר חולי דלקת מפרקים שגרונית.

דלקת עור אтопית (Atopic Dermatitis)
 אולומיאנט משמשת לטיפול במובגרים הסובלים מדלקת עור אטופית מתונה עד חמורה, שאמורים לקבל טיפול מערכת.

אולומיאנט פועלת על ידי הפחתת פעילותן של אנזים המציג בגוף המכונה "ג'אנוס קינינאז" (Janus kinase), אשר מעורב בתהליכיים דלקתיים. באמצעות הפחתת פעילותן של אנזים זה, אולומיאנט מסייעת בשיפור מצבו של העור ומפחיתה גרד. לבסוף, אולומיאנט מסייעת בשיפור איכות השינה (עקב הגרד) ואיכות החיים הכללית. אולומיאנט הרатаה שהיא משפרת תסמינים של כאב עור, חרדה ודיכאון הקשורים בדלקת עור אטופית. דלקת עור אטופית ידועה גם כאזמה אטופית. ניתן להשתמש באולומיאנט בשילוב עם תרופות לטיפול באזמה שאתה מורה על העור או להשתמש בה כתכשיר יחיד.

אלופסיה אראטה (Keratosis Azoita, Alopecia Areata)
 אולומיאנט משמשת לטיפול במובגרים עם אלופסיה אראטה (keratosis azoita) חמורה, מחלת אוטואימונית המאפיינית בנשירת שיער דלקתית ולא צלקות מהקרקפת, מהפנים ולעתים מאזורים אחרים בגוף, אשר עלולה להיות חוזרתית ומ��פתחתה.

אולומיאנט פועלת על ידי הפחחת פעילותו של אנזים המציג בגוף המכונה "ג'אנוס קינאז" (Janus kinase), אשר מעורב בתהליכיים דלקטיבים. באמצעות הפחחת פעילותו של אנזים זה, אולומיאנט מסייע לצמיחה מחודשת של שיער הקרקפת, הפנים, ושל איזוריים אחרים בגוף המושפעים מהמחלה.

קבוצה רפואיית: מדכאי חיסון, מדכאי חיסון סלקטיביים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לבריסיטיניב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בפרק 6).
- את בהירין או חושבת שאת עשויה להיות בהירין.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני ובמהלך הטיפול באולומיאנט ספר לרופא או לרוקח אם:

- אתה בן 65 ומעלה. אנשים בני 65 ומעלה עשויים להמצא בסיכון מוגבר לזמן חיים, לביעות לב כולל התקף לב ולסוגים מסוימים של סרטן. הרופא ישוחח איתך האם אולומיאנט מתאימה לך.
- אתה סובל מזמן חיים או אם אתה מפתח זמן חיים לעיתים תכופות. דוח לרופא אם אתה מפתח תסמינים כגון חום, פצעים, תחושת עייפות מוגברת מהרגיל או בעיות שניים מאחר שלאלה עלולים להיות סימני חיים. אולומיאנט עלולה להפחית את היכולת של גוף להילחם בזמן חיים ועלולה להחמיר חיים קיימים או להגבר את הסיכון לכך שתפתח חיים חדש. אם יש לך סוכרת או אם אתה מעל גיל 65 אתה עשוי להמצא בסיכון מוגבר לקבל זמן חיים.
- אתה סובל או סבלת בעבר משחפת. יתכן כי תזדקק לבדיקות לשילilit שחפת טרם מתן אולומיאנט. דוח לרופא אם אתה סובל מתסמינים כגון שיעול טורדני, חום, הצועותليلת ורידית במשקל במהלך הטיפול באולומיאנט, לאחר שאללה עלולים להיות סימנים לשחפת.
- אתה סבלת מזמן חיים בהרפס (שלבketת חוגרת), לאחר שאולומיאנט עלולה לאפשר את הישנות היזום. דוח לרופא אם אתה מפתח פריחה עורית המלווה בכאב ובלפוחיות במהלך הטיפול באולומיאנט, לאחר שאללה עלולים להיות סימנים לשלבketת חוגרת.
- אתה סובל או סבלת בעבר מהפטיטיס B או C.
- מיעד לקבלת חיסון. עליך להימנע מקבלת תרכיבי חיסון (חיים) מסוימים במהלך השימוש באולומיאנט.
- יש לך או היה לך סרטן, אם אתה מעשן או שעישנת בעבר, לאחר שהרופא ישוחח איתך האם אולומיאנט מתאימה לך.
- אתה סובל מתפקיד כבד לך.
- יש לך או היה לך בעיות לב, מכיוון שהרופא ישוחח ערך האם אולומיאנט מתאימה לך.
- הוי לך בעבר קריישי דם בוורידי הרגליים (פקקת ורידים عمוקים, deep vein thrombosis) או בריאות (תסחיף ריאתי, pulmonary embolism), או שיש לך בסיכון מוגבר לפתח את זה (לדוגמא: אם עברת לאחרונה ניתוח גדול, אם את נוטלת אמצעי מניעה הורМОנילטיפול הורמוני חלופי, או אם יש לך או לאחד מבני משפחתך הקרובה בעיות קריישה). הרופא ישוחח איתך האם אולומיאנט מתאימה לך. ספר לרופא אם יש לך קוצר נשימה פתאומי או קשי נשימה, כאב בחזה או כאב בגב העליון, פגימות ברגל או בזרוע, כאב או ריגושים ברגליים, או אדומות או שינוי צבעו של הרגל או הזרוע, מפני שאלה יכולם להיות סימנים לקראיישי דם בוורידיים.
- אתה סבלת בעבר מדיברטיקוליטיס (מחלת הסעיף, diverticulitis) – סוג של דלקת במעי הגס, או כיבים בקיבה או במעיים (ראה פרק 4).
- סרטן עור שאינו מלנומה נצפה במטופלים שלקחו אולומיאנט. הרופא עשוי להמליץ לך לבצע בדיקות עור שגרתיות בזמן שאתה מטופל באולומיאנט. אם מופיעים נגעים חדשים בעור במהלך או לאחר הטיפול, או אם נגעים קיימים משתנים את המראה שלהם, פנה אל הרופא.

אם אתה מבחין באחת מתופעות הלואוי החמורויות הבאות, עליך לבדוק מידית לרופא:

- צפופים בנשימה
- סחרחות חמורה או תחושות סחרור
- נפיחות בשפתים, בלשון או בגרון
- סרפדות (גרד או פריחה בעור)
- כאב בטן עד המלווה במיזוח בחום, בחילות והקאות
- כאב חזק או לחץ בחזה (שיוכלים להתפשט לזרועות, לסת, צוואר ולגב)

- קוצר נשימה
- דעה קרה
- חולשה חד צדדי בזרוע ו/או ברגל
- דיבור מבולבל.

ילדים ומתבגרים
אין לתת תרופה זו לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 מכיוון שאין מידע על שימוש בקבוצת גיל זאת.

בדיקות ועקב
יתכן כי הצורך בעבר בבדיקות דם לפני לטול אולומיאנט, או במהלך נטילתתה, על מנת לבדוק האם אתה סובל מספירה נמנעה של תא דם אדום (אנמיה), מספירה נמנעה של תא דם לבנים (נויטרופניה או לימפופניה), מרמת שומנים (콜סטרול) גבוהה בדם או מרמות גבירות של אנדמי כבד, זאת על מנת לוודא כי הטיפול באולומיאנט אינו גורם לביעות.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות
אם אתה לוקח או אמם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד אם אתה לוקח:

- פרובנציד (probenecid) (לטיפול בשיגdon), לאחר שתרופה זו עלולה להגביר את הרמות של אולומיאנט בدمך. אם אתה נוטל פרובנציד, המינון המומלץ של אולומיאנט הוא 2 מ"ג פעם אחת ביום. יש להתייעץ עם הרופא לפניו השימוש.
- תרופה נגד דלקת מפרקים שగורנית הניתנת בהזרקה (טרופות הניתנות בהזרקה המדכאות את מערכת החיסון, כולל טיפול ביולוגיות ממוקדות (ונגדים)
- תרופות המשמשות לשילטה על התגובה החיסונית של הגוף, כגון אזתיופרין (azathioprine), טאקרולימוס (tacrolimus) או ציקלוספורין (cyclosporine) (ciclosporin).
- תרופות אחרות המשתייכות לקבוצת מעכבי האנדמים ג'אנס קינאנז (NSAIDs), בדרך כלל משמשות לטיפול בכאבים ו/או מצבים דלקתיים של השירים או המפרקים) ו/או אופיאידים (משמשים לטיפול בכאב חמור) ו/או קורטיקוסטרואידים (בדרך כלל משמשים לטיפול במצבים דלקתיים) (ראה פרק 4).

הירין, הנקה ופוריות
אם אתה בהירין או שאתה מיניקה, חושבת שאתה עשוי להיות בהירין או מתכוון להרות, פני לרופא או לרוקח לייעוץ טרם נטילת תרופה זו.

עליך להשתמש באמצעות מנעה ייעיל על מנת למנוע הירין במהלך הטיפול באולומיאנט ובמשך לפחות שבוע אחד לאחר מתן המנה האחונה של אולומיאנט. עליך לדוח לרופא אם הנך בהירין לאחר שאתה השתמש באולומיאנט במהלך הירין.

אין להשתמש באולומיאנט במהלך הנקה מאחר שלא ידוע האם תרופה זו עוברת לחלב. את והרופא צריכים להחליט האם תנייק או תשתמש באולומיאנט. אין להניך ולהשתמש באולומיאנט בו-זמן.

נהיגה ושימוש במכונות
לאולומיאנט אין השפעה על יכולת הנהוג ולהשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
אולומיאנט מכילה נתרן
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בטבליה, כלומר למעשה היא נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

יש להתחיל את הטיפול בהשגת רופא המנוסה באבחן מצבך הרפואי ובטיפול בו. יש תמיד לטול תרופה זו בדיקות לפני ההוראות שניתנו לך על ידי הרופא או הרוקח. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין לך בעוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

דלקת מפרקים שגרונית, דלקת עור אוטופית ואלופסיה אראטה (קרחת איזורית)
המיןון המקורי בדרך כלל הוא 4 מ"ג פעם אחת ביום. הרופא עשוי לתת לך מיןון נמוך יותר של 2 מ"ג פעם אחת ביום, במיוחד אם אתה מעל גיל 65 או אם אתה מצוי בסיכון מוגבר לזמןאים, לקריש דם, לאירועים לבבים משמעותיים או לסרטן.

אם התרופה פועלת היטב, הרופא עשוי להחליט כי ניתן להפחית את המיןון.

אם אתה סובל מירידה בתפקוד הכלילי, המיןון המקורי של אלומיננט הוא 2 מ"ג פעם אחת ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אלומיננט מיועד למתן דרך הפה. עליך לבלוע את הטבילה עם מים.
אתה יכול ליטול את הטבליות עם או ללא מזון. על מנת לסיע לך לזכור ליטול אלומיננט, רצוי ליטול אותה באותה השעה מדי יום.
אין לכתוש או לחצוץ את טבליות אלומיננט. הטבליות אינן מיועדות לחולקה למנות קטנות יותר. אם תנסה לחצוץ את הטבילה אתה עלול לא לקבל את כל המנה שרשם לך הרופא.
אין מידע על שימוש בתרופה בזונדה.

אם **נטילת בטעות מיןון גבוהה יותר** או אם בטעות בלבד לידן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. יתכן כי תסבול מחלוקת מתופעות הלואאי המתוארות בפרק 4.

אם שכחת ליטול את התרופה

- אם החמצת מנה, עליך ליטול אותה ברגע שתיזכר.
- אם שכחת את המנה עבור היום הקרוב, יש לדלג על המנה שהוחמצה וליטול מנה נוספת בלבד כרגע בלבד מהחרת.
- אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על טבילה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק את נטילת אלומיננט, אלא אם כן הרופא מורה לך להפסיק את נטילתה.

אין ליטול תרופות בחושר!
בדוק התווית והמנה בכל פעע שהנו לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זkok להם.

אם יש לך שאלות נוספות לגבי השימוש בתרופה זו, פנה לרופא או לרוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באלומיננט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשייתן תופעות הלואאי. יתכן שלא תסבול אפילו אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

דיום כגן שלבקת חגורת ריאות, העולל להופיע בעד 1 מתוך 10 אנשים:
דוחן לחופא או פנה לעזרה רפואית באופן מיידי אם תפתח את התסמינים המפורטים להלן, אשר עלולים להיות סימנים של:

- **שלבקת חגורת (הרופס זוסטר):** פריחה עורית עם שלפוחיות המלאוה בכאב וחום (נדיר מאוד בדלקת עור אוטופית ולא שכיח באלופסיה אראטה)
- **דלקת ריאות: שיעול מתמשך, חום, קוצר נשימה ועייפות** (לא שכיח בדלקת עור אוטופית ואלופסיה אראטה)
דלקת ריאות חמורה ושלבקת חגורת חמורה הן תופעות לוואי שאין שכיחות.

תופעות לוואי נוספת

תופעות לוואי שכיחות מאד (עלולות להופיע ביותר מ- 1 מתוך 10 אנשים):

- **זמןאים בגרון ובאף**

רמות גבוהות של שומנים בדם (コレステロール) המודגמות על ידי בדיקת דם

- **תופעות לוואי שכיחות** (עלולות להופיע אצל עד 1 מתוך 10 אנשים):
 - פצעי קור (הרופא סימפלקס)
 - זיהום הגורם לקלקול קיבת או לשלשול (גסטראנטריטיס)
 - זיהום בדרכי השתן
 - מספר גבוהה של טסיות (תאים המעורבים בקרישת דם), המודגם על ידי בדיקת דם (לא שכיח בדלקת עור אטופית ובלופסיה אראה)
 - כאב ראש בחילות (אינה שכיחה בדלקת עור אטופית)
 - כאב בטן (לא שכיח בלופסיה אראה)
 - רמות גבוהות של אנזימי כבד, המודגמות על ידי בדיקת דם (לא שכיח בדלקת עור אטופית)
 - פריחה אקנה (לא שכיח בדלקת מפרקים שגרונית)
 - עלייה ברמת האנדזים קרייאטין קינאז, המודגמת על ידי בדיקת דם (אינה שכיחה בדלקת מפרקים שגרונית)
 - דלקת (ণפיחות) של זקיקי השיער במיחוד באיזור הקركפת שבו מתרכשת צמיחה מחודשת של השיער (נצפהה בלופסיה אראה).

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להופיע بعد 1 מתוך 100 אנשים):

- מספר נמוך של תאי דם לבנים (נויטרופילים), המודגם על ידי בדיקת דם
- רמות גבוהות של שומנים (טריגליצרידים), המודגמות על ידי בדיקת דם
- רמות גבוהות של אנזימי כבד, המודגמות על ידי בדיקת דם (שכיחה בלופסיה אראה)
- עלייה במשקל נפוחות בפנים
- סרפדות קריישי דם בכל הדם של הריאות
- קריש דם בוורידי הרגליים או האגן, הנקרוא פקקת ורידים عمוקים (DVT)
- דיברטיקוליטיס (מחלת הסעף, diverticulitis) – דלקת כואבת של ציסים קטנים ברקמת המעי.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מאמין שהיא מתחילה כתוצאה לוואי של א. ציינה בעlion, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקבי טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקיים לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (date exp) המופיע על גבי הבליסטר ועל גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

- יש לאחסן מתחת ל-30°C.
- אין להשליך תרופה לשפכים או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח כיצד יש להיפטר מתרופות שאין משתמש בהן יותר. עצדים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

(ראה פרק 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה")
 microcrystalline cellulose, mannitol, croscarmellose sodium
 (מהמרכיבים של התרופה)
Film coating, color mixture pink 85G140008 (2 mg)/ 85G140009 (4 mg):

- polyvinyl alcohol
- titanium dioxide
- macrogol
- talc
- lecithin
- iron oxide red

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:
 אולומיאנט 2 מ"ג טבליות מצופות הן טבליות מאורכות בצבע ורוד בהיר, 9 x 7.5 מ"מ, עם הכתובת "Lilly" בצד אחד ו-"2" בצד השני.

אולומיאנט 4 מ"ג טבליות מצופות הן טבליות עגולות בצבע ורוד, 8.5 מ"מ, עם הכתובת "Lilly" בצד אחד ו-"4" בצד השני.

הטבליות מעוגלות ובעלות שקעים בצדדים על מנת להקל עליר בעת אחיזתן.

טבליות אולומיאנט 2 מ"ג ו-4 מ"ג זמיןות במגוון (אריזות בליסטר) של 14, 35, 56, 28, 84, 84 ו-98 טבליות במגוון קלינדריות (מסומנות לפ' ימים) ו-1 x 28 ו-1 x 84 טבליות במגוון מנוקבות של מנוט יחידות. ניתן כי לא כל גודל האריזות משוווקים.

בעל הרישום וכתובתו: אלילילי ישראל בע"מ, רח' השיזף 4, ת.ד. 4246, רעננה 4366411.

שם הייצן וכתובתו: אלילילי, אינדיאנפוליס, אינדיאנה, ארה"ב.

נערך בינואר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מוס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אולומיאנט 2 מ"ג: 00-35738-15-161

אולומיאנט 4 מ"ג: 00-35739-16-161

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה עלון זה נوش בלבוש זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.