

אפריל 2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה

חברת טבע מודיעה על העדכנים הבאים בעלון לרופא ולצרן של התכשיר :

**FENTORA®** פנטורה®

**Contains:** FENTANYL ( AS CITRATE )  
100/200/400/600/800 mcg

### עדכנים בעליון לרופא

#### התוויה כפי שאושרה בתעוזת הרישום:

Fentora is indicated for the treatment of breakthrough pain (BTP) in adults with cancer who are already receiving maintenance opioid therapy for chronic cancer pain.

BTP is a transitory exacerbation of pain that occurs on a background of otherwise controlled persistent pain.

Patients receiving maintenance opioid therapy are those who are taking at least 60 mg of oral morphine daily, at least 25 micrograms of transdermal fentanyl per hour, at least 30 mg of oxycodone daily, at least 8 mg of oral hydromorphone daily or an equianalgesic dose of another opioid for a week or longer.

**ברצוננו להודיע שבעלון לרופא ולצרן עודכנו, בפירוט שללן כלולים העדכנים העיקריים בלבד**  
**(תוספות מסומנות באדום והסרות מידע בטקסט מוחק):**

### עדכנים בעליון לרופא

[...]

#### 4.4 Special warnings and precautions for use

Because of the risks, including fatal outcome, associated with accidental exposure, misuse, and abuse, patients and their carers must be advised to keep Effentora in a safe and secure place, not accessible by others.

[...]

#### Tolerance and opioid use disorder (abuse and dependence) Drug dependence and potential for abuse

Tolerance, physical dependence and psychological dependence may develop upon repeated administration of opioids. ~~Introgressive addiction following opioid administration may occur.~~ Fentanyl can be abused in a manner similar to other opioids and all patients treated with opioids require monitoring for signs of abuse and addiction. Patients at increased risk of opioid abuse may still be



appropriately treated with opioids; however, these patients will require additional monitoring for signs of misuse, abuse, or addiction.

Repeated use of Fentora may lead to Opioid Use Disorder (OUD). A higher dose and longer duration of opioid treatment, can increase the risk of developing OUD. Abuse or intentional misuse of Fentora may result in overdose and/or death. The risk of developing OUD is increased in patients with a personal or a family history (parents or siblings) of substance use disorders (including alcohol use disorder), in current tobacco users or in patients with a personal history of other mental health disorders (e.g. major depression, anxiety and personality disorders).

#### *Treatment duration and goals*

Before initiating treatment with Fentora, a treatment strategy including treatment duration and treatment goals, and a plan for end of the treatment, should be agreed together with the patient, in accordance with pain management guidelines. Before and during treatment the patient should also be informed about the risks and signs of OUD. Patients should be advised to contact their physician if these signs occur. During treatment, there should be frequent contact between the physician and the patient to evaluate the need for continued treatment, consider discontinuation and to adjust dosages if needed. In absence of adequate pain control, the possibility of hyperalgesia, tolerance and progression of underlying disease should be considered (see section 4.4). Fentora should not be used longer than necessary.

[...]

## **4.8 Undesirable effects**

[...]

#### Description of selected adverse reactions

Tolerance, physical and/or psychological dependence may develop upon repeated administration of opioids such as fentanyl (see section 4.4).

##### **Tolerance**

Tolerance can develop on repeated use.

#### Drug dependence

Repeated use of Fentora lead to drug dependence, even at therapeutic doses. The risk of drug dependence may vary depending on a patient's individual risk factors, dosage, and duration of opioid treatment (see section 4.4).

[...]

## 4.9 Overdose

### Symptoms

[...]

Toxic leukoencephalopathy has also been observed with fentanyl overdose.

[...]

## עדכוניים בעלוں לצרכן

[...]

### 2. לפני השימוש בתרופה

[...]

### اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

עליך להמשיך ליטול את התרופה המיעדת לשיכור כאב הסרטן המתמשר תוך כדי השימוש בפנטורה.

בתקופת הטיפול בפנטורה אין להשתמש בתרופות אחרות המכילות פנטניל אשר נרשמו לך בעבר לשיכור כאב מתפרק. אם ברשותך תרופות כאלה עליך להיוועץ ברוקח כיצד להשליך תרופות שאין בהן צורך.

אחסן תרופה זאת במקום בטוח ושמור שלאנשים אחרים אין גישה אליו. למידע נוסף ראה סעיף 5 - "איך לאחסן את התרופה?".

[...]

### שימוש לטוווח ארוך וסבלנות לתרופה

תרופה זו מכילה פנטניל שהיא תרופה אופיאידית. שימוש חוזר ונשנה במשככי כאבים אופיאידים עלול לגרום לכך שהתרופה תהיה פחות יעילה (אתה מתרגל אליה, תופעה המכונה סבלנות לתרופות). אתה עלול גם להיות רגיש יותר לנשך בזמן השימוש בפנטורה. תופעה זו ידועה בשם היפראלגזה. ההגדלת מינון פנטורה עשויה לעזור בהפחחתת הכאב לזמן מה, אך היא גם עלולה להזיק. אם אתה שם לב שהתרופה הופכת פחות יעילה, התיעיז עם הרופא. הרופא יחליט אם עדיף להעלות את המינון או להפחית בהדרגה את השימוש בפנטורה.

## תלות והתמכרות

שימוש חוזר ונשנה בפנטורוה גורם לתלות, וכן עלול לגרום לשימוש יתר ולהתמכרות, שעלולים לגרום למינון יתר מסכן חיים. הסיכון לתופעות לוואי אלו יכול לעלות עם מינון גבוהה יותר ומשך שימוש ארוך יותר. תלות או התמכרות יכולות לגרום לך להרגיש שאתה כבר לא שולט בנסיבות התרופה שאתה צריך להשתמש בה או באיזו תדירות אתה צריך להשתמש בה. אתה עשוי להרגיש שאתה צריך להמשיך ולהשתמש בתרופה, גם כאשר זה השימוש בה לא עוזר לך להקל על הכאב.

הסיכון לתלות או להתמכרות משתנה מ אדם לאדם. יתכן שיש לך סיכון גדול יותר להיות תלוי או מכור לפנטורזה אם:

- אתה או מי שהוא מ משפחתך השתמש ביותר או התמכר לאלכוהול, תרופות מרשם או סמים לא חוקיים ("התמכרות").
- אתה מעשן.
- היoste לך בעיות במצב הרוח (דיכאון, חרדה או הפרעת אישיות) או טיפולת על ידי פסיכיאטר בגין מחלות נפש אחרות.

אם אתה מבחין באחד מהסתמנים הבאים בזמן השימוש בפנטורזה, זה יכול להיות סימן שהפקת תלוי בתרופה או התמכרת אליה:

- עלייך להשתמש בתרופה לפחות זמן רב יותר ממה שהומלץ על ידי הרופא.
- עלייך להשתמש ביותר מ מהeminן המומלץ.
- אתה משתמש בתרופה מסיבות שונות מללה שבגלן נרשמה לך, למשל, 'להישאר רגוע' או 'לעזר לך לדבר'.
- עשית ניסיונות חוזרים ונשנים שלא הצליחו להפסיק או לשנות בשימוש בתרופה.
- כאשר אתה מפסיק ליטול את התרופה אתה מרגיש לא טוב (למשל בחילות, הקאות, שלשלולים, חרדות, צמרמורות, רעד והזעה), ואתה מרגיש טוב יותר לאחר השימוש בתרופה שוב ('תופעות גמילה').

אם אתה מבחין באחד מהסתמנים הללו, הטיעוץ עם הרופא שלך כדי לדון בטיפול הטוב ביותר עבורך, כולל מתי נכוון להפסיק וכיידך להפסיק לצורה בטוחה.

[...]

## 3. כיצד השתמש בתרופה

[...]

לפני תחילת הטיפול ובאופן קבוע במהלך הטיפול, הרופא ידוע איתך גם על מה אתה יכול לצפות משימוש בפנטורזה, מתי וכמה זמן עלייך לקחת את התרופה, מתי לפנות לרופא ומתי עלייך להפסיק את התרופה (ראה גם סעיף 2- "לפני השימוש בתרופה").

[...]

## אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר

[...]

- מנת יתר עלולה לגרום גם להפרעה מוחית המכונה ל'ϊוקואנצפלופתיה רעליה.

[...]

#### 4. תופעות לוואי

[...]

- תלוות בתרופה (התמכרות). ראה סעיף 2 - "לפני השימוש בתרופה".
- שימוש יתר בתרופות. ראה סעיף 2 - "לפני השימוש בתרופה".
- **סבירות לתרופה.** ראה סעיף 2 - "**לפני השימוש בתרופה.**".

[...]

#### 5. איך לאחסן את התרופה

- אחסון תרופה זאת במקום בטוח ושמור לאנשים אחרים אין גישה אליו. התרופה יכולה לגרום לנזק חמור ולהיות קטלנית לאנשים **שעלולים** לחתת תרופה זו בטעות, או בכונה כאשר היא לא נרשמה בעברם.

העלון לצרכן ולרופא נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות  
חמור ולהיות קטלנית לאנשים **שעלולים** לחתת תרופה זו בטעות, או בכונה כאשר היא לא נרשמה בעברם.  
<https://israeldrugs.health.gov.il>