

אמוקסי קאר פורטה 250 תרחיף

החומר הפעיל וכמותו:

כל 1 מ"ל מכיל:

אמוקסיצילין (כטריהידראט) 50 מ"ג Amoxicillin (as trihydrate) 50 mg

למידע על חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בזיהומים הנגרמים ע"י חיידקים הרגישים לאמוקסיצילין. כמו כן, התרופה מיועדת למניעת זיהום חיידקי בחולים הנמצאים בסיכון לפתח דלקת פנים הלב על רקע חיידקי.

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים.

ישנם זיהומים הנגרמים על ידי וירוסים, כגון הצטננות. התרופה אינה פוגעת בוורוסים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אמוקסיצילין) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- יש לך רגישות לתרופות אחרות מקבוצת הפניצילינים או הצפלוספורינים או לאנטיביוטיקה דומה כגון אמוקסיצילין, אמפיצילין, צפלקסין ואחרות.
- אתה סובל ממחלת הנשיקה, או אם יש חשד לכך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באמוקסי קאר פורטה 250 תרחיף, ספר לרופא אם:

- סבלת בעבר מתגובה אלרגית לאנטיביוטיקה מקבוצת הבטא-לקטמים (כגון אמפיצילין, פיפרצילין). ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
- אתה נוטל תרופות לדילול הדם (כגון וורפרין וכדומה).
- סבלת בעבר משלשולים או מדלקת של המעי הגס (קוליטיס) כתוצאה משימוש באנטיביוטיקה.
- אתה סובל מבעיות בכליות.

תגובות בין תרופתיות:

- אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:
 - תרופות לטיפול בסרטן (כגון מתוטרקסאט).
 - תרופות לצרבת או לשיגדון (סימטדין או פרובנציד).
 - גלולות למניעת הריון - אמוקסיצילין עלול להפחית את יעילות הגלולות.
 - תרופות לדילול הדם (כגון וורפארין) - עלולות לגרום לדימומים.
 - אנטיביוטיקות (כגון טטרציקלינים) - עלולות להוריד את יעילות אמוקסיצילין.
- שימוש באמוקסי קאר פורטה 250 תרחיף עלול להשפיע על תוצאות של בדיקות מעבדה. התייעץ עם הרופא שלך במידת הצורך.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון, עם כוס מים.

הריון והנקה:

אם את בהריון או מתכננת להיכנס להריון, יש להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.
אם את מניקה או מתכננת להניק, היוועצי ברופא בנוגע לאופן ההנקה בזמן השימוש בתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- תרופה זו מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן ב- 1 מ"ל תרחיף ולפיכך נחשבת "נטולת נתרן".
- תרופה זו מכילה כ- 0.38 גרם סוכרוז ב- 1 מ"ל תרחיף. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבילות (רגישות) לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.
- תרופה זו מכילה 5 מ"ג סודיום בנזואט (E211) ב- 1 מ"ל תרחיף. סודיום בנזואט עלול להגביר צהבת (הצהבה של העור והעיניים) אצל יילודים (עד גיל 4 שבועות).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

הרופא המטפל יקבע מינון התרופה הנדרש ואת משך הזמן שיש ליטול התרופה בהתאם לסוג וחומרת הזיהום ממנו אתה או ילדך סובל. ספר לרופא אם אין שינוי במצב.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

זיהום בדרכי הנשימה העליונות, בריאות, בעור או ברקמות הרכות:

מבוגרים וילדים מעל גיל 10 שנים: 250-500 מ"ג, 3 פעמים ביום, כל 8 שעות.

ילדים בגילאי 10-2 שנים: 125 מ"ג, 3 פעמים ביום, כל 8 שעות. בזיהומים חמורים ניתן להגדיל את המנה ל- 250 מ"ג, 3 פעמים ביום.

תינוקות מתחת לגיל שנתיים: 62.5 מ"ג, 3 פעמים ביום, כל 8 שעות.

המינון המומלץ בהתאם למשקל גוף הינו 20 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק למנה כל 8 שעות. בזיהומים חמורים ניתן להגדיל את המינון ל- 40 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק למנה כל 8 שעות.

דלקת פשוטה של דרכי השתן או זיבה:

מבוגרים: 3 גרם במתן יחיד.

ילדים: 100 מ"ג/ק"ג במתן יחיד.

טיפול מניעתי לדלקת פנים הלב על רקע חיידקי (בטיפול שיניים):

מבוגרים וילדים מעל גיל 10 שנים: 3 גרם במתן יחיד, שעה לפני תחילת הטיפול.

ילדים מתחת לגיל 10 שנים: 1.5 גרם במתן יחיד, שעה לפני תחילת הטיפול.

יש להקפיד על מדידת מנת התרחיף בכוסית המדידה. ניתן ליטול התרופה עם או ללא מזון, עם כוס מים.
אין לעבור על המנה המומלצת.

הוראות הכנת התרחיף:

לאריזת 60 מ"ל: הרוקח יוסיף 41 מ"ל מים מזוקקים לבקבוק וינער היטב לקבלת תרחיף הומוגני.

לאריזת 100 מ"ל: הרוקח יוסיף 70 מ"ל מים מזוקקים לבקבוק וינער היטב לקבלת תרחיף הומוגני.

יש לנער את הבקבוק היטב לפני כל שימוש.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך, גם אם אתה לא חש בתסמינים. תסמינים של מנת יתר עלולים לכלול: סחרחורת חמורה.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול מנה מייד כשנזכרת. אם נזכרת בסמוך לזמן הנטילה של המנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה והמשך בטיפול כרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפצות על מנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם התסמינים חלפו, חשוב לסיים את הטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. הפסקת הטיפול לפני הזמן, שימוש לא נכון או שימוש יתר, עלולים לגרום להתפתחות עמידות של חיידקים לתרופה ולחזרת הזיהום. משמעות הדבר היא שהתרופה עלולה לא להועיל לך בעתיד.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באמוקסי קאר פורטה 250 תרחיף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא במקרים הבאים:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):

- פריחה.
- היסדקות העור או השפעות אחרות על העור והעיניים.
- בחילה.
- הקאה.
- שלשול.
- צואה דמית.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- אנפילקסיס (תגובה אלרגית חריפה כגון נפיחות באף, בעיניים, בגרון, קשיי נשימה, שלפוחיות בעור, פריחה וקילופי עור).
- תסמינים של בעיות בכליות (כגון שתן עכור).
- תסמינים של בעיות בכבד (כגון בחילות והקאות חוזרות ונשנות, כאבי בטן, עייפות יוצאת דופן, הצהבה של העיניים או העור, שתן כהה).

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- תגובה עורית חריפה (תסמינים דמויי שפעת, שלפוחיות וקילופים בעור).
- תופעות לוואי עוריות חמורות (SCAR- Severe Cutaneous Adverse Reactions).
- תגובות עוריות חמורות שעלולות להשפיע גם על איברים אחרים:
 - קילופים, קשקשים או שלפוחיות בעור (עם או בלי מוגלה) אשר עלולים להשפיע גם על העיניים, הפה, האף או איברי המין, גרד, פריחה חריפה, בליטות מתחת לעור, כאב בעור, שינוי בצבע העור (אודם, הצהבה או צבע ארגמני).
 - נפיחות ואודם של העיניים או הפנים.
 - הרגשה דמוית שפעת, חום, צמרמורות, כאבים בגוף, בלוטות לימפה נפוחות, שיעול.
 - קוצר נשימה, כאב או אי נוחות בחזה.

תופעות לוואי בשכיחות שאינה ידועה

דלקת קרום המוח אספטית (שאינה נגרמת על ידי חיידקים): בלבול, חום, בחילה, עייפות, כאבי ראש פתאומיים או נוקשות של הצוואר, רגישות לאור, הקאות.

יש להיוועץ ברופא אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):

- לשון שחורה הנראית שעירה (דלקת בלשון).
- שינוי בצבע השיניים בילדים (כתמים חומים, צהובים או אפורים).
- סחרחורת.
- חרדה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000):

• אלרגיה עורית (סרפדת).

- גרד.
- פריחה בפנים.

• נפיחות.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- קושי להירדם (אינסומניה).
- בלבול או שינויים בהתנהגות.
- שינויים בתוצאות של בדיקות דם.

תופעות לוואי שנצפו לאחר שיווק:

סינדרום קוניס – תגובה אלרגית חמורה שעלולה לגרום לאוטם שריר הלב (התקף לב), ייתכן שתופיע ככאב בחזה במקרה של תגובה אלרגית לאמוקסיצילין.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי איחסון:** יש לאחסן במקום יבש, מוגן מאור בתוך קופסת הקרטון, מתחת ל- 25°C.
- את התרחיף המוכן יש לשמור בטמפרטורת החדר ולהשתמש בו תוך 14 ימים.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose (Castor Sugar), Sodium Benzoate, Strawberry Flavor, Xanthan Gum, Sodium Citrate Anhydrous, Simethicone, Banana Flavor, EDTA Sodium.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוק המכיל אבקה לבנה.

אמוקסי קאר פורטה 250 תרחיף לאחר הוספת המים המזוקקים: נוזל בצבע לבן עד צהוב בהיר עם ריח פירות.

גודלי אריזה מאושרים:

60 מ"ל, 100 מ"ל.

ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

יצרן ובעל הרישום:

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, רח' הטחנה 6, ת"ד 114, בנימינה 3055002, ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 155-17-34692-00

עלון זה נערך באפריל 2024.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.