

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"י - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ויטאמוקס פורטה 250 תרחיף

החומר הפעיל ורכמותו:

כל 1 מ"ל מכיל:

אמוקסיצילין (כטראהידראט) 50 מ"ג Amoxicillin (as trihydrate) 50 mg

למידע על חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. **למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת לטיפול בziehominim הנגרמים ע"י חיידקים הרגשיים **לאמווקסיצילין**.

כמו כן, התרופה מיועדת למניעת ziehomim חיידקי בחולמים הנמצאים בסיכון לפתח דלקת פנים הלב על רקע חיידקי.

קובוצת תרפואית: אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים.

ישנם ziehominim הנגרמים על ידי וירוסים, כגון הצטננות. התרופה אינה פוגעת בוירוסים.

2. **לפני השימוש בתרופה**

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אמוקסיצילין) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה.
- יש לך רגשות לתרופות אחרות מקבוצת הפניצילינים או הצפלואספורינים או לאנטיביוטיקה דומה כגון אמווקסיצילין, אמפיצילין, צפלקסין ואחרות.
- אתה סובל ממחלה הנשיקה, או אם יש חשד לכך.

ażhorot miyadot haengutot leshimush batrufah

לפני הטיפול בויטאמוקס פורטה 250 תרחיף, ספר לרופא אם:

- סבלת בעבר מתגובה אלרגית לאנטיביוטיקה מקבוצת הבטא-לקטמינים (כגון אמפיצילין, פירציצילון). ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
- אתה נוטל תרופה לדילול הדם (כגון וורפרין וכדומה).
- סבלת בעבר משלשולים או מדלקת של המעי הגס (קולייטיס) כתוצאה משימוש באנטיביוטיקה.
- אתה סובל מבעיות בכליות.

תగובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לך歛ת לאחרונה, **תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות לטיפול בסרטן (כגון מטוטרקטואט).
- תרופות לצרבת או לשיגדן (סימטדיין או פרובונציד).
- ഗלולות למניעת הריאן - אמווקסיצילין עלול להפחית את יעילות הגלולות.
- תרופות לדילול הדם (כגון וורפארין) – עלולות לגרום לדימומיים.
- אנטיביוטיקות (כגון טרציקליים) – עלולות להויריד את יעילות אמווקסיצילין.

שימוש בויטאמוקס פורטה 250 תרחיף עלול להשפיע על תוצאות של בדיקות מעבדה. התיעץ עם הרופא שלך מידת הצורך.

שימוש בתרופה ומazon

ניתן ליטול התרופה עם או ללא מזון, עם כוס מים.

הריאון והנתקה:

אם את בהריון או מתכוננת להיכנס להריון, יש להיעזר ברופא לפני נטילת התרופה.
אם את מניקה או מתכוננת להנתק, הייעוץ רפואי בגין לאופן ההנתקה בזמן השימוש בתרופה.

מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה

- תרופה זו מכילה פחotta מ- 23 מ"ג נתרן ב- 1 מ"ל תרחיף ולפיכך נחשבת "נטולת נתרן".
- תרופה זו מכילה כ- 0.38 גרם סוכרוז ב- 1 מ"ל תרחיף. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבירות (רגישות) לסוכרים מסוימים, הייעזר ברופא לפני נטילת התרופה.
- תרופה זו מכילה 5 מ"ג סודיום בנזואט (E211) ב- 1 מ"ל תרחיף. סודיום בנזואט עלול להגבר צהבת (הצהבה של העור והעינין) אצל ילדים (עד גיל 4 שבועות).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

הרופא המטפל יקבע מינון התרופה הנדרש ואת משך הזמן שיש ליטול התרופה בהתאם לסוג וחווארת הzihom ממנה אתה או ילך סובל. ספר לרופא אם אין שינוי במצב.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
ז'יום בדרכי הנשימה העליונות, בריאות, בעור או ברקמות הרכות:

מבוגרים וילדים מעל גיל 10 שנים: 500-250 מ"ג, 3 פעמים ביום, כל 8 שעות.
ילדים בגילאי 10-2 שנים: 125 מ"ג, 3 פעמים ביום, כל 8 שעות. בזיהומיים חמוריים ניתן להגדיל את המנה ל- 250 מ"ג, 3 פעמים ביום.

תינוקות מתחת לגיל שנתיים: 62.5 מ"ג, 3 פעמים ביום, כל 8 שעות.
המינון המומלץ בהתאם למשקל גופו הינו 20 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק למננה כל 8 שעות. בזיהומיים חמוריים ניתן להגדיל את המינון ל- 40 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק למננה כל 8 שעות.

דלקת פשוטה של דרכי השתן או זיבחה:

מבוגרים: 3 גרם במתן יחיד.
ילדים: 100 מ"ג/ק"ג במתן יחיד.
טיפול מניעתי לדלקת פנים הלב על רקע חיזיקי (בטיפול שניינים):
מבוגרים וילדים מעל גיל 10 שנים: 3 גרם במתן יחיד, שעה לפני תחילת הטיפול.
ילדים מתחת לגיל 10 שנים: 1.5 גרם במתן יחיד, שעה לפני תחילת הטיפול.

יש להקפיד על מדידת מנת התרחיף בכיסית המדידה. ניתן ליטול התרופה עם או ללא מזון, עם כוס מים.
אין לעבור על המנה המומלצת.

הוראות הכנת התרחיף:

לאירוע 60 מ"ל: הרוקח יוסיף 41 מ"ל מים מזוקקים לבקבוק וינער היטב לקבלת תרחיף הומוגני.
לאירוע 100 מ"ל: הרוקח יוסיף 70 מ"ל מים מזוקקים לבקבוק וינער היטב לקבלת תרחיף הומוגני.
יש לנער את הבקבוק היטב לפני כל שימוש.

אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בלו' יلد מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך, גם אם אתה לא חש בתסמים. תסמינים של מנת יתר עלולים לכלול: סחרחות חמורה.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול מנה מייד כשנecerת. אם מכרת בסמוך בזמן הנטילה של המנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה והמשך בטיפול כרגע. אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפצות על מנה שנשכחה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם התסמים חלפו, חשוב לסייעים את הטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. הפסקת הטיפול לפני הזמן, שימוש לא נכון או שימוש יתר, עלולים לגרום להתקפות עמידות של חיזיקים לתרופה ולהזרת הzihom. שימוש הדבר היא שהתרופה עלולה לא להועיל לך בעתיד.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ רפואי או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בiotamoxif פורטה 250 תרחיף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחן למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא במקרים הבאים:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):

- פריחה.
- היסודות העור או השפעות אחרות על העור והעינים.
- בחילה.
- הקאה.
- שלשול.
- צואה דםית.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- אנפילקסיס (תגובה אלרגית חריפה כגון נפיחות באף, בעיניים, בגרון, קשי נשימה, שלפוחיות בעור, פריחה וקילופי עור).

• תס敏ינים של בעיות בכליות (כגון שタン עכור).

- תס敏ינים של בעיות בכבד (כגון בחילות והקאות חוזרות ונשנות, כאבי בטן, עייפות יצאת דופן, הצהבה של העיניים או העור, שタン כהה).

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- תגובה עורית חריפה (תס敏ינים דמווי שפעת, שלפוחיות וקילופים בעור).

• תופעות לוואי עוריות חמורות (SCAR- Severe Cutaneous Adverse Reactions).

- תגובה עוריות חמורות שעולות להשפיע גם על אחרים:

- קילופים, קשיים או שלפוחיות בעור (עם או בלי מוגלה) אשר עלולים להשפיע גם על העיניים, הפה, האף או איברי המין, גרד, פריחה חריפה, בליטות מתחת לעור, כאב בעור, שינוי בצבע העור (אודם, הצהבה או צבע ארוגני).

- נפיחות ואודם של העיניים או הפנים.

- הרגשה דמוית שפעת, חום, צמרמורות, כאבים בגוף, בלוטות לימפה נפוחות, שיעול.

- קוצר נשימה, כאב או אי נוחות בחזה.

תופעות לוואי שכיחות שנייה ידועה

דלקת קרום המוח אספטיית (שאינה נגרמת על ידי חידקים): בלבול, חום, בעילה, עייפות, כאבי ראש פתאומיים או נזקשות של הצוואר, רגימות לאור, הקאות.

יש להיוועץ ברופא אם מופיעות תופעות הלואוי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):

- לשון שחורה הנראית שעריה (דלקת בלשון).

- שינוי בצבע השיניים בילדים (כתמים חומים, צהובים או אפורים).

• סחרורת.

• חרדה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- אלרגיה עורית (סרפתת).

• גרד.

• פריחה בפנים.

• נפיחות.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- קושי להירדם (אנסומניה).

• בלבול או שינויים בהתנהגות.

• שינויים בתוצאות של בדיקותدم.

תופעות לוואי שנצפו לאחר שימוש:

סינדרום קוני – תגובה אלרגית חמורה שלולוה לגרום לאותם שריר הלב (התקף לב), יתכן שתופיע ככאב בחזה במקורה של תגובה אלרגית לאנטוכיצילין.

אם הופעת תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעילו, עיר להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי", שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדיווח על

תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעלת!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כר תמנע הרעלת. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חדש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן במקום יבש, מוגן מאור בתוך קופסת הקרטון, מתחת ל- 25°C .
- את התרכיף המוכן יש לשמר בטמפרטורת החדר ולהשתמש בו תוך 14 ימים.
- אין להשליך תרופות לביב או לפחות אשפה ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose (Castor Sugar), Sodium Benzoate, Strawberry Flavor, Xanthan Gum, Sodium Citrate Anhydrous, Simethicone, Banana Flavor, EDTA Sodium.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוק המכיל אבקה לבנה.

ויטאמוקס פורטה 250 תרחיף לאחר הוספת המים המזוקקים: נוזל צבע לבן עד צהוב בהיר עם ריח פירות.

גודלי אריזה מאושרים:

60 מ"ל, 100 מ"ל.

יתכן שלא כל גודלי האrizות משוקקים.

צורך ובטל הרישום:

ויטאמוקס תעשיות פרמצבטיות בע"מ, רח' הטכונה 6, ת"ד 114, בניינה 2055002, ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-36240-68-163

עלון זה נערך באפריל 2024.

שם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.