

עלון לצריך לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ג - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

ויטאמוקס פורטה 500 כמוסות

החומר הפעיל ורכמותו:

כל כמוסה מכילה: אמווקסיצילין (כטראהיידראט) 500 מ"ג Amoxycillin (as trihydrate) 500 mg

למיידע על חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה ראה סעיף 2 "מיידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מיידע נוספים".
קרא בעין את העלון עד סופו בטרם **תשתחש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתו. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. **למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת לטיפול בזיהומי הנגרמים על ידי חיידקים הרגשיים לאמווקסיצילין. כמו כן, התרופה מיועדת למניעת>Zיהום חיידקי בחולים הנמצאים בסיכון לפתח דלקת פנים הלב על רקע חיידקי.

קבוצה רפואיית: אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים. ישנים זיהומיים הנגרמים על ידי וירוסים, כגון הצטננות. התרופה אינה פוגעת בוירוסים.

2. **לפni השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אמווקסיצילין) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה.
- יש לך רגישות לתרופות אחרות מקבוצת הפניצילינים או הצלואספורינים או לאנטיביוטיקה דומה כגון אמווקסיצילין, אמפיצילין, צפלקסין ואחרות.
- אתה סובל ממחלת הנשימה או אם יש חשד לכך.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בכמוסות של ויטאמוקס פורטה 500, ספר לרופא אם:

- סבלת בעבר מתגובה אלרגית לאנטיביוטיקה מקבוצת הבטא-לקטמינים (כגון אמפיצילין, פירציצילין). ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
- אתה נוטל תרופות לדילול הדם (כגון וורפרין וכדומה).
- סבלת בעבר משלשולים או מדלקת של המעי הגס (קולייטיס) כתוצאה שימוש באנטיביוטיקה.
- אתה סובל מבעיות בכליות.

תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקחת:

- תרופות לטיפול בסרטן (כגון מטוטרקטאט).

- תרופות לצרבת או לשיגdon (סימטידין או פרובנציד).

- గלולות למניעת הריאן - אמווקסיצילין עלול להפחית את יעילות הגלולות.

- תרופות לדילול הדם (כגון וורפארין) – עלולות לגרום לדימומים.

- אנטיביוטיקות (כגון טריציקליים) – עלולות להויריד את יעילות אמווקסיצילין.

שימוש בכמוסות ויטאמוקס פורטה 500 עלול להשפיע על תוצאות של בדיקות מעבדה. התיעץ עם הרופא שלך במידה הצורך.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

הרין והנקה:

אם את בהринן או מתכנתת להיכנס להרין, יש להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.
אם את מניקה או מתכנתת להניק, היועץ ברופא בוגר לאופן ההנקה בזמן השימוש בתרופה.

מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן לכמואה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגר למינון ואופן הטיפול בתרופה.
הרופא המטפל יקבע את מינון התרופה הנדרש ואת משך הזמן שיש ליטול התרופה בהתאם לסוג ולחומרת הזיהום ממנו אתה סובל. ספר לרופא אם אין שינוי במצב.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
זהיום בדרכי הנשימה העליונות, בריאות, בעור או ברקמות הרוכות:

מבוגרים וילדים מעל גיל 10 שנים: 250-500 מ"ג, 3 פעמים ביום, כל 8 שעות.
המינון המומלץ בהתאם למשקל גוף הינו 20 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק למנת כל 8 שעות.
בזיהומים חמוריים ניתן להגדיל את המינון ל- 40 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק למנת כל 8 שעות.

דלקת פשוטה של דרכי השתן או זיבנה:

מבוגרים: 3 גרם במתן יחיד.

ילדים: 100 מ"ג/ק"ג במתן יחיד.

טיפול מניעתי לדלקת פנים הלב על רקע חידקי (בטיפול שניינים):

מבוגרים וילדים מעל גיל 10 שנים: 3 גרם במתן יחיד, שעה לפני תחילת הטיפול.
ילדים מתחת לגיל 10 שנים: 1.5 גרם במתן יחיד, שעה לפני תחילת הטיפול.

כמוסות של ויטאמוקס פורטה 500 לבליעה, אין מזעים בדרך כלל לילדים ולתינוקות מתחת לגיל 6 שנים.
עבור מטופלים שאינם יכולים לבולע או חזקוקים לטיפול במינונים נמוכים מ- 500 מ"ג, קיימים תכשירים רשומים מותאימים בישראל (כגון ויטאמוקס בתרכיף).
אין לעבר על המנה המומלצת.

אופן השימוש בתרופה:

אין לעוזו, יש לבולע את הכמוסה בשלהوتה עם כוס מים, עם או ללא מזון. אין מידע לגבי פתיחה ופיזור תוכן הכמוסה.
ספר לרופא אם מצבך אינו משתפר.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלעילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך, גם אם אתה לא חש בתסמינים. תסמינים של מנת יתר עלולים לכלול: סחרחות חמורה.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, יש ליטול מנה מייד כשנזכרת. אם נזכרת בסמוך לזמן הנטילה של המנה הבאה, דלג על המנה שנשכח והמשך טיפול כרגע. אין ליטול שתי מנות יחד על מנת לפזר על מנה שנשכח.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם התסמים חלפו, חשוב לסיים את הטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. הפסקת הטיפול לפני הזמן, שימוש לא נכון או שימוש יתר, עלולים לגרום להתקפות עמידות של חידקים לתרופה ולהזרת הזיהום. שימוש הדבר היא שהתרופה עלולה לא להועיל לך בעתיד.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהיא נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך חזק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בكمויות של ויטามוקס פורטה 500 עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבלה למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך מהן.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא במקרים הבאים:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 100):

- פריחה
- היסודות העור או השפעות אחרות על העור והעיניהם
- בחילה
- הקאה
- שלשול
- צואה דמיאת

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- אונפילקסיים (תגובה אלרגית חריפה כגון נפיחות באף, בעיניים, בגרון, קשיי נשימה, שלפוחיות בעור, פריחה וקילופי עור)
- מסמים של בעיות כלכליות (כגון שtan עכור).
- מסמים של בעיות בכבד (כגון בחילות והקאות חוזרות ונשנות, כאבי בטן, עייפות יצאת דופן, הצהבה של העיניים או העור, שtan כהה).

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- תגובה עורית חריפה (تسمנים דמווי שפעת, שלפוחיות וקילופים בעור)
- תופעות לוואי עוריות חמורות (Severe Cutaneous Adverse Reactions – SCAR), תשובות עוריות חמורות שלולות להשפיע גם על איברים אחרים:
 - קילופים, קששים או שלפוחיות בעור (עם או בלי מוגלה) אשר עלולים להשפיע גם על העיניים, הפה, האף או איברי המין, גרד, פריחה חריפה, בלוטות מתחת לעור, כאב בעור, שינוי בצבע העור (אודם, הצהבה או צבע ארגמני).
 - נפיחות ואודם של העיניים או הפנים.
 - הרגשה דמוית שפעת, חום, צמרמות, כאבים בגוף, בלוטות לימפה נפוחות, שיעול.
 - קוצר נשימה, כאב או אי נוחות בחזה.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה:

דלקת קרום המוח אספטית (שאינה נגרמת על ידי חידקים): בלבול, חום, בחילה, עייפות, כאבי ראש פתאומיים או נזקשות של הצואר, רגשות לאור, הקאות.

יש להיעזר ברופא אם מופיעות תופעות הלואן הבאות:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 100):

- לשון שחורה הנראית שעירה (דלקת בלשון)
- שינוי בצבע השיניים ילדים (כתמים חומניים, צהובים או אפורים)
- סחרחות
- חרדה.

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- אלרגיה עורית (סרפתת)
 - גרד
 - פריחה בפנים
 - נפיחות.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- קושי להירדם (איינסומניה).
- בלבול או שינויים בהתנהגות.
- שינויים בתוצאות של בדיקות דם.

תופעות לוואי שנצפו לאחר שיזוק:

סינדרום קונייס – תגובה אלרגית חמורה שלוללה לגרום לאותם שריר הלב (התקף לב), יתכן שתופיע ככאב בחזה במקורה של תגובה אלרגית לאנטוקסיצילין.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי
יתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי", שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנוע הרעליה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל- 25°C.
- אין להשליך תרופות לביב או לפח אשפה ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף: נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Magnesium stearate, Starch, Talc..

Empty capsule: Gelatin, Titanium Dioxide, Indigotine- FD&C Blue 2.

Ink composition: Shellac, Propylene glycol, Strong Ammonia solution, Potassium Hydroxide, Black Iron Oxide.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האזינה:
כמוסה בצבע תכלת עם כיתוב "VITAMED VITAMOX FORTE".

גודל אריזה מאושר:
20 כמוסות.

יצרן ובעל הרישום:
ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, רח' הטchnerה 6, ת"ד 114, בניימה 2, 3055002, ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
163-69-36239-00

עלון זה נערך באפריל 2024.
לשם הפשתות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.