

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

ديفيراسيروكس تارو 500 ملغ أقراص ذوّابة لتحضير معلق للشرب	ديفيراسيروكس تارو 250 ملغ أقراص ذوّابة لتحضير معلق للشرب	ديفيراسيروكس تارو 125 ملغ أقراص ذوّابة لتحضير معلق للشرب
كل قرص ذواب يحتوي على: ديفيراسيروكس 500 ملغ deferasirox 500 mg	كل قرص ذواب يحتوي على: ديفيراسيروكس 250 ملغ deferasirox 250 mg	كل قرص ذواب يحتوي على: ديفيراسيروكس 125 ملغ deferasirox 125 mg

المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية: انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت
لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك أو لعلاج مرض طفلك/طفلتك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين
مرضك ومرضهم.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

- لعلاج فرط تحميل الحديد المزمن (overload iron) الناتج عن تسريبات الدم، لدى البالغين ولدى الأطفال (من عمر سنتين وما فوق).
- لعلاج فرط تحميل الحديد المزمن غير المتعلق بتسريبات الدم لدى مرضى فقر دم البحر الأبيض المتوسط (تالاسيميا) من عمر 10 سنوات وما فوق.

الفصيلة العلاجية: مستخلبات الحديد (iron chelating agent).

يتطلب أحياناً إجراء تسريبات دم متكررة لدى المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من فقر الدم مثل تالاسيميا، فقر الدم المنجلي ومتلازمة خلل التنسج النخاعي (myelodysplastic syndrome, [MDS]). لكن، تسريبات الدم المتكررة قد تسبب تراكم فائض من الحديد. هذا بسبب احتواء الدم على الحديد وعدم وجود وسيلة طبيعية يتخلص فيها الجسم من فائض الحديد الحاصل من تسريبات الدم.

لدى مرضى تالاسيميا غير المتعلقين بتسريبات الدم، قد يتطور فائض من الحديد بمرور الزمن خاصة إثر امتصاص زائد للحديد من الطعام كرد فعل لتعداد منخفض لخلايا الدم. إن فائض الحديد مع مرور الزمن يمكن أن يسبب ضرراً لأعضاء حيوية مثل الكبد والقلب.

أدوية من نوع مستخلبات الحديد تستعمل للتخلص من فائض الحديد وتقلل خطورة حدوث ضرر لأعضاء الجسم. ديفيراسيروكس تارو يمسك ويطرد فائض الحديد الذي يطرح لاحقاً في البراز بشكل أساسي.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) لـ ديفيراسيروكس أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية"). إذا كان هذا الأمر ينطبق عليك، احك للطبيب قبل تناول ديفيراسيروكس تارو. إذا كنت تعتقد بأن لديك حساسية، استشر الطبيب.
- وجد لديك مرض كلوي متوسط أو شديد.
- كنت تتناول حالياً دواء آخر من نوع مستخلبات الحديد.

لا يوصى باستخدام ديفيراسيروكس تارو إذا

- وجدت لديك متلازمة خلل التنسج النخاعي (MDS)؛ إنتاج منخفض لخلايا الدم من قبل النخاع العظمي) بمرحلة متقدمة أو سرطان متقدم.

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

قبل العلاج بـ ديفيراسيروكس تارو، احك للطبيب إذا:

- وجدت لديك مشكلة في الكبد أو في الكلى.
- كنت تعاني من مشكلة في القلب ناتجة عن فائض الحديد.
- كنت تلاحظ تناقص ملحوظ في التبول (علامة لمشكلة في الكلى).

- وجد لديك طفح شديد أو صعوبات في التنفس ودوار أو انتفاخ خاصة في الوجه والحجرة (علامات لرد فعل تحسسي خطير، انظر أيضًا البند 4 "الأعراض الجانبية").
- لديك مزيج من أي من الأعراض التالية: طفح، احمرار في الجلد، حويصلات على الشفتين، العينين أو الفم، تقشر للجلد، سخونة مرتفعة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تضخم العقد الليمفاوية (علامات لرد فعل جلدي خطير، انظر أيضًا البند 4 "الأعراض الجانبية").
- كنت تشعر بمزيج من نعاس، ألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن، اصفرار أو زيادة اصفرار الجلد أو العينين ويول داكن (علامات لمشاكل في الكبد).
- كنت تقاسي من صعوبات في التفكير، تذكر المعلومات أو حل المسائل، تشعر بأنك أقل يقظة أو إدراكا للمحيط، أو تشعر بأن لديك ميل شديد للنوم يترافق بقلة الحيوية (علامات لارتفاع مستوى الأمونيا في الدم، الأمر الذي من شأنه أن يكون مرتبطاً بمشاكل في الكبد أو الكلى، انظر أيضًا البند 4 "الأعراض الجانبية").
- كنت تتقيأ دماً و/أو لديك براز أسود.
- وجد لديك ألم متكرر في البطن، خاصة بعد تناول الطعام أو تناول ديفيراسيروكس تارو.
- وجد لديك حرقان متكرر.
- وجد لديك تعداد منخفض للصفائح الدموية أو لخلايا الدم البيضاء في فحوصات الدم.
- وجد لديك تشوش في الرؤية.
- وجد لديك إسهال أو تقيؤات.
- في حال كانت إحدى تلك الحالات تنطبق عليك، أخبر الطبيب حالاً.

الأطفال والمراهقون

يمكن استعمال ديفيراسيروكس تارو لدى الأطفال والمراهقين من عمر سنتين وما فوق لعلاج فرط تحميل الحديد المزمّن الناتج عن تسريبات الدم ومن عمر 10 سنوات وما فوق لعلاج فرط تحميل الحديد المزمّن غير المتعلق بتسريبات الدم لدى مرضى التالاسيميا. سوف يلائم الطبيب الجرعة الدوائية وفقاً لنمو الطفل. ديفيراسيروكس تارو غير مخصص للاستعمال لدى أطفال دون عمر سنتين.

الفحوصات والمتابعة

خلال فترة العلاج عليك اجتياز فحوص الدم والبول بشكل منتظم. هذه الفحوص تراقب كمية الحديد في جسمك (مستويات الفريتين في الدم) للتأكد فيما إذا كان ديفيراسيروكس تارو يؤثر كما ينبغي. تساعد هذه الفحوص أيضاً على متابعة وظائف الكلى (نسب الكرياتينين في الدم، وجود بروتين في البول) ووظائف الكبد (مستويات ترانسأميناز في الدم، بيليروبين وألكالين فوسفاتاز). من شأن الطبيب أن يطلب منك إجراء خزعة الكلى، في حال شك بوجود تضرر ملحوظ في الكلى. من الجائز أيضاً أن تجتاز فحوصات MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي) لتحديد كمية الحديد في الكبد. يأخذ الطبيب بعين الاعتبار هذه الفحوص عندما يقرر أي جرعة دوائية من ديفيراسيروكس تارو تناسبك أكثر كذلك يستعمل هذه الفحوصات كي يقرر متى يتوجب عليك التوقف عن تناول ديفيراسيروكس تارو.

يتوجب عليك اجتياز فحوص للسمع والرؤية قبل بدء العلاج ومرة في السنة خلال العلاج كوسيلة حذر.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

- يُمنع مشاركة تناول ديفيراسيروكس تارو مع مستحضرات إضافية مستخلبة للحديد.
- يُمنع تناول أدوية مضادة للحموضة (أدوية تستعمل لمعالجة الحرقان) التي تحوي ألومنيوم بنفس الوقت من اليوم مع ديفيراسيروكس تارو.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- سيكلوسبورين (يستعمل لمنع رفض عضو مزروع أو في حالات أخرى، مثلاً التهاب المفاصل الروماتيزمي أو ربو الجلد)
- سيمفاستاتين (يستعمل لتخفيض الكوليسترول)
- مسكنات الألم معينة أو أدوية مضادة للالتهاب (مثلاً، أسبيرين، ايبوبروفن، كورتيكوستيروئيدات)
- بيسفوسفونات عن طريق الفم (تستعمل لعلاج مرض هشاشة العظام)
- أدوية مضادة للتخثر (تستعمل لمنع أو لعلاج تشكل الخثرات الدموية)
- وسائل منع حمل هرمونية (مستحضرات لمنع الحمل)
- بييريديل، إيرغوتامين (يستعملان لعلاج المشاكل القلبية والشقيقة)
- ريباجلينيد (يستعمل لعلاج السكري)
- ريفامبيسين (يستعمل لعلاج السل)
- فينيتوئين، فينوباربيتال، كاربامازيبين (تستعمل لعلاج الصرع)

- ريتونافير (يستعمل لعلاج عدوى HIV)
- باكليتاكسل (يستعمل لعلاج السرطان)
- تيوفيلين (يستعمل لعلاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو)
- كلوزابين (يستعمل لعلاج الاضطرابات النفسية مثل الفصام)
- تيزانيدين (يستعمل كمرخي للعضلات)
- كولستيرامين (يستعمل لخفض مستويات الكوليسترول في الدم)
- بوسولفان (يستعمل كعلاج قبل عملية الزرع وذلك بغية إتلاف نخاع العظم الأصلي قبل عملية الزرع)
- ميدازولام (يستعمل للتخفيف من القلق و/أو من صعوبة النوم)

من الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوصات إضافية لمراقبة مستويات بعض الأدوية في الدم.

استعمال الدواء والغذاء

يجب تناول ديفيراسيروكس تارو على معدة خاوية والانتظار 30 دقيقة على الأقل قبل تناول أي طعام، يفضل بوقت محدد كل يوم. يجب إذابة الأقراص في كأس من الماء، عصير التفاح أو عصير البرتقال. لا يجوز تذويب الأقراص في مشروبات فوارة أو في الحليب (انظر أيضًا فيما يلي "كيفية تناول ديفيراسيروكس تارو").

الاستعمال لدى المسنين (بالغون بعمر 65 سنة وما فوق)

يمكن للأشخاص البالغين بعمر 65 سنة وما فوق استعمال نفس الجرعة الدوائية من ديفيراسيروكس تارو بكيفية البالغين. قد يقاسي المتعالجون المسنون من أعراض جانبية أكثر (خاصة إسهال) من المتعالجين الأصغر سنًا. يجب أن يكونوا تحت مراقبة حثيثة من قبل الطبيب لتحديد الأعراض الجانبية التي من شأنها أن تتطلب ملاءمة الجرعة الدوائية.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو الإرضاع، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء. لا يوصى باستعمال ديفيراسيروكس تارو خلال فترة الحمل إلا إذا كان ضروريًا بشكل واضح. إذا كنت تستعملين وسيلة منع حمل هرمونية فعليك استعمال وسيلة إضافية لمنع الحمل أو وسيلة أخرى (الكوندوم مثلاً)، لأن ديفيراسيروكس تارو قد يضعف من نجاعة وسائل منع الحمل الهرمونية. لا يوصى بالإرضاع أثناء العلاج بـ ديفيراسيروكس تارو.

السياقة واستعمال الماكينات

إذا كنت تشعر بالدوار بعد تناول ديفيراسيروكس تارو، فلا يجوز قيادة المركبة أو تشغيل أدوات أو ماكينات حتى يعود شعورك طبيعيًا. بالنسبة للأطفال يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

تحتوي أقراص ديفيراسيروكس تارو على اللكتوز (سكر الحليب) والصوديوم. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، بلِّغ الطبيب قبل تناول ديفيراسيروكس تارو. يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليمول (23 ملغ) صوديوم في كل قرص، لذا يعتبر فعليًا "خالٍ من الصوديوم".

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. يجب أن يتم العلاج بـ ديفيراسيروكس تارو تحت إشراف طبيب متمرس في علاج فائض الحديد. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط. تتعلق الجرعة الدوائية من ديفيراسيروكس تارو بوزن الجسم لدى كافة المتعالجين. يقوم الطبيب بحساب الجرعة الدوائية التي تحتاجها ويقول لك كم من الأقراص عليك تناولها كل يوم.

الجرعة الدوائية المتبعة اليومية عند بدء العلاج عادة:

- للمتعالجين الذين يتلقون تسريبات الدم بشكل منتظم - 20 ملغ لكل كغم من وزن الجسم. من الجائز أن يوصي الطبيب بجرعة دوائية ابتدائية أعلى أو أخفض بالاعتماد على احتياجاتك العلاجية الشخصية.
- للمتعالجين الذين لا يتلقون تسريبات الدم بشكل منتظم - 10 ملغ لكل كغم من وزن الجسم.
- يمكن للطبيب لاحقًا أن يلائم لك العلاج بجرعة دوائية أعلى أو أخفض، وذلك بحسب استجابتك للعلاج.

الجرعة الدوائية اليومية القصوى هي:

- 40 ملغ لكل كغم من وزن الجسم لدى متعالجين يتلقون تسريبات الدم بشكل منتظم.
- 20 ملغ لكل كغم من وزن الجسم لدى متعالجين بالغين الذين لا يتلقون تسريبات الدم بشكل منتظم.

- 10 ملغ لكل كغم من وزن الجسم للأطفال حتى عمر 18 سنة الذين لا يتلقون تسريبات الدم بشكل منتظم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

فترة العلاج

يجب الاستمرار في تناول ديفيراسيروكس تارو كل يوم، لطالما أوصاك الطبيب بفعل ذلك. هذا العلاج هو علاج طويل الأمد، ومن الجائز أن يستمر لأشهر أو سنوات. يقوم الطبيب بمتابعة حالتك بشكل دائم من أجل التأكد من أن العلاج يؤثر عليك بالشكل المطلوب (انظر أيضًا البند 2 "الفحوصات والمتابعة"). إذا توفرت لديك أسئلة بخصوص فترة العلاج، راجع الطبيب.

متى يجب تناول ديفيراسيروكس تارو؟

- يجب تناول ديفيراسيروكس تارو مرة في اليوم، كل يوم، بنفس الوقت تقريبًا.
 - يجب تناول الأقراص على معدة خاوية.
 - من ثم يجب الانتظار على الأقل 30 دقيقة قبل تناول أي طعام.
- إن تناول ديفيراسيروكس تارو في نفس الوقت كل يوم سوف يساعدك على تذكر متى عليك تناول الأقراص.

كيفية تناول ديفيراسيروكس تارو؟

يجب إدخال القرص/الأقراص داخل كأس من الماء، عصير التفاح أو عصير البرتقال (200-100 مل).



يجب الخلط حتى ذوبان القرص/الأقراص بشكل تام. السائل في الكأس يبدو عكرًا.



يجب شرب كامل محتوى الكأس، ومن ثم يجب إضافة القليل من الماء أو العصير على ما تبقى في الكأس، خلط وشرب ذلك أيضًا.



يُمنع إذابة الأقراص في مشروبات فوارة أو في الحليب.
يُمنع مضغ، كسر أو سحق الأقراص.
يُمنع بلع الأقراص بشكلها الكامل.

يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي، بخصوص أي سؤال يتعلق بكيفية عمل ديفيراسيروكس تارو أو لماذا وصف من أجلك.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل أو شخص آخر بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك. من الجائز أن يحتاج الأمر علاج طبي طارئ.
قد تقاسي من أعراض مثل ألم في البطن، إسهال، غثيان وتقيؤ ومشاكل في الكلى أو في الكبد التي يمكن أن تكون جديدة.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، تناول الجرعة الدوائية لحظة تذكرك في نفس اليوم. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الاعتيادي.
يُمنع تناول جرعة دوائية مضاعفة في اليوم التالي للتعويض عن القرص/الأقراص المنسية/المنسية.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.
حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

يُمنع التوقف عن العلاج بديفيراسيروكس تارو بدون تعليمات صريحة من الطبيب. إذا توقفت عن تناول ديفيراسيروكس تارو، فإن فائض الحديد لن يطرح من جسمك بعد ذلك (انظر أيضًا أعلاه "فترة العلاج").

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ديفيراسيروكس تارو أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها. غالبية الأعراض الجانبية هي بسيطة حتى معتدلة وعادة تزول بعد عدة أيام حتى عدة أسابيع من العلاج.

أعراض جانبية معينة من شأنها أن تكون خطيرة وتتطلب علاجًا طبيًا فوريًا. الأعراض الجانبية هذه هي غير شائعة (قد تؤثر على حتى متعالج واحد من كل 100 متعالج) أو نادرة (قد تؤثر على حتى متعالج واحد من كل 1,000 متعالج).

يجب التوقف عن تناول الدواء والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا انطبقت عليك أو على طفلك إحدى الحالات التالية:

- طفح شديد أو صعوبات في التنفس ودوار أو انتفاخ خاصة للوجه والحنجرة (علامات لرد فعل تحسسي شديد)
- مزيج من أي من الأعراض التالية: طفح، احمرار الجلد، حويصلات في الشفتين، العينين أو الفم، تقشر الجلد، سخونة مرتفعة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تضخم الغدد الليمفاوية (علامات لرد فعل جلدي شديد)
- انخفاض حاد في التبول (علامة لمشكلة في الكلى)
- مزيج من النعاس، ألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن، اصفرار أو زيادة اصفرار الجلد أو العينين وبول داكن (علامات لمشاكل في الكبد)
- صعوبة التفكير، تذكر المعلومات أو حل المسائل، قلة اليقظة أو الإدراك، أو ميل للنوم يترافق بقلة الحيوية (علامات لارتفاع مستوى الأمونيا في الدم، الذي من شأنه أن يكون مرتبطًا بمشاكل في الكبد أو الكلى وأن يؤدي إلى تغير في وظيفة الدماغ)
- تقيؤ دموي و/أو براز أسود
- آلام متكررة في البطن، خاصة بعد الطعام أو تناول ديفيراسيروكس تارو
- حرقان متكرر
- فقدان الرؤية بشكل جزئي
- ألم شديد في أعلى البطن (التهاب البنكرياس)

أعراض جانبية معينة من شأنها أن تصبح جدية. الأعراض الجانبية هذه هي غير شائعة.

يجب مراجعة الطبيب بأسرع وقت ممكن إذا:

- كنت تعاني من تشوش أو ضبابية في الرؤية
- كنت تعاني من ضعف في السمع

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جدًا – أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة

- فحوصات غير سليمة ذات علاقة بالأداء الوظيفي للكلىة

أعراض جانبية شائعة – أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من عشرة

- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل غثيان، تقيؤ، إسهال، ألم في البطن، نفخة، إمساك، صعوبات في الهضم
 - طفح
 - صداع
 - فحوص غير سليمة ذات علاقة بالأداء الوظيفي للكبد
 - حكة
 - فحوص بول غير سليمة (بروتين في البول)
- إذا أثرت عليك إحدى الأعراض المذكورة أعلاه بشكل شديد بلغ الطبيب.

أعراض جانبية غير شائعة – أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100

- دوار
 - سخونة
 - ألم في الحنجرة
 - انتفاخ في الذراعين أو الرجلين
 - تغير في لون الجلد
 - قلق
 - اضطرابات في النوم
 - إرهاق
- إذا أثرت عليك إحدى الأعراض المذكورة أعلاه بشكل شديد بلِّغ الطبيب.

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يتم تحديدها تواترها بعد)

- انخفاض في عدد خلايا الدم التي تشترك في تخثر الدم (thrombocytopenia)، في عدد خلايا الدم الحمراء (تفاقم فقر الدم)، في عدد خلايا الدم البيضاء (neutropenia) أو في عدد كافة أنواع خلايا الدم (pancytopenia)
- تساقط الشعر
- حصى في الكلى
- انخفاض في إنتاج البول
- تمزق في المعدة أو جدار الأمعاء مما قد يسبب ألماً وغيثياً
- ألم شديد في الجزء العلوي من البطن (التهاب البنكرياس)
- مستوى شاذ من الحمض في الدم

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جارية علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. شروط التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة تحت الـ 25°C. مدة الصلاحية بعد فتح عبوة القناني: 30 يوماً. يُمنع استعمال علبة معطوبة، أو ذات علامات تدل على وجود عطب. يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. اسأل الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إنّ هذه الإجراءات ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعالة أيضاً على:

lactose monohydrate, crosopvidone, microcrystalline cellulose, povidone, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, sodium lauryl sulphate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

ديفيراسيروكس تارو أقراص ذوابة معبأة في قناني تحتوي على 30 أو 60 قرصاً أو في عبوة شريط (بليستر) تحتوي على 30 قرصاً. القنينة صعبة للفتح من قبل الأطفال. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات. أقراص ديفيراسيروكس تارو 125 ملغ، 250 ملغ و-500 ملغ هي بلون أبيض- كريمي، مستديرة ومسطحة ذات حواف مائلة ومطبوع عليها "568"، "569" و"570" على التوالي على جانب واحد.

صاحب التسجيل وعنوانه: تارو إنترناشيونال م.ض، شارع هكيتور 14، خليج حيفا 2624761.

اسم المنتج وعنوانه:

Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Dadra and Nagar Haveli, India

تم تحريرها في كانون الأول 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ديفيراسيروكس تارو 125 ملغ: 171 09 36122

ديفيراسيروكس تارو 250 ملغ: 171 10 36123

ديفيراسيروكس تارو 500 ملغ: 171 11 36124

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.