

**עלון לצרcn לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"ז - 1986**  
**התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד**

צפוסיה® 0.23 מ"ג

צפוסיה® 0.46 מ"ג

צפוסיה® 0.92 מ"ג

חומר פעיל וממותנו:

צפוסיה® 0.23 מ"ג: כל כמוסה מכילה 0.23 מ"ג אוזנימוד (ozanimod) (כהידרוכלוריד)

צפוסיה® 0.46 מ"ג: כל כמוסה מכילה 0.46 מ"ג אוזנימוד (ozanimod) (כהידרוכלוריד)

צפוסיה® 0.92 מ"ג: כל כמוסה מכילה 0.92 מ"ג אוזנימוד (ozanimod) (כהידרוכלוריד)

חומרים בלתי פעילים - ראה פרק 6 "מידע נוסף" ופרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העلون עד סוף בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורי. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעalon, לתקшир צפוסיה קיימים **חוברת מידע בטיחותי למטופל / למטפל וכן כרטיס תזכורת בנושא הירין**. החוברת והכרטיסים מכילים מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בצפוסיה ולפער על פיהם. יש לעיין בחוברת המידע הבטיחותי למטופל / למטפל, בכרטיס התזכורת בנושא הירין ובעalon לצורך בטרם תחילת השימוש בתקشير. ש לשמרו את החוברת והכרטיסים לעיון נוסף במידת הצורך.

**1. למה מיועדת התרופה?**

- צפוסיה מותווית לטיפול במטופלים מבוגרים עם טרשת נפוצה התקפית-הפגתית עם מחלת פעילה כפי שהוגדרה על ידי מאפיינים קליניים או באמצעות הדמיה.
- צפוסיה מותווית לטיפול מבוגרים עם קוליטיס עם דלקת כיבית של המעי הגס) פעילה, ביןונית עד חמורה.

**קבוצה רפואייתית: מדכאי מערכת חיסון סלקטיביים**

צפוסיה מכילה את החומר הפעיל אוזנימוד (ozanimod) השיר לקבוצת תרופות שיכולה להפחית את מספר תאי הדם הלבנים (לימפוציטים) הזריםים בחופשיות בגוף.

**טרשת נפוצה**

- טרשת נפוצה היא מחלת שבת מערכת החיסון (האגנות של הגוף, כולל תאי הדם הלבנים) תוקפת בעוטות את הציפוי המגן סביב העצבים במוח ובחוט השדרה. הדבר מונע מהעצבים לתפקד באופן תקין ועלול לגרום לתסמינים כגון נימול, קושי בהליכה, ובעיות בראייה ובישוי המשקל.

- בטרשת נפוצה התקפית-הפגתית, לאחר התקפה על תא' העצב מגיעות תקופות של הפגה. התסמינים עשויים להיעלם במהלך התקופות ההפגה, אך חלק מהביעות עלולות להישאר.

זפוזיה מס'יעת להגן מפני התקופות של מערכת החיסון על תא' העצב, על ידי עצירת תא' דם לבנים מסוימים מלהגיע למוח ולחוט השדרה, שם הם עלולים לגרום לדלקת ונזק לציפוי המגן על העצבים.

#### קוליטיס כיבית (ulcerative colitis)

- קוליטיס כיבית היא מחלת דלקטיבית של המעי.

זפוזיה מס'יעת בהפחחת הדלקת בקוליטיס כיבית על ידי עצירת תא' דם לבנים מסוימים מלהגיע לרירית המעי.

## 2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאזנימוד או לכל אחד מהמרכיבים האחרים שמכילה התרופה (כמפורט בפרק 6)
- הרופא אמר לך שמערכת החיסון שלך מוחלשת באופן חמור
- היה לך התקף לב, תעוקת חזזה, שbez מוחי או מיני-שבץ (התתקף איסכמי חולף – AIT), או סוגים מסוימים של אי-ספיקת לב חמורה ב-6 החודשים האחרונים
- יש לך או שהוא לך בעבר סוגים מסוימים של קצב לב לא סדיר או לא-תקין (הפרעת קצב לב) – הרופא יבדוק אתLIBך לפני תחילת הטיפול
- יש לך זיהום חמור כמו דלקת כבד (הפטיטיס) או שחפת
- יש לך סרטן
- יש לך בעיות כבד חמורות
- את בהריון או יכולת להרות ואין משתמש באמצעי מניעה ייעילים

### ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בזפוזיה, ספר לרופא אם:

- יש לך קצב לב איטי או שאתה נוטל או שנטלת לאחרונה תרופות שמאטות את קצב הלב (כגון חוסמי בטא או חוסמי תעולות סיון);
- אתה סובל מבעיות נשימה חמורות בזמן השינה (דום נשימה בשינה בדרגה חמורה) שאין מטופלות;
- יש לך בעיות בכבד;
- יש לך זיהום;
- יש לך רמות נמוכות של תא' דם לבנים מסווג הנקרא למפוציטים;
- מעולם לא חlift או שאיןך בטוח אם חlift באבעבועות רוח;
- חסונת לאחרונה או שאתה מתכוון להתחנן;
- אתה או אחרים מבחינים בהחמרה של תסמי הטרשת הנפוצה שלך, כמו גם כל תסמים חדשים או בלתי מוכרים. אלה יכולים להיגרם מזמן מדייר במוח הנקרא לויוקאנצפלופתיה רב-מוקדית מתקדמת (PML);
- היו לך בעבר בעיות בריאות או תסמיינים אחרים של הצטברות נזלים בחלק המרכזי של הרשתית הנקרא מקולה (מצב הנקרא בצתת מקולרית);

- יש לך דלקת של העין (דלקת הענבה (אובאיטיס));
- יש לך סוכרת (שיכולה לגרום לביעות בעיניים);
- יש לך מחלת ריאות חמורה (לייפט (פיברוזיס) ריאתית או מחלת ריאות חסימתית כרונית).

במהלך הטיפול בזפוזיה, אם אתה מפתח בחילות לא מוסברות, הקאות, כאבים בצד ימין של אזור הבطن (כאב בטן), עייפות, איבוד תיאבון, הצהבהה של העור או של החלק הלבן בעיניים (צחבת) ו/או שתחן בצלב כהה, דבר עם הרופא מיד. אלו עלולים להיות סימנים לפגיעה בכבד. לפניהם, במהלך ואחריו הטיפול, הרופא יבקש לבצע בדיקות דם לצורך ניטור תפקודו כבד. אם תוצאות הבדיקות יצביעו על פגיעה בכבד יתכן שהטיפול בזפוזיה יופסק.

בזמן שאתה נוטל זפוזיה (ולמשך עד 3 חודשים לאחר שתפסיק ליטול אותה), אתה עלול ללקות בziehominim בקלות רבה יותר. כל ziehomom שכבר יש לך עלול להחמיר. דבר עם הרופא אם מתפתח אצלך ziehomom.

במהלך הטיפול בזפוזיה, אם אתה מפתח הפרעה בראשית, חולשה מתגברת, התנהגות מגושמת, אובדן זיכרון או בלבול, או אם יש לך טרשת נפוצה ואתה חושב שהמחלה שלך מתקדמת ומחמירה, פנה מיד לרופא שלך. תסמינים אלו עשויים לנבוע מלוקואנוצפלופתיה רב-מיינית מתקדמת (PML), ziehomom מוחי נדי רעלול להוביל לנכות חמורה או למות.

במהלך הטיפול בזפוזיה, אם אתה מפתח כאב ראש חמוץ, תחושת בלבול, או שיש לך התקפים (פרכוסים) ואיבוד ראייה, דבר עם הרופא מיד. תסמינים אלה עלולים להיגרם מתסמנות הנקראית תסמונת אנטפלופתיה האחראית הפיכה (PRES).

אחר שזפוזיה עלולה להגביר את הסיכון לסרטן העור, עליך להגביל את חשיפתך לאור שמש ולאור UV (אולטרה-סגול), על ידי לבישת ביגוד מגן ושימוש קבוע במסנן קרינה (המכיל מקדם הגנה גבוהה מהמשמש).

#### נשים היוכלות להרות

אם נעשה שימוש במהלך הירון, זפוזיה עלולה לגרום נזק לעובר. לפני שתתחליל את הטיפול בזפוזיה, הרופא יסביר לך את הסיכון ויבקש ממך לעבור בדיקת הירון כדי לוודא שאין בהירון. הרופא ייתן לך חוברת מידע בייחומי וכרטיס תזכורת למטפלת בנושא הירון שמסבירים מדוע עליך להימנע מהירון כאשר את נוטלת זפוזיה. החוברת והכרטיס גם מסבירים מה عليك לעשות על מנת להימנע מהירון לאחר נטילת זפוזיה. עליך להשתמש באמצעים יעילים למניעת הירון במהלך הטיפול ולמשך 3 חודשים לאחר הפסקת הטיפול (ראי בסעיף "הירון, הנקה ופוריות").

אם אחד מ אלה חל עלייך, ספר לרופא או לרוקח לפני נטילת זפוזיה.

#### **בדיקות ומעקב**

- לפני שתתחליל לחתת זפוזיה, הרופא יבדוק לך את הלב באמצעות אלקטרוקראדיוגרム (א.ק.ג.). אם יש לך בעיות מסוימות בלב, הרופא ינטר אותך לפחות במשך 6 שעות הראשונות לאחר נטילת המנה הראשונה של המרופה.
- לאחר שזפוזיה יכולה להעלות את לחץ הדם, יתכן שהרופא ירצה לבדוק את לחץ הדם שלך באופן קבוע.

- לפני שתתחל ללקחת זפוזיה, הרופא יבדוק את תפקודו ה cerebral שלך. בדיקות דם לצורכי ניטור תפקודו כבד צרכיות להיעשות בחודש הראשון, השלישי, השישי והשנים-עשר לניטילת זפוזיה, ולאחר מכן על בסיס תקופתי.
- אם יש לך סוכרת, דלקת של העין (דלקת הענבייה (אובייטיס)) או מחלת רשתית בהווה או בעבר, יתכן והרופא יפנה אותך לבדיקת עיניים לפני שתתחל ללקחת זפוזיה או במהלך הטיפול.
- הרופא עשוי להורות על בדיקת דם כדי לבדוק את רמת תאי הדם לפני שתתחל לניטילת זפוזיה ולאחר מכן להורות על בדיקות תקופתיות.

### **החומרת הטרשת הנפוצה לאחר הפסקת הטיפול בזפוזיה**

ספר לרופא מיד אם אתה סבור שהלה החמורה בטרשת הנפוצה לאחר שהפסקת את הטיפול בזפוזיה (ראה "אם אתה מספיק ליטול זפוזיה" בפרק 3).

### **ילדים ומתבגרים**

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18. זאת מפני שזפוזיה לא נחקרה בילדים ובמתבגרים.

### **אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות:**

אם אתה לוקח, אם לך תרופה אחרת, או שאתה עלול ללקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופך. זאת מפני שזפוזיה יכולה להשפיע על אופן פעולתן של תרופות אחרות. כמו כן, תרופות אחרות יכולות להשפיע על אופן פעולתה של זפוזיה.

במיוחד, לפני שתיקח זפוזיה, ספר לרופא או לרופך אם אתה לוקח או לך תרופה אחרת מהתרופות הבאות:

- תרופות שמಡאות או מוויסות את מערכת החיסון (למשל ציקלוסופרין)
- תרופות המשמשות לטיפול בטרשת נפוצה, כמו אלטוזומאב, בטא אינטראפון, דימטיל פומראט, גליירמר אצטט, מיטוקסנטרואן, נטיזומאב או טרייפלונומיד
- תרופות המשמשות לטיפול בקוליטיס כיבית, כמו אזאתייפרין – 6-מרקפטופורין
- גמfibrozיל להפחחת רמות שומנים או כולסטרול בدم
- קלופידוגרל, תרופה המשמשת למניעת קרייסי דם
- ריפאמפיצין, אנטיבiotיקה לטיפול בשחפת ובזיהומיים רציניים אחרים
- תרופות הנקראות מעכבי מונואמין אוקסידץ לטיפול בדיכאון (למשל פנלוין) או במחלת פרקינסון (למשל סלגיילין)
- תרופות שמאטות את קצב הלב (כמו חוסמי בטא או חוסמי תעילות סידן)
- סוגים מסוימים של חיסונים. יש להימנע מחיסונים חיים מוחלשים במהלך הטיפול ולמשך 3 חודשים אחרים.

### **שימוש בתרופה ומדוזן**

ניתן ליטול את הכמוסה עם אוכל או בלי אוכל.

### **הירין, הנקה ופוריות**

אם את בהירין או מיניקה, חושבת שאת אול' בהירין או מתכנת להרות, היועצי ברופא לפני נטילת תרופה זו.

#### הירין

אין להשתמש בזפוזיה במהלך ההירין, אם את מסנה להרות, או שת אישה שיכולה להרות ואין משתמש באמצעות מנעה ייעלים. אם נעשה שימוש בזפוזיה במהלך הירין, קיימ סיכון לנזק לעובר. אם את אישה שיכולה להרות, הרופא יידע אותך לגבי סיכון זה לפני שתתחליל טיפול בזפוזיה ויבקש מוך לעבר בדיקת הירין כדי לוודא שאין בהירין. עליך להשתמש באמצעות מנעה ייעלים בזמן נטילת זפוזיה ולמשך לפחות 3 חודשים לאחר שתפסיך ליטול אותה. שאל את הרופא על שיטות אמינות למיניעת הירין.

הרופא יתן לך חוברת מידע בטיחותי וכרטיס תזכורת למטופלת בנושא הירין שמסבירים למה עלייך להימנע מהירין כאשר את נוטלת זפוזיה.

אם תחרי בזמן שת אוטלת זפוזיה, ספרי לרופא מיד. הרופא יחליט להפסיק את הטיפול (ראי סעיף "אם אתה מפסיק ליטול זפוזיה" בפרק 3). יבוצע מעקב הירין מיוחד.

#### הנקה

עליך לא להניך כאשר את נוטלת זפוזיה. זפוזיה יכולה לעבור לחלב אם וקיים סיכון של תופעות לוואי רציניות עברו התינוק.

#### פוריות

לא קיים מידע על השפעת התרופה על פוריות בבני אדם.

#### נהיגה ושימוש במכונאות

לזפוזיה אין השפעה או שהשפעתה>Zנינחה על יכולת הנהוג ולהפעיל מכונות.

#### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

##### תכלול נתן

תרופה זאת מכילה פחות מ – 1 מילימול (23 מ"ג) נתן למנה, ונחשבת "נטולת נתן".

#### 3. כיצד השתמש בתרופה

יש להשתמש בתכשיר תמייד בהתאם להרות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

#### המינון המקורי בדרך כלל הוא:

כאשר תתחילה ליטול זפוזיה לראשונה, עליך לקחת מינון נמוך ולהעלות אותו בהדרגה, כדי להפחית כל השפעה של האטת קצב הלב.

- תקבל 'אריזת התחלת טיפול' כדי לעזור לך להתחיל את הטיפול בדרך זו. היא מכילה:
  - 4 כמוסות בצע אפור בהיר, המכילות 0.23 מ"ג אוזניות. יש ליטול כמוסה אחת פעמי יום, בימים 1 עד 4.

- 3 כמוסות בצבע אפור בהיר וכתום, המכילות 0.46 מ"ג אוזניום. יש ליטול כמוסה אחת פעמי ביום, ביום 5, 6 ו-7.
- ביום 8 ואחריו, מרגע שישימת את 'אריזת התחלת הטיפול', תעבור ל'אריזת טיפול אחיזתי' עם כמוסות כתומות, שכל אחת מהן מכילה את המנה המומלצת של 0.92 מ"ג אוזניום. עליר להמשיך טיפול קבוע עם כמוסה אחת של 0.92 מ"ג פעמי אחת ביום. אם יש לך בעיות כבד כרוניות בדרגה קלה או בינונית, יתכן שהרופא יצטרך להפחית את מנתה "הахזקה" שלאقل לכמוסה אחת של 0.92 מ"ג פעם ביוםים.

**אין לעبور על המנה המומלצת.**

#### **צורת נטילה**

- צפוסיה מיועדת לנטילה דרך הפה.
- בלע את הכמוסה בשלמותה. אין מידע לגבי פתיחה ופיזור תכולת הכמוסה.
- ניתן ליטול את הכמוסה עם אוכל או בליל אוכל.

**אם נטלת בטיעות מינון גבואה יותר,** או אם בטיעות בעליל מן התוropa, דבר מיד עם רופא או פנה מיד לבית חולים. קח איתך את אריזת התוropa ועלון זה.

- **אם שכחת ליטול את התוropa,** קח אותה ברגע שתזיכר. אולם, אם שכחת את המנה במשך ים שלם, דגל על המנה ששכחת וקח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה נשכחה.
- אם שכחת מנה אחת או יותר במהלך 14 הימים הראשונים מתחילה הטיפול בцеposיה, דבר עם הרופא כיצד להתחיל מחדש את הטיפול. יש להתמיד הטיפול כפי שהוא ממליץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתוropa ללא התייעצות עם הרופא.

#### **אם אתה מפסיק ליטול צפוסיה**

- אל תפסיק ליטול צפוסיה מבלי שדיברת תחילת עם הרופא שלך.
- דבר עם הרופא שלך כיצד להתחיל מחדש את הטיפול אם הפסיקת ליטול צפוסיה:
  - למושך ים אחד או יותר במהלך 14 ימי הטיפול הראשונים
  - למושך יותר מ-7 ימים רצופים בין היום ה-15 והיום ה-28 לטיפול.
  - למושך יותר מ-14 ימים רצופים אחרי היום ה-28 לטיפול.
 יהיה עליך להתחיל את השימוש ב- 'אריזת התחלת הטיפול' שוב.

צפוסיה תישאר בגוףך עד למושך 3 חודשים לאחר שתפסיק ליטול אותה. ספירת תאי הדם הלבנים (ספרת לימפוציטים) עשויה גם היא להישאר נמוכה במהלך זמן זה ותופעות הלואאי המתוארות בעلون זה עדין עשויות להתרחש (ראה בפרק 4 "תופעות לווא").

ספר לרופא מיד אם אתה חושב שחללה החמרה בטרשת הנפוצה לאחר שהפסיקת את הטיפול בцеposיה.

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות נוספות בנוגע לשימוש בתוropa, הייעוץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרפיה Zusosia עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול אף אחת מהן.

##### תופעות לוואי רציניות

ספר לרופא או לרוקח מיד אם הבחנת באחת מתופעות הלואן הרציניות הבאות:

##### • **תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שמופיעות ב – 1-10 1 משתמשים מתוך 100:**

- קצב לב איטי
- זיהום בדרכי השתן
- עלייה בלחץ הדם

##### • **תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) תופעות שמופיעות ב – 1-10 1 משתמשים מתוך 1,000:**

- תגובה אלרגית – הסימנים יכולים לכלול פריחה

##### • **תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שמופיעות ב – 1-10 1 משתמשים מתוך 10,000:**

- זיהום במוח הנקריא לויקואנצפלופתיה רב-מוקדית מתקדמת (PML) (ראה פרק 2)

##### תופעות לוואי אחרות

ספר לרופא או לרוקח מיד אם הבחנת באחת מתופעות הלואן הבאות:

##### • **תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה:**

- זיהומים של האף או הנחיריים, חלול האף, הפה, הגרון (לוע), או בית הקול (לרינקס) הנגרמים מנגיפים

- רמה נמוכה של תא דם לבנים מסווג הנקריא למופוציטים

##### • **תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שמופיעות ב – 1-10 1 משתמשים מתוך 100:**

- דלקת של הגרון (דלקת הלוע (פרינגיטיס))

- זיהום נשימתי (סימן של זיהום ריאות)

- הרפס צוستر (שלבקת חוגרת)

- הרפס סימפלקס או פצעי קור (הרפס של הפה)

- כאב ראש

- נפילה בלחץ הדם

- נפיחות בעיקר של הקרטולאים וכפות הרגליים, עקב אצירת נזלים (בצקת היקפית)

##### • **עליה ברמות של אנזימי כבד בבדיקה דם (סימן של בעיות בכבד) או פיגמנטציה צהובה של העור, רקמות ריריות או העיניים (צבתת)**

- הפרעות בריאות שיכולות לגרום לקוצר נשימה

##### • **תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) תופעות שמופיעות ב – 1-10 1 משתמשים מתוך 1,000:**

- ראייה מטוושתת (בצקת מקולרית)

אם הופעה תופעת לואן, אם אחת מתופעות הלואן חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לואן  
שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.  
ניתן לדוח על תופעות לואן למשרד הבריאות באמצעות חיציה על הקישור "דיווח על תופעות לואן  
על בוטיק רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה  
לטופס המקoon לדיווח על תופעות לואן, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ידיים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי המגשית ואירועת הקרטון. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל 25°C.
- אין להשתמש בתרופה זו אם הבדיקה בנזק כלשהו או בסימנים של חבלה באזורה.
- אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתי. התיעץ עם הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאין משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

## 6. מידע נוספת

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

### - תכליות הרכומוסה:

Microcrystalline cellulose 112 or XLM 90, Microcrystalline cellulose 105,  
croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate.

### - מעטפת הרכומוסה:

- כל כמותה של 0.23 מ"ג מכילה:

Gelatin, titanium dioxide (E171), black iron oxide (E172), yellow iron  
oxide (E172), red iron oxide (E172).

- כל כמותה של 0.46 מ"ג מכילה:

Gelatin, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), black iron  
oxide (E172), red iron oxide (E172).

- כל כמותה של 0.92 מ"ג מכילה:

Gelatin, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), red iron oxide  
(E172).

### - דף הדרישה:

Shellac, dehydrated alcohol, black iron oxide, purified water, propylene  
glycol, strong ammonia solution, isopropyl alcohol, butyl alcohol,  
potassium hydroxide

## כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזורה

- זפוזיה 0.23 מ"ג כמוסה קשה, היא בעלת ראש כמוסה וגוף כמוסה אטומים בצבע אפור בהיר, על ראש הכמוסה מודפס "OZA" ועל גוף הכמוסה מודפס "0.23 mg" בדיו שחור.
- זפוזיה 0.46 מ"ג כמוסה קשה, היא בעלת ראש כמוסה אטום כתום וגוף כמוסה אטום בצבע אפור בהיר, על ראש הכמוסה מודפס "OZA" ועל גוף הכמוסה מודפס "0.46 mg" בדיו שחור.
- זפוזיה 0.92 מ"ג כמוסה קשה, היא בעלת ראש כמוסה וגוף כמוסה אטומים בצבע כתום, על ראש הכמוסה מודפס "OZA" ועל גוף הכמוסה מודפס "0.92 mg" בדיו שחור.

**גודלי האrizות**

- אריזת התחלת טיפול היא 'אריזת ארנק' המכילה 7 כמוסות: 4 כמוסות של 0.23 מ"ג ו - 3 כמוסות של 0.46 מ"ג.
- אריזת הטיפול האחזקתי מכילה 28 כמוסות של 0.92 מ"ג.

**בעל הרישום וכתובתו**

בריסטול-מאיירס סקויב (ישראל) בע"מ,  
רחוב אהרון ברט 18 ת.ד. 3361,  
קריית אריה,  
פתח תקווה

**יצור וכתובתו**

Celgene Corporation  
86 Morris Ave,  
Summit, NJ, 07901, USA

נערך במאי 2024

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

זפוזיה<sup>®</sup> 0.23 מ"ג: 167-33-36599  
זפוזיה<sup>®</sup> 0.46 מ"ג: 167-34-36600  
זפוזיה<sup>®</sup> 0.92 מ"ג: 167-35-36601

לשם הפשטות ולהקלת הקרייה, עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.