

أوماكور كبسولات لينة

المواد الفعالة:

تحتوي كل كبسولة على:

حامض أوميغا-3 - إتيل إستر 90 ملغم 9000 (ethyl esters 90,000) مليغرام، الذي يحتوي على

إجمالي محتوى حامض أوميغا-3 - إتيل إستر 460 ملغم EPA 380 ملغم DHA إتيل إستر.

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر - أنظر

الفقرة 2 تحت "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"

والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت

لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أمثل: وارفارين، نظرًا لأنك ستكون

بحاجة لإجراء فحوص دم إضافية ومن الجائز أن تكون هناك

حاجة لتعديل الجرعة الدوائية للدواء الممتع للدم.

إستعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء مع الطعام، للتقليل من خطورة ظهور

أعراض جانبية في الجهاز الهضمي.

الحمل والإرضاع

لا يجوز إستعمال الدواء أثناء فترة الحمل أو الإرضاع، إلا إذا قرر الطبيب بأن العلاج ضروري. إذا كنت حاملاً أو مرضعة يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء.

الإستعمال لدى المسنين

يستعمل أوماكور بحذر إذا تجاوزت عمر 70 سنة.

السيادة وإستعمال الماكنت

من غير المتوقع أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على السيادة أو تشغيل ماكنت خطيرة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي أوماكور على الصويا. إذا وجدت لديك حساسية للفول السوداني أو لالصويا، فلا تستعمل أوماكور.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الاستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية الإعتيادية ككلاج ثانوي وقائي بعد إحتشاء عضلة القلب هي عادة كبسولة واحدة للب يوم.

الجرعة الدوائية الإعتيادية لعلاج حالة ارتفاع نسب الشحوم الثلاثية في الدم هي عادة كبسولتين إثننتين للب يوم (من الجائز أن يرفع الطبيب الجرعة الدوائية حتى أربع كبسولات في اليوم إذا لم يتم تحقيق إستجابة مرجوة).

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة التناول

يجب بلع الدواء مع الماء.

يجب تناول الدواء مع الطعام، للتقليل من خطورة ظهور

أعراض جانبية في الجهاز الهضمي.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (أميرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. أنظر الفقرة 6: "معلومات إضافية".

• كنت حساساً للفول السوداني أو لالصويا. يحتوي أوماكور على زيت الصويا.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـأوماكور، إحكام للطبيب أو للصيدلي إذا:

• من المتوقع أن تجتاز عملية جراحية أو إجترت مؤخرًا عملية جراحية

• إجترت صدمة مؤخرًا

• لديك مشكلة في الكلية

• لديك سكري غير متوازن

• لديك مشكل في الكبد. يراقب الطبيب تأثير أوماكور على كبدك بواسطة فحوص الدم

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أعلى مما تحتاج، فلا تقلق لأنه من المرجح بأنك لست بحاجة لعلاج معن. مع ذلك، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي لإستشارة إضافية.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب تناول الجرعة الدوائية التالية، فإذا تذكرت قريباً لوقت تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.

لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة الدوائية المناسبة.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ حسن على حالة الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفر لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أو ماكور قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية.

من الجائز لا تعاني أي منها.

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى

1-10 مستعملين من بين 100:

- مشكل في البطن مثل: إنتفاخ البطن، آلام، إمساك، إسهالات.
- مشاكل في الهضم (سر الهضم)، غازات، تبشو، حرقان، غثيان وقيءات

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض

ظهور لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- نسب مرتفعة من السكر في الدم

(gout)

- دوار

- مشاكل في حاسة التذوق

- صداع

- ضغط دم منخفض

- رعاف

- ظهور دم في البراز

- طفح

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض التي تظهر لدى

1-10 مستعملين من بين 10,000:

- ردود فعل تحسسية

- شرى (طفح يتجلب بظهور آفات حمراء، بارزة وحادة)

- إضطرابات في الكبد، مع إمكانية حصول تغيرات في نتائج

- فحوص دم معينة

أعراض جانبية شيعتها غير معروفة (أعراض شيوها

لم يحدد بعد):

• حكة

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب القيء بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر علبة الكرتون والملاصقة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- التخزين دون 25 درجة مئوية.
- لا يجوز التجفيم.
- بعد الفتح للمرة الأولى بالإمكان إستعمال المستحضر حتى تاريخ إنتهاء الصلاحية والتخزين دون 25 درجة مئوية.
- خرن في العلبة الأصلية.
- إذا لاحظت تغير في لون أو في مظهر الكبسولات إستشر الصيدلي.

(6) معلومات إضافية

- يحتوى الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً على: Alpha-tocopherol (as an antioxidant), Gelatin, Glycerol, Purified water, Medium-chain triglycerides, Lecithin.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
أوماكور كبسولات هي كبسولات جيلاتين لينة وشفافة تحتوي على زيت لونه مائل إلى الأصفر. يتوفّر الدواء بقناعي التي تحتوي على 28 أو 100 كبسولة. من الجائز لا تستوّق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمكانيات وعنوانه: أبوت مختبرات طبية م.ض، كريات تبيديم، ص.ب. 58099، تل أبيب 6158002.
- إسم المنتج وعنوانه: مختبرات أبوت GmbH، فرويندلي 9A هامنوفير، ألمانيا 30173، ألمانيا.
- تم إعدادها في آذار 2024.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.