



## עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### זפיקס תמייסה לשתייה

כל 1 מ"ל של תמייסה לשתייה מכיל 5 מ"ג לאמיבודין (lamivudine).  
רשימת החומרים הבלתי פיעלים ואלרגניים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".  
**קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.  
תרופה זו מיועדת למבוגרים ולילדים מעל גיל שנתיים.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

זפיקס היא תרופה המשמשת לטיפול בנגיף דלקתכבד כרונית מסוג B (HBV) במבוגרים ובילדים מעל גיל שנתיים.

- קבוצה רפואיית:** אנלוג לנוקלאוזיד המרכיב טרנסקריפטאז הופ (NRT/s).
- לא ידוע אם זפיקס בטוחה ויעילה עבור:
- אנשים עם HBV כרוני שהכבד שלהם נפגע באופן קשה ואיינו מסוגל ל��פקד כראוי (מחלהכבד לא מפוצחת)
  - אנשים עם נגיף-1-HIV, נגיף דלקתכבד מסוג C או נגיף דלקתכבד מסוג D (דلتא)
  - אנשים שעברו השתלתכבד

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

##### **אין לשימוש בתרופה אם:**

אתה רגיש (אלרגי) לאמיבודין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).

- ازהירות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה  
**לפני הטיפול בזפיקס, ספר לרופא שלך על כל המרכיבים הבריאותיים שלו, כולל אם:**
- יש לך זיהום של-1-HIV.
  - יש לך בעיות כליה.
  - יש לך סוכרת. כל מנה של 20 מ"ל (100 מ"ג) זפיקס תמייסה לשתייה מכילה 4 גרם סוכרוז.
  - את בהריון או מתכוננת להרות. לא ידוע אם זפיקס תזיק לעובר שלו.
  - את מניפה או מתכוננת להניך. זפיקס יכולה לעבור לחלב האם שלו ולהזיק לתינוק שלו.

**סיכון לעמידות של-1-HIV **באנשים עם זיהום-1-HIV לא מאובחן או באנשים עם זיהום-1-HIV לא מטופל.** אם יש לך או אם אתה לוקה בזיהום של-1-HIV (נגיף החסל החיסוני**

האנושי מסוג 1) שאינו מטופל בתרופות בעת השימוש עם זפיקס, נגיף ה-1-HIV עשוי לפתח עמידות לתרופות מסוימות ל-1-HIV וייהיה קשה יותר לטפל בו.

- הרופא שלך צריך להציג לך ייעוץ ובדיקה לאבחן זהירות של 1-HIV לפני שתתחיל טיפול, וכן במהלך הטיפול בדלקת כבד נגיפית מסוג B עם זפיקס.
- זפיקס תמיסה לשתייה מכילה منها נמוכה יותר של לא מבודין מתרופות אחרות המכילות לא מבודין ומשמשות לטיפול בזיהום של 1-HIV.

זפיקס אינה מונעת ממשך להעביר HBV לאחרים על ידי מגע מיני, שיתוף מחטים, או בעת חשיפה לדם שלך. המנגע מפעולות העשוויות להעביר את זיהום ה-HBV לאחרים.

**איןטראקטיות/תగובות בין תרופתיות**  
אם אתה לוקח או לוקח לאחרונה, **תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על קר לרוואו או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

- טרימטופרים (אנטיביוטיקה)
- תכשירים המכילים סורביטול - שימוש בו זמני בזכיקס וسورביטול עלול לגרום לירידה בחשיפה לזריקס.

תרופות מסוימות מגיבות עם זפיקס. **שמור רשיימה של התרופות שלך כדי להציג בפני הרופא או הרוקח.**

- אתה יכול לבקש מהרופא או הרוקח שלך רשיימה של תרופות המגיבות עם זפיקס.
- אל תתחיל לקחת תרופה חדשה מבלי להיוועץ ברופא. הרופא שלך יכול להגיד לך אם זה בטוח לקחת זפיקס עם תרופות אחרות.

אל תיקח זפיקס אם אתה לוקח תרופות אחרות המכילות לא מבודין או אמטրיציטאבין.

**הרינו והנקה**

- ספרי לרופא שלך אם אתה בהריון או מתכנת להרות. לא ידוע אם זפיקס תזיק לעובר שלך.
- ספרי לרופא שלך אם אתה מניקה או מתכנת להניק. זפיקס יכולה לעורר חלב האם שלך ועלולה להזיק לתינוק שלך. את והרופא שלך צריכים להחליט האם תיקחי זפיקס או תניקי.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**  
**זריקס מכילה סוכר, חומרים לשמור, פרופילן גליקול ונתרן**  
אם אתה סוכרתי, אנא שים לב שכלמנה של זפיקס ( $100 \text{ מ"ג} = 20 \text{ מ"ל}$ ) מכילה 4 גרם של סוכרוז.

זריקס מכילה סוכרוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך כי יש לך אי-סבירות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא שלך לפני נטילת זפיקס. סוכרוז יכול להזיק לשניים.

זריקס מכילה חומרים לשמור (פרההידרוקסיבנואטים) העולמים לגרום לתגובה אלרגית (תיתכן תגובה מאוחרת).

תרופה זו מכילה  $400 \text{ מ"ג}$  פרופילן גליקול בכל  $20 \text{ מ"ל}$ .  
תרופה זו מכילה  $58.8 \text{ מ"ג}$  נתרן (המרכיב העיקרי במלח בישול/שולחן) בכל  $20 \text{ מ"ל}$ . כמוות זו מהוות 2.9% מכמות צריכת הנתרן היומייה המקסימלית המומלצת למבוגרים.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

- תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.
- אין לשנות את המינון או להפסיק לקבלת זפיקס ללא התיעצות עם הרופא.
- עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

- ניתן לקחת זפיקס עם או בלי אוכל.
- חשוב להיות תחת השגחה רפואית בזמן נטילת זפיקס.
- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
- המנה המקובלת למבוגרים היא 20 מ"ל (100 מ"ג לאמיבודין) פעם ביום.
- ילדים בגילאי 2-17 שנים, הרופא שלר ירשום מינון של זפיקס בהתאם למשקל ילדר.
- המינון המקובל הוא 3 מ"ג/ק"ג משקל גוף פעם ביום, עד למаксימום של 100 מ"ג ביום.
- יתרון שהרופא שלר יקבע מינון נמוך יותר אם יש לך בעיות עם הכלויות שלך.

#### **אין לעבר על המנה המומלצת**

##### **אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר**

אם נטלה יותר מדי זפיקס או אם בטיעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא שלך או לחדר מيون של בית החולים הקרוב ביותר והבא אריזת התרופה איתך.

##### **אם שכחת ליטול את התרופה**

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש ליטול מנה מיד כשנאהרת. אין לקחת מנה כפולה או יותר ממה שהרופא שלך אמר לך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בזכרים עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תibile למקרא רשימת תופעות הלואה. יתרון ולא תסבול מאף אחת מהן.

##### **זפיקס עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, הכוללות:**

יותר מדי חומצה **לקטית** בدمך (חמצת **לקטית**). חמצת לקטית היא מצב חירום רפואי חמור העולם לגורם מוות.

פנה מיד לרופא שלך אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים אשר יכולים להיות סימנים של חמצת לקטית:

- תחושת חולשה או עייפות
- כאבי שרירים חריגים (לא רגילים)
- קשיי נשימה
- כאבי בטן עם בחילה והקאה
- תחושת קור, במיוחד באזורות וברגליים
- סחרחות
- קצב לב מהיר או לא סדר

**בעיות כבד חמורות.** בעיות כבד חמורות עלולות להתרחש באנשים הלוקחים זפיקס או תרופות דומות. במקרים מסוימים בעיות כבד חמורות אלו עלולות להוביל למוות. הכבד שלך עלול לגודל (כבד מוגדל) ואתה עלול לפתח שומן בכבד שלך (כבד שומני) כשאתה נוטל זפיקס. פנה מיד לרופא שלך אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים של בעיות כבד:

- העור שלך או החלק הלבן של עיניך הופר לצהוב (צחבת)
- שタン כהה או "בצבע תה"
- יציאות (צואה) בצבע בהיר
- חוסר תיאבון במספר ימים או יותר בחליה
- כאב או רגשות באיזור בטן ימנית עלונה סביר יותר שתחולוה חמצת לקטית או בעיות כבד חמורות אם אתה סובל מעודף משקל חמור (השמנה) או אם את אישה.

**החומרת מחלת כבד.** זיהום דלקת הכבד מסוג B שלך עשוי להחמיר לאחר הפסקת הטיפול עם זפיקס. החומרת מחלת הכבד עלולה להיות חמורה ולהוביל למותות. אם אתה מפסיק את הטיפול עם זפיקס, הרופא שלך יעקוב אחר בריאותך ויבצע בדיקות דם לבדיקת הכבד שלך במשך כמה חודשים לפחות כדי שתפסיק לחתך זפיקס.

**דלקת כבד נגיפית עמידה מסוג B (HBV).** נגיף דלקת הכבד מסוג B יכול להשנותו (לעבור מوطציה) במהלך הטיפול עם זפיקס ולהפוך לך יותר לטיפול (עמיד). אם זה קורה, מחלת הכבד שלך עלולה להחמיר ולהוביל למותות. ספר מיד לרופא שלך אם יש לך תסמינים חדשים כלשהם.

#### תופעות לוואי נוספות

##### תופעות הלואאי השכיחות ביותר של זפיקס כוללות:

- זיהומים באוזן, באף ובגרון
- כאב גרון
- שלשול
- חריגות בבדיקה דם

##### תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (ששכיחותן טרם נקבעה):

- אנמיה, תרומבווציטופניה, הגדרת טחול, הפרעות בבלוטות הלימפה
- דלקת בריריות בפה (סטומטיטיס)
- עליה ברמות גליקוז בدم
- תגובה אלרגית חמורה (אנפילקסיס), סרפדת (אורטיקרייה).
- נוירופתיה היקפית
- עוויות, רבדומיווליזיס
- צפצופים וקளות נשימה שאינם תקין
- אלופציה, פריחה, גירוד

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואאי חמירה או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא צוינה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

#### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המukan לדוחות על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לkishorot:


<https://sideeffects.health.gov.il>

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנع הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל ל-  $-25^{\circ}\text{C}$ .
- לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך חדש אחד ולא יותר מתאריך התפוגה של התכשיר. יש להשמיד חדש לאחר הפתיחה הראשונית.

## 6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:  
Sucrose, propylene glycol, sodium citrate, methyl parahydroxybenzoate (E218), citric acid, artificial strawberry flavour, artificial banana flavour, propyl parahydroxybenzoate (E216), purified water.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:  
זפיקס תמייסה לשתייה מגיעה באריזת קרטון המכילה בקבוק פוליאתילן לבן, עם מכסה הגנה לילדים. התמייסה הינה צולוה, חסרת צבע עד לצבע צהוב בהיר, בטעם תות/בננה. הבקבוק מכיל 240 מ"ל של תמייסת לאמיבודין (5 מ"ג/מ"ל). האריזה כוללת מזרק מדידה למתן דרך הפה ומתאים למזרק שיש לחבר לבקבוק לפני השימוש.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- שם היצרן: גלקסוסמיתקליין טרידיג'ינג סרביסס לימייד, דבלין, אירלנד.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 114-12-29545.
- נערך בפברואר 2024.
- לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

## כיצד למדוד את המנה ולקחת את התרופה



השתמש במזרק המדידה למטען דרך הפה המגייע באזירה כדי למדוד את המנה שלך באופן מדויק (ראה גם סעיף 3). כאשר המזרק מלא, הוא מכיל **10 מ"ל של תמיסה**.

1. הסר את עטיפת הפלסטיκ מהמזרק/מתאים.
2. הפרד בין המזרק למתאים.
3. הסר את מכסה ההגנה **AMILDIS** (A) ושמור אותו בצורה בטוחה.
- הוראות פתיחה: כדי להסיר את המכסה, יש ללחוץ מטה ולסובב שמאלה (נגד כיוון השעון) בו זמנית.
4. החזק את הבקבוק. **הכנס את המתאים בחוזקה (B)** לתוך צוואר הבקבוק, ככל האפשר.
5. **הכנס את המזרק (C)** בחוזקה לתוך המתאים.
6. הפוך את הבקבוק על פיו.
7. משורר החוצה את בוכנת המזרק (D) עד שהמזרק יוכל את החלק הראשון של המנה המלאה שלך.
8. הפוך את הבקבוק חזרה כלפי מעלה. **הסר את המזרק מהמתאים**.
9. **הכנס את המזרק לפיר**, מקם את קצה המזרק בצד הפנימי של הלחי. **לחץ את הבוכנה באיטיות פנימה** כך לאפשר זמן לבליה. **אל תלחץ חזק מדי** ותתיז את הנוזל לחלק האחורי של הגרון, אחרת אתה עלול להחנק.
10. **חוור על שלבים 5 עד 9** באותה דרך עד שתיניח את המנה שלך במלואה. לדוגמא, אם המנה שלך היא 20 מ"ל, عليك ללקחת 2 מזרקים מלאים של תרופה.
11. **הוציא את המזרק מהבקבוק ושתוף** אותו ביסודות במים נקיים. תן לו להתיבש לחЛОוטין לפני שתשתתמש בו שוב. השאר את המתאים בבקבוק.
12. **סגור את הבקבוק** היבט עם המכסה.

הוראות סגירה: יש לסגור היטב את הבקבוק עם המכסה, לסובב לכיוון ימין (בכיוון השעון) עד לסגירה מלאה.

יש להشمיד את התמיסה לשתייה חדש לאחר הפתיחה הראשונית.  
סימני מסחר הינט בבעלויות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK.  
© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

*Zef OS PT v9A*