

## עלון לצריכן לפי תהנות הרוחחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

### **אומקור**

**כמוסות רכות 1000 מ"ג**

**חומרים פעילים:**

כל כמוסה מכילה:

חומצת אומגה-3 אטיל אסטר 90 (Omega-3-acid ethyl esters 90) 1,000 מיליגרם,  
המכילה 460 מ"ג EPA אטיל אסטר ו- 380 מ"ג AHA אטיל אסטר.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 2 תחת " מידע חשוב על חלק  
מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 " מידע נוספת".

**קרוא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורי. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרופאי דומה.

### **1. למה מיועדת התרופה?**

لتreatment במצב של רמות גבוהות של טריגליקידים בدم, כטוספת לדיאטה, כאשר דיאטה לבדה אינה מספקת.

**קבוצה Terapeutic:** חוותות שומן בלתי-רוויות מסווג אומגה 3.

**אומקור שיר לקבוצת תרופות להורדת כולסטרול וטריגליקידים.**

### **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין לשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה. ראה סעיף 6: " מידע נוספת".
- אתה אלרגי לבוטנים או לסויה. אומקור מכיל שמן סויה.

## **ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני הטיפול באומקוֹר, ספר לרופא או לרוקח אם:**

- אתה צפי לעבר ניתוח או עברת ניתוח לאחרונה
- עברת נפצעת לאחרונה
- יש לך בעיה בכליה
- יש לך סוכרת שאינה מאוזנת
- יש לך בעיות בכבד. הרופא יפקח על השפעת אומקוֹר על הכבד שלך באמצעות בדיקות דם
- יש לך או היי לך בעבר בעיות לב
- אתה מפתח סחרחות, חולשה, תחושה של דפוקות לב (פליפיטזיות) או קוצר נשימה, אחריהם יכולים להיות סימפטומים של קצב לב לא סדיר ולעיטים מאוד מהיר (פרפור פרוזודרים)
- אתה סובל או סבלת בעבר מביעות של דימומיים או בעיות קרישא ואם הינך מטופל בתרופות נגדות קרישא.
- חולמים המקבלים טיפול בנוגדי קרישא צריכים להיות במקבב וייתכן שהייה צריך בשינוי מינון התרופה
- אתה אלרגי לדגימות

## **ילדים ומתבגרים**

אומקוֹר אינו מיועד לשימוש ילדים. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות התכשיר ילדים ומתבגרים.

## **אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות**

אם אתה לוקח, או אם לךחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כן לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות נגד קרישת דם (כגון: ארפין) כיוון שתצטרך בדיקות דם נוספת וייתכן שהייה צריך בשינוי מינון התרופה לדילול הדם.

## **שימוש בתרופה ומזון**

יש ליטול את התרופה עם אוכל, כדי להוריד את הסיכון לתופעות לוואי במערכת העיכול.

## **הירין והנקה**

אין להשתמש בתרופה בזמן הירין או הנקה, אלא אם הרופא מחליט כי הטיפול הכרחי. אם הינך בהירין או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

## **שימוש בקשישים**

השתמש באומקוֹר בצהירות אם אתה מעל לגיל 70.

## **נהיגה ושימוש במכונות**

תרופה זו אינה צפיה להשפיע על יכולתך לנוהג או להפעיל מכונות מסוכנות.

## **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

אומדור מכיל סודה. אם הינך אלרגי לבוטנים או לסודה, אל תשתמש באומדור.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין לך בעוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל בדרך כלל לטיפול במצב רמות גבוהות של טריגלייצרידים בدم הוא שתי כמוסות ביום (ייתכן

שהרופא יעלה את המינון עד לארבע כמוסות ביום אם לא הושגה תגובה רצiosa).

אין לעبور על המנה המומלצת.

## **צורת הנטילה**

יש לבלוע את התרופה עם מים.

יש ליטול את התרופה עם אוכל, בכך להוריד את הסיכון לתופעות לוואי במערכת העיכול.

אם נטילת בטיעות מינון גבוהה יותר ממה שאתה צריך, אל תדאג מאחר וסביר להניח שאין צורך בטיפול מיוחד. עם

זאת, פנה לרופא או הרוקח להתייעצות נוספת.

אם נטילת מנת יתר או אם בטיעות בלבד לצד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת

התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש קח את המנה בהקדם האפשרי. אם נזכרת בזמן הקרוב לנטילת המנה

הבא, דילג על המנה שנשכח, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. אין ליטול מנת כפולה כדי

לפצות על מנת שנשכח.

יש להתמודד לטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חיל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך  
זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש באומקור עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

**תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שטויות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100:**

- קצב לב מהיר ולא סדי
- בעיות בבטן, כגון: בטן נפוצה, כאבים, עצירות, שלישולים, בעיות עיכול (דיספסיה), גזים, גיהוק, צרבת, בחילה והקאות

**תופעות לוואי שאין שכיחות (common) תופעות שטויות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000:**

- רמות גבוהות של סוכר בدم
- שגדון (גיאוט)
- סחרחוורות
- בעיות בחוש הטעם
- כאבי ראש
- לחץ דם נמוך
- דימום מהאף
- דם בצואה
- פריחה

**תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שטויות ב- 1-10,000 משתמשים מתוך 10,000:**

- תגובה אלרגיות
- סרפה (פריחה המתבטאת בהופעה של נגעים אדומים,بولטים ומגרדים)
- הפרעות בכבד, עם אפשרות לשינויים בתוצאות של בדיקות דם מסוימות

**תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):**

- גרד

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין מחייבת, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב לטיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי אריזת הקרטון והתוויות.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסון מתחת ל- $25^{\circ}\text{C}$ .
- אין להקפיא.
- לאחר הפעילה הראשונה ניתן להשתמש בתכשיר עד לתאריך התפוגה ולאחסן מתחת ל- $25^{\circ}\text{C}$ .
- אחסון באזירה המקורית.

## **6. מידע נוסף**

- **נוסך על החומרים הפעילים בתרופה מכילה גם:**
  - **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:**
    - אומקוור כמוסות הן כמוסות ג'לטין רכות מאורכות ושקופות המכילות שמן צהבהב.
    - התרופה מגיעה בבקבוקונים המכילים 28 או 100 כמוסות.
    - יתכן שלא כל גודלי האריזה משוקחות.
  - **בעל הרישום וכותבותו:** אבוט מעבדות רפואיות בע"מ, קריית עתידים, ת.ד 58099, תל אביב 6158002.
  - **שם היצרן וכותבותו:** מעבדות אבוט ג'י אם בי אייז', פרוינדלוי 9 איי, האנובה 30173, גרמניה.
  - נערך באפריל 2024.
- **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 00-31088-24-134.
- **שם הפשטות ולהקלת הקיראה,** עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.