

نشرة المستهلك لمستحضر بيطري
يسوق الدواء تبعاً لوصفة طبيب بيطري فقط
للاستخدام لدى الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله ومفعوله:

سينكروبارت بيطري ب.م.س.ج 600 وحدة دولية

مسحوق لتحضير محلول الحقن العضلي (IM)

2. المادة الفعالة:

Serum Gonadotrophin 600 IU / Vial

3. الغرض الذي هذا الدواء مخصص له:

المساهمة في تنظيم دورة الشبق والإباضة في إناث الخراف، إناث الحملان، وإناث الماعز بعد إزالة الإسفنجة المهبليّة من نوع سينكروبارت (المحتوية على بروجسترون أسيتات).
الفصيلة العلاجية: الغونادوتروبينات

4. مواعيد الاستخدام:

ممنوع الاستخدام خلال فترة الحمل.

5. الأعراض الجانبية:

بما أنّ المادة الفعالة هي بروتين غريب بالنسبة للحيوان المعالج فإنّه يحتمل نشوء تفاعل الضدّ والمستضدّ أو ردّ الفعل التحسّسيّ في حالة نشوء الصدمة التأقيّة (نادراً ما).
بالإمكان إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية بالضغط على الرابط "الإبلاغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

[/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

6. الحيوانات المستهدفة:

إناث الخراف، إناث الحملان وإناث الماعز

7. طريقة الإعطاء وتعليمات الاستخدام والجرعة:

يجب إذابة محتوى الفئينة (الجرعة المحتوية على 600 وحدة دولية) بـ 2 مل من الماء القابل للحقن وحقن المحلول داخل العضلة.

8. طريقة استخدام المستحضر:

يجب استخدام المحلول بمجرد الإنتهاء من تحضيره وحقنه في العضلة I.M.

9. مدة الانتظار:

0 أيام (اللحم والحليب)

10. التحذيرات:

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء لعلاج الحيوان المستهدف:

يجب استخدام المحلول بعد الإذابة مباشرةً.

في حالة نشوء الصدمة التأقيّة، يجب علاج الأعراض (مثلاً، إعطاء الستيرويدات أو الأدرينالين).

تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يتقدّم العلاج بالمستحضر:

يجب توخّي الحذر لمنع الحقن الذاتي بالخطأ. في حالة إعطاء الحقن الذاتي، يجب الحصول على علاج طبّي وإبراز نشرة المستحضر الطيّ.

قد أظهرت التجارب حصول ردود الفعل المرتبطة بالعاهات الخلقية في أعقاب إعطاء المستحضر.

يجب على النساء الحوامل، أو اللواتي يخطّطن للحمل أو النساء اللواتي قد يحملن تجنّب تقديم العلاج بالمستحضر.

يجب تجنّب تماسّ المستحضر بشكل مباشر مع الجلد. في حالة التماسّ مع الجلد يجب شطف المنطقة المتأثرة بالماء والصابون.

يجب على الأشخاص ذوي الحساسية المعروفة للمادة الفعالة أو لأيّ من المواد غير الفعالة (الوارد تفصيلها في البند 13) تجنّب استخدام هذا الدواء.

الإستخدام في الحيوانات خلال فترة الحمل والإرضاع

لم يتمّ تحديد سلامة استخدام المستحضر خلال فترة الحمل فلذا ممنوع استخدامه خلال فترة الحمل.

التفاعلات الدوائية وأنواع التفاعلات الأخرى:

غير معروفة

الجرعة المفرطة:

من شأن إعطاء جرعات أعلى من تلك الموصى بها أن يؤدي إلى وضع مولودين أو ثلاثة مواليد لدى إناث الخراف والماعز.

11. تعليمات التخزين:

• امنع التسمّم! يجب الاحتفاظ بهذا الدواء وبأيّ دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن مرأى ومنتناول أيدي الأطفال و/أو الأطفال الرضع وهكذا سوف تمنع التسمّم.

• لا يجوز استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) الوارد على العلبة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر ذاته.

• **ظروف التخزين:** يجب التخزين في الثلاجة في درجة حرارة تتراوح بين 2-8 درجات مئوية. يجب حمايته من الضوء، ويجب استخدام المستحضر بعد إذابة المسحوق مباشرةً (انظر تعليمات التحضير).

يجب تخزين المستحضر بعيداً عن مرأى ومنتناول أيدي الأطفال.

12. تعليمات بخصوص إتلاف المستحضر/بقايا المستحضر عند الإنتهاء من الاستعمال:

لا يجوز رمي بقايا الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في النفايات المنزلية. استفسر الطبيب البيطري عن كيفية إتلاف بقايا الأدوية لحماية البيئة.

13. معلومات إضافية:

• يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على Mannitol.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

العلبة - صندوق واحد فيه فئينة واحدة تحتوي على مسحوق، أو صندوق واحد فيه 25 فئينة تحتوي على مسحوق.

رقم تسجيل الدواء: 080-30-91971

المصنّع: Ceva Sante Animale S.A, Libourne, France

صاحب التسجيل: شركة MIP VETERINARIA م.ض.ص.ب 10437، حيفا، 2611302

تمّ تحرير النشرة في يناير/كانون الثاني 2023 تبعاً لإرشادات وزارة الصحة