

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية (مستحضرات) 1986

يسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

ليباتور كبسولات

تحتوي كل كبسولة على: 100 ملغ سيبروفيرات

Ciprofibrate 100 mg

لاطلاع على المواد غير الفعالة ومستويات الحساسية في المستحضر - انظر البند 6 والبنود "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجلي. لا تعمله للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال الرضع والأولاد الذين سنهم دون الـ 12.

1. لأني غرض مخصص هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصص لخفض مستوى الكوليسترول والدهنيات الثلاثية (التريليبيسيريدات) في الدم في حالة عدم نجاعة حمية غذائية مخصصة.

الفصلية العلاجية: الفيبراتات.

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (لديك أوجع) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (للاطلاع على قائمة المواد غير الفعالة، انظر البند 6). تشمل علامات رد الفعل التحسسي: طفحًا جلديًا، مشاكل في البلع أو في التنفس، انتفاخًا في الشفتين، في الوجه، في الحلق وأو في اللسان.
- استعملت في الماضي سيبروفيرات (أو مواد مشابهة)، وحدث لديك رد فعل جلدي غير جيد على ضوء الشمس.
- كنت حاملًا، تخططين للحمل أو مرضعًا.
- كنت تعاني من خلل شديد في وظيفة الكلى أو الكبد.
- كنت تستعمل دواءً آخر من فصيلة الفيبراتات (مثل: كلوفيرات، بينافيرات، فينوفيرات أو جيفيفيروزيل) لعلاج مستويات الدهنيات المرتفعة في الدم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بليباتور، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من حساسية، ضعف أو آلام في العضلات.
- قد يتزايد خطر حدوث مشاكل في العضلات إذا وُجد لديك أي من عوامل الخطر التالية:
- مشاكل في الكلى أو كمية متدنية للبروتين (البومين) في الدم، كما هو الحال في اضطراب معين يؤثر على الكليتين (الملازمة الكلوية)
- مشاكل في الكبد

○ قصور الغدة الدرقية

○ استهلاك الكحول بشكل مبالغ فيه

○ كنت فوق 70 سنة من العمر

○ عانيت أنت أو عاني أحد أفراد عائلتك في الماضي من مشاكل في العضلات

○ سيوة مرضية من السُمِّيَّة للعضلات عند استعمال فيبرات آخر

الفحوص والمتابعة:

فحوص الدم

• قد يؤثر استعمال دواء يحتوي على المادة الفعالة سيبروفيرات على فحوص دم معينة. قد يجري لك الطبيب فحوص دم خلال فترة العلاج بهذا الدواء من أجل متابعة وظائف الكبد.

• إذا أجريت فحص دم خلال فترة العلاج بالدواء، فمن المهم أن تعلم (الطبيب/ الممرضة) بأنك تستعمل لبياتور.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، خاصةً إذا كنت تستعمل:

- الستاتينات - أدوية أخرى لخفض مستوى الدهنيات في الدم مثل: سيمفاستاتين، أتورفاستاتين، پرافاستاتين، فلوفاستاتين وروزوقاستاتين.
- أدوية بالإعطاء عن طريق الفم لتسريع الدم مثل وارفارين.
- أدوية بالإعطاء عن طريق الفم لعلاج السكري مثل ميتفورمين.
- أدوية تحتوي على الإستروجينات مثل حبوب منع الحمل والعلاجات الهرمونية البديلة.
- أدوية لعلاج الصداع مثل فينيتوين.
- فيبراتات أخرى

تناول كوليستيرامين أو كوليستيپول (دواء) أحران لخفض الكوليسترول) سويًا مع لبياتور قد يؤثر على فعالية لبياتور. لذلك، يجب فصل تناول هذه الأدوية عن بعضها.

استعمال الدواء والطعام:

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

خلال فترة العلاج، يجب الحد من استهلاك الكحول. شرب الكثير من الكحول قد يفاقم العرض الجانبي: آلام العضلات.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

لا يجوز استعمال لبياتور إذا كنت حاملًا، تخططين للحمل، مرضعًا أو تخططين للإرضاع.

السيبقة واستعمال الماكنتات:

يجب أن تحذر من السبقة أو تشغيل الماكنتات الخطرة أثناء استعمال الدواء، إذا كنت تعاني من دوار، غثاس وأو تعب.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي المستحضر على الماكنتوز. استشر الطبيب قبل البدء باستعمال الدواء إذا كنت تعاني من عدم تحمل سكريات معينة.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب.

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددما الطبيب فقط. الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي: كبسولة واحدة في اليوم (يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في وظيفة الكليتين أن يقللوا من وتيرة تناول الكبسولات - يجب تناول كبسولة واحدة بالتناوب كل يومين)).

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام.

يمكن فتح الكبسولة وبلع كل محتواها.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فتناولوه لحظة تذكرك، إلا إذا حان موعد تناول الجرعة القادمة. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة تعويضًا عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب، لأن مرضك قد يتفاقم.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال لبياتور إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلتق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فورًا إلى الطبيب إذا:

- ظهرت مشاكل في العضلات مثل التقلصات، الآلام أو الحساسية في العضلات. قد تؤدي هذه المشاكل إلى فشل كلوي.
- يجب التوجه إلى الطبيب بأسرع وقت ممكن إذا:
- ظهر رد فعل تحسسي. تشمل العلامات: طفحًا جلديًا (مصحوبًا بالحكة والنتوءات)، حكة وحساسية مفرطة للشمس.
- ضيق التنفس. تم الإبلاغ عن حالات معينة من التهاب الرئتين (بنيومونيتيس) أو ازدهار النسيج الضام في الرئتين (تليف رئوي).
- ظهرت مشاكل في الكبد، قد تكسب الجلد وأو ملتحمه العينين لونًا أصفر (اليرقان).
- ظهرت آلام شديدة في البطن (في أعلى البطن من الجانب الأيمن) قد تشع إلى الظهر ويصاحبها الغثيان، التقيؤات والحمى. هذا العرض قد يسببه تشنج المرارة أو الحصوات في كيس المرارة.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10.000:

• دوار، تعب، ميل إلى النوم.

أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف:

- الضعف الجنسي.
 - تساقط الشعر، صلغ.
 - ظهور الكدمات بشكل متزايد عن المعتاد، وقد ينجم عن الاضطرابات في خلايا الدم (انخفاض في صفائح الدم).
 - انخفاض في كريات الدم البيضاء. يزيد هذا العرض من خطر نشوء تلوذات.
 - صداع، مشاكل في التوازن.
 - غثيان، تقيؤات.
 - إسهال، اضطرابات في الجهاز الهضمي، آلام في البطن.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فطليكم استشارة الطبيب.

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الملصق وتأكد من الجرعة إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التستم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التستم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25°C. يجب التخزين في مكان بارد وجاف.

خزنة في العبوة الأصلية.

6. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضًا على:

Lactose, maize starch, gelatin, titanium dioxide, yellow iron oxide, black iron oxide

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

تحتوي كل كبسولة من لبياتور على مسحوق أبيض اللون وهي مكونة من جسم بالون الكريمي المعتم ورأس بالون الأخضر المعتم. تحتوي كل عبوة على 1، 2، 3، 6، 10 لوجعات، تحتوي كل واحدة منها على 10 كبسولات.

قد لا تسوق جميع أحجام العبوات.

