

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים
(תקשיירים) התשמ"ו-1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ליורזל
25 מ"ג טבליות
10 מ"ג טבליות

הרכב:

כל טבליה מכילה:
baclofen 25 mg 10 mg baclofen 10 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספים"

קרא בעין את העلون עד סוף בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ליורזל מיועדת להתקכוויות שרירים שמקורן בגורמים שונים.

קבוצה רפואיית:

מרפה שרירים עם פעילות בעמוד השדרה.

ליורזל משמשת להפחיתה ולהקלת על עודף נוקשות ו/או עוויתות בשירים עקב מחלות ומצבים שונים.

הרפיית שרירים על-ידי ליורזל משפרת את יכולת לזרז ומקלת על ביצוע הפעולות היומיומיות.

אם יש לך שאלות לגבי אופן הפעולות של ליורזל, או מדובר תרופה זו נרשמה לך, יש לפנות לרופא.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לבקלופן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, ראה סעיף 6.
- הינך סובל או סבלת בעבר מכיב בקיבה.

ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בליורצ'ל, ספר לרופא אם:

- היה לך שבח.
- יש לך אפילפסיה.
- יש לך מחלת נפש כלשהי.
- הינך מקבל טיפול יותר לחץ דם.
- יש לך מחלת פרקינסון.
- הינך סובל ממחלת בכבד, כליות או בריאות.
- יש לך סוכרת.
- יש לך קשיים במתן שתן.
- הינך בהריון או מניקה (ראי עסיף "הריון והנקה").
- יש לך אי סבלויות לעמילן חיטה (הטבליות מכילות כמהות קטנה של עמילן חיטה. הן מתאימות לאנשים עם צלייך. עם זאת, אם יש לך אלרגיה לחיטה (מצב שונה מצליך) אין ליטול את התרופה).
- יש לך היסטוריה של התמכרות או תלות בתרופה

אם אחד או יותר מקרים אלו חלים עלייך, יש לידע את הרופא או הרוקח לפני נטילת ליורצ'ל, מכיוון **שיתכן שלוייזל אינה מתאימה לך**.

ילדים ומתבגרים ליורצ'ל אינה מיועדת לילדים מתחת למשקל של 33 ק"ג.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופות בין

אם אתה לוקח, או אם לך תרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד מיעודה מתחת למשקל של 33 ק"ג.

לוקח:

- תרופות אחרות להרפיה שרירים, לדוגמה טיזנידין.
- תרופות לטיפול בהפרעות במצב הרוח כגון ליתומים או תרופות נגדות דיכאון טריציקליות כגון אמיטրיפטיין.
- תרופות המורידות לחץ דם כולל תרופות המשמשות לטיפול ביותר לחץ דם כגון דילטיאזם.
- תרופות אחרות אשר גם משפיעות על הכליות כגון איבופורפן.
- תרופות לטיפול במחלת פרקינסון כגון לבודפה או קרבידופה.
- תרופות המאיטות את המערכת העצבית לדוגמה אנטהייסטמינים כגון פרומטازין, תרופות הרגעה כגון טמצפאם, אופיאטים להקלת כאב כגון מורפין ונוגדי עוויתות (תרופות לאפילפסיה כגון קרbamזפין).

שימוש בתרופה ומהוזן

יש ליטול ליורצ'ל במהלך הארוחה עם מעט נזלים

הריון והנקה

יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני נטילת כל תרופה שהיא. אין להשתמש בליורצ'ל במהלך הריון, אלא אם הרופא מייעץ לך לעשות זאת. ידעי את הרופא אם את בהריון או מתכנתת הריון. אם עלייך ליטול ליורצ'ל במהלך הריון, גם העובר ייחסף לליורצ'ל. לאחר הלידה, יתכן שיהיו לתינוק תסמייני גמilia כגון פרקוטים (תסמייני גמilia מתוארים בסעיף "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה").

רק כמהות מעטה של ליורצ'ל עוברת לחלב אם. הרופא ידוע איתך האם תוכל להניק בזמן נטילת ליורצ'ל.

נהייה ושימוש במכונות

מטופלים מסוימים עשויים להרגיש ישנוויות /או סחרחות, או הפרעות בראיה בזמן נתילת לירצל. אם זה קורה לך, אין לנוהג ברכב או לבצע דברים אחרים הדורשים מכך להיות עירני (כגון תפעול מכשור או מכונות) עד אשר השפעות אלו יחלפו. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבת על אופניים או משחקים בקרבת הכבש וכדומה.

מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

לירצל טבליות מכילות עAMILן חיטה. תרופה זו מכילה כמות קטנה מאוד של גלוטן (AMILן חיטה) ולכן לא סביר שתגרום לביעות אם יש לך מחלת צליהק.

אם יש לך אלרגיה לחיטה (מצב שונה מצליהק) אין ליטול תרופה זו.

טבלית לירצל 10 מ"ג מכילה 61 מ"גAMILן חיטה
טבלית לירצל 25 מ"ג מכילה 83 מ"גAMILן חיטה

اذירות מיוחדות

- יש להיזהר בעת שתיית משקאות אלכוהוליים - הם עלולים להשפיע עלייך יותר מהרגיל.
- יש אנשים מבין המטופלים בטלפון שיש להם מחשבות לפגוע או להרוג את עצמו או ניסו להרוג את עצמם. לרוב האנשים הללו היה גם דיכאון, הם השתמשו באלכוהול לצורך מוגזמת או היו מודעים למחשבות על התאבדות. אם יש לך מחשבות לפגוע בעצמך או להרוג את עצמך בכל עת, דבר מייד עם הרופא או פנה לבית חולים. כמו כן, בקש מקרוב משפחחה או חבר קרוב שיגיד לך אם הם מודאגים מכל شيء שחל בהתנהגותך ובקש מהם לקרוא את העalon הזה.
- יתכן שהרופא ירצה לעורך לך בדיקות תקופתיות בזמן נתילת לירצל.
- אם הינך עומד לעבר ניתוח כלשהו, יש לידע את הרופא שההינך נוטל לירצל.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשימוש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין לך בעוח לבוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

הרופא יאמר לך כמה טבליות לירצל לקחת בבדיקה. הרופא עשוי להעלות או להוריד את מינון התרופה בהתאם ל>tagובתך לטיפול.
המינון של לירצל תלוי בתגובה המטופל לתרופה. אתה תתחל ללקחת את התרופה במינון נמור אשר עליה בהדרגתיות במשך מספר ימים, תחת השגחתו של הרופא, עד שתתגעה למינון המתאים לך. הרופא יאמר לך متى עליך ליטול את התרופה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

אין ללעוז!

יש ליטול את התרופה עם הארוחה ולבלוע את הטבליות עם מעט נוזלים כמו משקה חלבני. אם אתה חש בחילה לאחר נתילת לירצל טבליות, נתילה עם ארוחה או משקה חלבני עשוי לעזור.

לירצל 10 מ"ג - ניתן לחצוץ את הטבלייה.

ליורזל 25 מ"ג - קו הח齐יה נועד רק לשיער בשבייה לשם הקלה על הבליעה, ולא לחלק למנות שוואת.

נטילת ליורזל באותו הזמן בכל יום תעזר לך לזכור מתי ליטול את התרופה. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קבועים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

אם נטלת בטעות מינון גבוהה יותר מאשר עליך לדוחה מיד לרופא.
אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעל יلد מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית-חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
تسمנים של מנת יתר הינם: טינטון באוזניים

אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, אין ליטול מנת כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל, והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
אין להפסיק בפתאומיות את נטילת ליורזל. טרם ההפסקה יש לדון עם הרופא או הרוקח, אם הרופא יחליט להפסיק את הטיפול בתרופה ליורזל, המנה תופחת בהדרגה כדי למנוע תסמיini גמילה כמו התכווצויות שריריים וקשיון מוגבר של שריריהם, טונוס שריריים גבוה, קצב לב מהיר, חום, בלבול, הziות, שינויים במצב הרוח והרגש, הפרעות נפשיות, תחושת רדיפה או עוויתות.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווויות והמנה **בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרוב** משקפיים אם הינך זוקם להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי
כמו בכל תרופה, השימוש בליורזל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות לוואי הרשומות מטה דזוזו:
תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שימושיות ביותר משתמש 1 מתוך 10):
עיפויות; ישנוגיות; בחילה

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שימושיות עד למשתמש 1 מתוך 10):
חולשה מוגברת בגפיים או תחושת עייפות ותשישות; כאב בשירים
כאב ראש; סחרורת או תחושת סחרור
קשה נשימה
חווסר יכולת לשון
תנוודות במצב הרוח, בלבול, הziות או סיטויليلת
יובש בפה
בעיות בעיניים
חווסר יציבות, רעד או בעיות אחרות בשליטת שרירים
לחץ דם נמוך (התעלפות)
הפרעות במערכת העיכול: בעיות בקיבה הכלולות: רצון להakah; הקאה; עצירות; שלשול
הזעה מוגברת; פריחה
מתן שתן רב מהרגיל או כאב בעת מתן שתן

תופעות לוואי נדירות (תופעות שימוש שטח עד משתמש 1 מתוך 1,000):

- חוסר תחושה או עקצוץ של כפות הידיים או כפות הרגליים
- התכווצות שרירים מוגברת
- הפרעות בחוש הטעם
- דיבור משובש או איטי
- כאב בטן
- בעיות בכבד
- קושי במתן שתן
- בעיות מין אצל הגבר, לדוגמה אין אוננות (אי-מפעוטנציה)
- עוויותות (במיוחד בחולטי אפילפסיה)

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שימוש שטח לפחות 1 מתוך 10,000):

היפוכרמיה (חום גוף נמוך)

תופעות לוואי נוספות (בשכיחות שאינה ידועה)

פריחה בולטות על העור ומגרדת (אורטיקרייה - ידוע גם כסרפדת או חרלט)

- דופק איטי
- עליה ברמת הסוכר בدم
- קשה נשימה במהלך השינה (תסמונת דום נשימה בשינה)
- נפיחות במפרק הקרטול, כפות רגליים או רגליים תחתונות
- נפיחות בפנים
- תגובה אלרגית (רגישות יתר)
- נשירת שיער
- קשהם בתפקוד מיני
- תסמיini גמilia הנגרמים בשל הפסקה מיידית של התרופה (ראה פרק "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה")

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעoten הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעלון, عليك להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי-כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (date. exp) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- לירצול 10 מ"ג יש לאחסן מתחת ל - 30° C.
- לירצול 25 מ"ג יש לאחסן מתחת ל - 25° C.
- יש לאחסן באזירה המקורית כדי להגן מפני לחות.

אם הרופא אמר לך להפסיק ללקחת טבליות לירצ'ל, העבר את התרופות שנותרו לך לרוקח, להשמדה. שמור את התרופות רק אם הרופא אמר לך. אין להשליך את התרופות לביב או לאשפָה. זאת, כדי לשמר על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Wheat starch PH, cellulose microcrystalline, povidone, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate

- כיצד נראהית התרופה ומה תוכן האריזה:
 - לירצ'ל 10 מ"ג - טבליות בגוון לבן-צהבהב, עגולות ושתוחות עם קצוץ משופעים. בצד אחד מודפס "CG" ובצד השני "LK" עם קו חציה.
 - לירצ'ל 25 מ"ג - טבליות בגוון לבן-צהבהב, עגולות ושתוחות עם קצוץ משופעים. בצד אחד מודפס "CG" ובצד השני "UR" עם קו חציה. קו חציה זה מיועד רק להקלת בבליעה, ולא לחלוקת לשתי מנות.
- אריזות לירצ'ל 10 מ"ג ו-25 מ"ג מכילות 50 טבליות.

בעל הרישום והיבואן וכתובתו:

נוברטיס ישראל בע"מ, ת.ד. 7126, תל אביב.

נערך במאי 2024

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

ליירצ'ל 10 מ"ג: 120-93-23361

ליירצ'ל 25 מ"ג: 124-09-23362

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.