

טפקינלי 48 מ"ג

תמייסה להזרקה

החומר הפעיל ורכיביו:

אפקוריטמאב 60 מ"ג/מ"ל.

כל בקבוקון של 0.8 מ"ל מכיל 48 מ"ג של אפקוריטמאב.

Epcoritamab 60mg/ml.

Each 0.8 ml vial contains 48 mg of epcoritamab.

לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים, أنا ראה סעיף 2 "לפני השימוש בתרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף" בעلون זה.

קראו עליון את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקחת. התרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוסף לעلون, לתכשיר טפקינלי קיימים 'קרטיסים' מיידע בטיחותי למטופלי. קרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלה הטיפול ובמהלך הטיפול בטפקינלי ולפערול על פיו. יש לעיין בקרטיס מיידע בטיחותי למטופלי ובעلون לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמר את הקרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

טפקינלי מיועדת לטיפול במובגרים עם לימפומה מפושטת של תא B גודלים (DLBCL-Diffuse Large B-Cell Lymphoma) חוזרת או עמידה לטיפול, שלא הוגדרה אחרת, כולל DLBCL הנובעת מלימפומה אינדולנטית (אייטית) ולימפומה של תא B בדרגת ממאירות גבוהה לאחר לפחות שני קוווי טיפול סיסטמיים קודמים.

קובצתה תרפואיית:
תכשירים אנטיינאומפלסטיים.

ביצד טפקינלי פועלות

אפקוריטמאב תוכנן במיוחד כדי לסייע למערכת החיסון שלך לתקוף תא סרטן (לימפומה). אפקוריטמאב פועל על-ידי היitmאות לתאי מערכת החיסון ולתאי הסרטן בגוףך, מקרב אותן אחד לשני, כך שמערכת החיסון שלך יכולה להרווש את התאים הסרטניים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאפקוריטמאב או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6).
- אם איןך בטוח, שוחח עם הרופא שלך או האחות לפני שטפקינלי תיניתן לך.

ازהרוות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרפיה

לפני הטיפול בטפקינלי, ספר לרופא אם

- יש לך או היו לך בעבר בעיות במערכת העצבים שלך – כגון פרוכוסים.
- יש לך זיהום.
- אתה אמור לקבל חיסון או שאתה יודע شيיתכן ושתצטרך לקבל חיסון בעתיד הקרוב.
אם אחד מהמצבים מעלה חל עלייך (או שאינך בטוח), שוחח עם הרופא שלך או האחות לפני שתתחיל טיפול עם טפקינלי.

ספר לרופא שלך מיד אם אתה חווה תסמינים של אחת מתופעות הלוואי המפורטות מטה, במהלך או לאחר הטיפול בטפקינלי. ייתכן שתזדקק לטיפול רפואי נוסף נסף.

- **تسمונת שחרור ציטוקינים (CRS [Cytokine Release Syndrome])** – מצב מסכן חיים הגורם לחום, הקאות, קשי נשימה/קוצר נשימה, צמרמות, דופק מהיר, כאב ראש וסחרורת או תחושת שחרור, הקשור לתרופות המעוררות תא T.
 - לפני כל הזרקה תת עורית, ייתכן שייתנו לך תרופות שמשיעות להפחית תופעות אפשריות של תסמונת שחרור ציטוקינים.

- **تسمונת רעלות נירולוגית - (ICANS [Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome])** – תסמינים העשויים לכלול בעיות שימוש בשפה (כולל דיבור, הבנה, כתיבה וקריאה), ישנות, בלבול/חוסר התמצאות, חולשת שרירים, פרוכוסים, נפיחות של חלק מהמוח ואובדן זיכרון.

- **تسمונת פירוק הגידול (TLS [Tumor Lysis Syndrome])** – אנשים מסוימים עלולים לחות רמות חריגות של מלחים מסוימים בدم – הנובעות מהפירוק המהיר של תאים סרטניים במהלך הטיפול. מצב זה מכונה 'تسمונת פירוק הגידול'. לפירוט התסמינים, אני ראה סעיף 4 "תופעות לוואי" בעלן זה.

○ הרופא שלך או האחות יבצעו בדיקות דם כדי לבדוק מצב זה. לפני כל הזרקה תת עורית עלייך לשותות הרבה מים וייתכן שייתנו לך תרופות נוספות לעזור רמות גבוהות של חומצה אורית ויעזרו להפחית תופעות אפשריות של תסמונת פירוק הגידול.

- **התלקחות הגידול** – ככל שהسرطان שלך נחרס, הגוף עלול להגיב ולהציגים מצב שנראה כהחמרה – מצב זה מכונה 'תגובה התלקחות הגידול'. לפירוט התסמינים, אני ראה סעיף 4 "תופעות לוואי" בעלן זה.

- **זיהומים** – אתה עלול לפתח סימנים של זיהום, כגון חום של 38°C ומעלה, צמרמות, שיעול או כאב במcdnן שtan, סיוכלים להשתנות בהתאם למקום הזיהום בגוף. לפירוט התסמינים, אני ראה סעיף 4 "תופעות לוואי" בעלן זה.

ילדים ומתבגרים

טפקינלי אינו מיועד לשימוש ילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים, מאחר שלא קיימים מידע לגבייעילות ובטיחות השימוש בתכשיר בקבוצות גיל זו.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקה, או אם לך חלה לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הירioxן, הנקה ופוריות

הירioxן

אם את בהירioxן, חשוב שעת עוללה להיות בהירioxן או מתכנת להיכנס להירioxן, היועצى ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופת זו. אל תיקח טפקינלי במהלך ההירioxן, מאחר שהיא עלול להשפיע על העובר. ייתכן שהרופא שלך יבקש מכך לבצע בדיקת הירioxן לפני תחילת הטיפול.

אמצעי מניעה

אם את אישה בגיל הפוריות ועשוי להרות عليك להשתמש באמצעות אמצעי מניעהיעיל כדי למנוע כניסה להירioxן במהלך נטילת טפקינלי ובמשך 4 חודשים לפחות אחורי מנת הטפקינלי האחורה שלך. عليك לספר לרופא שלך מיד אם נכנסת להירioxן במהלך תקופת זו.
שוחחי עם הרופא שלך או האחות בנוגע לאמצעי מנעה מתאימים.

הנקה

אסור להניך במהלך הטיפול עם טפקינלי ובמשך 4 חודשים לפחות אחורי המנה האחורה. לא ידוע אם טפקינלי עוברת לחלב האם והאם זה עלול להשפיע על תינוקך.

פוריות

ההשפעה של טפקינלי על פוריות גברים ובנים אינה ידועה.

נהייה ושימוש במכונות

בשל תסמינים אפשריים של תסמנות רעלות נירולוגית (ICANS) عليك להיות זהיר במהלך נהיגה, רכיבה על אופניים או שימוש במכונות כבדות או כאלו הבעיות להיות מסוכנות. אם יש לך CUT נסמינים כאלה, הימנע מפעולות אלה וצור קשר עם הרופא שלך, האחות או הרוקח. ראה סעיף 4 למידע נוסף על תופעות לוואי.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

טפקינלי מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל בקבוקו, כך שלמעשה הינה 'נטולת-נתרן'.

טפקינלי מכילה سورביטול

תרופה זו מכילה 21.9 מ"ג سورביטול בכל בקבוקו, אשר שווה ערך ל-27.33 מ"ג/מ"ל.

3. כיצד תשמש בתרופת?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. عليك לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

טפקינלי תינתן לך על-ידי רופא או אחות כזריקה תת עורית.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

טפקינלי תינתן לך במחזורים של 28 ימים, על-פי תוכנית הטיפול שנייתה לך על-ידי הרופא שלך.

אתה תקבל טפקינלי בהתאם ללוח הזמנים הבא:

מחזור	תדירות המtan
מחזורים 1 עד 3	שבועי
מחזורים 4 עד 9	כל שבועיים
מחזורים 10 והלאה	כל ארבעה שבועות

ייתכן שייתנו לך תרופות אחרות לפני שתקבל טפקינלי, כדי לסיעע במניעת תגובות כגון תסומנות שחרור ציטוקינים וחום במחזור 1 (ייתכן שייתנו גם במחזורים עתידיים).

תרופות אלו עשויות לכלול:

- קורטיקוסטרואידים – כגון פרדニיזולון או תרופה דומה
- אנטיביסטמיין – כגון דיפנהידרמין
- פראצטמול

מנות התחלה טיפול:

המנה הראשונית (0.16 מ"ג) של טפקינלי ניתנת לך במחזור 1 ביום הראשון.
המנה השנייה (0.8 מ"ג) של טפקינלי ניתנת לך במחזור 1 ביום השני.

מעבר למןמנה מלאה:

המנה המלאה הראשונה (48 מ"ג) של טפקינלי ניתנת לך במחזור 1 ביום ה-15. הרופא שלך יינטרא את השפעת הטיפול שלך ויבקש ממך להישאר בבית החולים ל-24 שעות אחרי המנה המלאה הראשונה (48 מ"ג), מפני שהוא הזמן בו הסיכוי להופעת תגובות כגון תסומנות שחרור ציטוקינים (CRS), תסומנות רעליות נירולוגית (ICANS) וחום הוא הגבוה ביותר.

אתה תקבל טפקינלי כל עוד הרופא שלך חושב שאתה מפיק תועלת מהטיפול. ייתכן שהרופא שלך ידחה או יפסיק למחרית הטיפול שלך עם טפקינלי אם מופיעות אצלך תופעות לוואי מסוימות.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אם שכחת לנקח טפקינלי

אם שכחת או פספסת את התור שלך במרפאה, צור מיד קשר עם הרופא שלך לקבלת הנחיות. חשוב מאוד לא לפספס אף מנה על מנת שלטיפול תהיה יעילה מלאה. יש להתמיד בטיפול כפי שנקבע על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק לנקח טפקינלי

אל תפסיק את הטיפול עם טפקינלי אלא אם יש לך סיבה לכך. הסיבה לכך היא שהפסקת הטיפול עלולה להחמיר את מצבך.

אין ליתול תרופות בחושך! בזוק התווית והמנה בכל פעע שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנז זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטפקינלי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה ראשית תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהם.

תופעות לוואי חמורות

ספר לרופא שלך מיד אם אתה מבחין באחד מהתסמינים של תופעות הלוואי חמורות הבאות. ייתכן שיופיעו אצלך רק אחד או חלק מהתסמינים אלו.

לפירוט נוספת אנא ראה סעיף 2 "ażhorot miyohadot haengutot leshimush batrufah".

תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS) (תופעת לוואי שכיחה מאוד: תופעות שמופיעות ביותר בioter משמש אחד מעשרה)
התסמינים יכולים לכלול:

- חום
- הקאה
- סחרוחורת או תחושת שחרור
- צמרמורות
- דופק מהיר
- קשיי נשימה/קוצר נשימה
- כאב ראש

תסמונת רעלות נירולוגית (ICANS) (תופעת לוואי שכיחה: תופעות שמופיעות ב-10-1 משמשים מתוך 100)

• השפעות על מערכת העצבים שלך, כאשר התסמינים לכך עלולים להופיע ימים או שבועות לאחר קבלת הזריקה. ההשפעותעשויות להיות קלות בהתחלה. חלק מהתסמינים הללו יכולים להיות סימנים לתגובה חייסונית חמורה המכונה "تسمונת רעלות נירולוגית" (ICANS).

התסמינים יכולים לכלול:
• קושי בדיבור או בכתיבה
• ישנוניות
• בלבול/חוסר התמצאות
• חולשת שרירים
• פרוכוסים
• אובדן זיכרון

תסמונת פירוק הגידול (TLS) (תופעת לוואי שכיחה: תופעות שמופיעות ב-1-10 משמשים מתוך 100)

התסמינים יכולים לכלול:

- חום
- צמרמורות
- הקאה
- בלבול
- קוצר נשימה
- פרוכוסים
- פעימות לב לא סדירות
- שטן כהה או עכור
- עייפות חריגת
- כאבי שרירים או מפרקים

תופעות לוואי אחרות

ספר מיד לרופא שלך או לאחות אם אתה מבחין באחת מטופעות הלוואי הבאות או אם הן מחרירות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד: תופעות המופיעות ביותר בioter משמש אחד מעשרה

- זיהום ויראלי
- דלקת ריאות (זיהום בריאה)
- ירידת בתיאבון

- פגימות לב לא סדיות
- כאבים בעצמות, במפרקים, ברצועות ובריריות
- כאבים באזור הבطن
- כאב ראש
- בחילה
- שלשול
- הקאה
- עייפות
- תגובות באזור החזה
- חום
- נפיחות

תופעות לוואי שנצפו בבדיקות דם :

- רמות נמוכות של סוג של תא דם לבנים הלחמים בזיהום (נויטרופניה)
- רמות נמוכות של תא דם אדומים, מצב שעלול לגרום לעייפות, עור חיוור וקוצר נשימה (אנמיה)
- רמות נמוכות של טסיות דם, מצב שעלול להוביל לדימום ולחבורות (טרומבווציטופניה)

תופעות לוואי שכיחות: תופעות שמצוינות ב- 10-1 מעתמדים מתוך 100

- חום הנגרם מזיהום כאשר יש לכך רמות נמוכות של תא דם לבנים (חום נויטרופני)
- זיהומיים בדרכי הנשימה העליונות (זיהום של דרכי הנשימה)
- בלוטות ליפפה נפוחות ורגישות, כאבים בחזה, שיעול או קושי לנשומת, כאבים במקום הגידול (התלקחות הגידול)
- זיהומיים פטרייתיים (הngrמים על-ידי סוג של מיקרו-אורגניזם הנקרא פטרייה)
- זיהומיים בעור
- תגובה מסכנת חיים של הגוף לזיהום (ספסיס)
- ירידת בסוג של תא דם לבנים הנגרמים לימפוציטים, עלולים להשפיע על יכולת הגוף להילחם בזיהום (לימפופניה)
- פירוק מהיר של תא הגידול הגורם לשינויים כימיים בדם ולפגיעה באיברים, כולל הכלויות, הלב והכבד (תסמונת פירוק הגידול)
- הצלברות נזול סבב הריאות שיכול להקשות על הנשימה (תפליט פלאורלי)
- פריחה
- גירוד (גרד)

תופעות לוואי שנצפו בבדיקות דם :

- רמה נמוכה בדם של פוספטים, אשלגן, מגנזיום או נתרן
- עלייה ברמת הקרטינין בדם, תוצר פירוק של רקמת שריר
- עלייה ברמת חלבוני הכבד בדם, עלולה להuid על בעיות בכבד

אם הופעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעת הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה בעلون, عليك להתיעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקורי לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור :

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת: תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלת. אין לגרום להקה ללא הוראה מפורשת מרופא. טפקיינלי תאחסן על-ידי הרופא, האחות או הרוקח בבית החולים או במרפאה. כדי לאחסן כראוי את התכשיר:

- אין להשתמש בתרופה אחורי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי תווית הבקבוקו ואריזת הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן ולהוביל בקירור (8°C - 2°C).
- אין להקפיא.
- יש לשמור את הבקבוקו באrizות הקרטון החיצונית על מנת להגן מפני אור.
- אם לא נעשה שימוש מיידי, ניתן לאחסן את התמיסת המוכנה (לאחר הפתיחה) עד ל-24 שעות ב- 8°C - 2°C מרגע ההכנה.
- במהלך 24 השעות הללו, ניתן לאחסן את התמיסת המוכנה לפחות עד 12 שעות בטמפרטורת החדר (20°C - 25°C) מתחילה הכנסת המנה ועד למтон.
- יש לאפשר לתמיסת הגיע לטמפרטורת החדר לפני השימוש.

הרופא שילך, האחות או הרוקח ישliquו כל תרופה שאינה בשימוש בהתאם לדרישות המקומיות. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה טפקיינלי מכילה

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם :

D-Sorbitol, sodium acetate trihydrate, polysorbate 80, acetic acid glacial, water for injection

(ראה בסעיף 2 "טפקיינלי מכילה נתרו" ו-"טפקיינלי מכילה סורביטול").

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה
טפקיינלי היא תmiseה להזרקה. זו tamiseה חסרת צבע עד צהבהבה המגיעה בבקבוקן זכוכית.
כל אריזות קרטון מכילה בקבוקן אחד.

בעל הרישום ומתובתו: אבווי ביופארמה בע"מ, החרש 4, הוד השרון, ישראל.
שם הייצור ומתובתו:
אבווי דויטשלנד גי.אמ.בי.אייז' אנד קו. קי.גי, קנוולשטרסה, 67061, לודוויגספון, גרמניה.
עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך מרץ 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופה המלכתי במשרד הבריאות : 176-08-37756

שם הפשטות ולהקלת הקרייה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

המידע הבא מיועד לאנשי צוות רפואי בלבד

The following information is intended for healthcare professionals only:

Epcoritamab is prepared and administered as a subcutaneous injection.
Each vial of epcoritamab is intended for single use only.

Each vial contains an overfill that allows withdrawal of the labelled amount.

Epcoritamab must be prepared and administered by a healthcare professional using aseptic technique **-No dilution required**.

Tepkinly 48 mg vial is supplied as ready-to-use solution that does not need dilution prior to administration. Filtration of the solution is not required.

Epcoritamab should be inspected visually for particulate matter and discolouration prior to administration. The solution for injection should be a colourless to slightly yellow solution. Do not use if the solution is discoloured, or cloudy, or if foreign particles are present.

1) Prepare Tepkinly vial
a) Retrieve one 48 mg Tepkinly vial with the orange cap from the refrigerator.
b) Allow the vial to come to room temperature for no more than 1 hour.
c) Gently swirl the Tepkinly vial.
DO NOT vortex or vigorously shake the vial.
2) Withdraw dose
Withdraw 0.8 ml of Tepkinly into a syringe.
3) Label syringe
Label the syringe with the product name, dose strength (48 mg), date and the time of day.
4) Discard the vial and any unused portion of Tepkinly in accordance with local requirements.

Storage for prepared Tepkinly

- Use immediately or store Tepkinly solution in a refrigerator and protect from light for up to 24 hours at 2 °C to 8 °C from the time of preparation.
- Within these 24 hours, Tepkinly solution can be stored for up to 12 hours at room temperature from the start of dose preparation to administration.
- Minimise exposure to daylight.
- Allow Tepkinly solution to equilibrate to room temperature before administration.
- Discard unused Tepkinly solution beyond the allowable storage time.

Traceability

In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be clearly recorded.