

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בילקסטן טబליות

החומר הפעיל:

כל טבליה של בילקסטן מכילה: 20 מ"ג בילקסטין (Bilastine).

. ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העلون עד סופו לפני שימוש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרווקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במצבך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בתסמים של נזלת אלרגית ודלקת החמית האלרגית (עונתית או קבועה) ופריחות עוריות מגרדות (אורטיקרייה/סרפנדת) במוגרים ומתבגרים מעל גיל 12.

קבוצה רפואיית: אנט-היסטמינים.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (רשימת המרכיבים הנוספים, ראה סעיף 6).

اذerationות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

אם התסמים ממשיכים, יש להיעזר ברופא. אין לעבור על המנה המומלצת.

לפני התחלת הטיפול בבילקסטן ספר לרופא שלך:

אם אתה סובל או סבלת בעבר מפגעהBINONIOT עד חמורה בתפקוד הכליזות.

ילדים ומתבגרים:

אין להשתמש בתרופה בילדים מתחת לגיל 12.

תגובהות בין תרופתיות: אם אתה לוקח או אם لكחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרווקח. במקרה יש ליתדעת את התרופות או הרופא או הרווקח אם אתה לוקח את התרופות הבאות (יש לציין כי הרשימה שלහן מצינית את החומרים הפעילים בתרופות. אם אין בטוח האם אתה משתמש באחת מהתרופות הללו אנא התיעץ עם הרופא או הרווקח):

- קטוקונזול (טיפול בפטרת), ריטונזיר (נגד נגיף ה-VIH).
- אריתרומיצין או ריפאמיצין (תרופות אנטיב�וטיות).
- ציקלוספורין (תרופה המДЕCAST את מערכת החיסון).
- דילטיאזם (טיפול בתעוקת חזה).

שימוש בתרופה עם מזון ושתייה:

אין ליטול את התרופה עם מזון, או עם מיץ אשכוליות או מיצי פירות אחרים, היות והדבר עלול להויריד את השפעת התרופה. כדי להימנע לכך, אתה יכול:

- ליטול את התרופה שעה לפני אוכל או שתייה של מיץ פירות.
- ליטול את התרופה שעתים אחרי אוכל או שתייה של מיץ פירות.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

התרופה, כמוון המומלץ אינה מגבירה ישנוויות שנגרמת כתוצאה ממשית אלכוהול.

הריאן, הנקה ופוריות:

יש להיוועץ ברופא אם את בהריאן, חושבת שאת בהריאן, מתכנתת הריאן או מניקה. אין מידע על שימוש בביבלוסטן בנשים הרות או מניקות. אין מידע על השפעת בילקסטן על פוריות.

נהיגה ושימוש במכונות:

לא סביר שבילקסטן יופיע על יכולך לנוהג או להפעיל מכונות. אולם, כל מטופל עלול להגיב באופן שונה לנוהג או מפעיל מכונות. לכן, יש לבדוק כיצד התרופה משפיעה עליו לפני שתראה נוהג או מפעיל מכונות.

התרופה מכילה נתן:

כל טבלית בילקסטן מכילה פחות מ-23 מ"ג נתן ולכן יכולה להיחשב כמעט נטולת נתן.

3 . כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשמש תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעובד בוגע למים ואופן הטיפול בתרופה.

המים ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המים המקבול בדרך כלל:

יש ליטול טבליה אחת ביום עם כוס מים. הטבליה מיועדת למטען פומי (דרך הפה).

יש ליטול את הטבליה שעה לפני או שעתיים אחריו אוכל או שתייה של מיצי פירות. ראה גם שימוש בתרופה עם מזון ושתייה.

marsh הטיפול יקבע על ידי הרופא.

אין לעבורי על המנה המומלצת. יש לבלווא את שני החלקים מיד לאחר החציה.

אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה.

אם נטלת בטיעות מין גבואה יותר: אם נטלת מנת יתר או אם בטיעות בעליל או אדם שלישי מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין בבית החולים, ובaba אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הקצוב: יש ליטול מנת מיד כשנכרת ולאחר מכן חזר לזמן הנטילה הרגילים. אין ליטול מנת כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחחה.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיות עם הרופא.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספתות בנוגע לשימוש בוגע בתחום התרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בביבלוסטן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם תופעות הלואוי אין חולפות או שהן מתרידות או שהן מחמירות, יש להתייעץ עם הרופא. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי, יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק ליטול את התרופה ופנה לקבالت עזרה רפואיית מידית, אם מתרחשות תופעות הלואוי החמורות הבאות: תגובות אלרגיות. התסמינים יכולים לכלול פריחה, קשי נשימה, סחרחוורת, קרייסה או אובדן הכרה; התנפחות הפנים, השפטים, הלשון או הגרון / או התנפחות והאדמה של העור.

תופעות לוואי נוספת:

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):
כאב ראש, ישונניות.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-1-1 משתמשים מתוך 1,000):

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-1-1 משתמשים מתוך 1,000):
תוצאות לא תקין בבדיקה הלב אק"ג (ECG); שינויים בבדיקות הדם לתפקודי כבד או תפוקדי כליות; סחרחוורת; כאב או אי נוחות בבטן (כולל העליונה); עייפות, תיאבן מוגבר, פעים לב לא סדרות, עליה במשקל, בחילות, חרדה, אי נוחות או יובש באף, שלשולים, דלקת קיבה (גסטרטיטיס), ורטיגו (תחושת סחרחוורת או סחרור), חולשה, צמא, קשי נשימה, יובש בפה, קשי עיכול, גרד, פצעי קור (הרופס בפה), חום, צילצולים באוזניים (טיניטוס), קשי שינה, עליה בשומני הדם.

תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):
פלפיטזיות (הרגשת דפקיות הלב), טכיקרדיה (דפקיות לב מהירות), הקאות.

אם הופיעה תופעת לוזאי, אם אחת מתופעות הלוזאי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוזאי שלא צינה בעלו,
עלך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוזאי לשדר הביריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוזאי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדוח על תופעות לוזאי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כר תמנע הרעללה. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל-30°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם את המרכיבים הבלתי פעילים הבאים:

Cellulose, microcrystalline; Sodium starch glycolate; Silica, colloidal anhydrous; Magnesium stearate (vegetable).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האrizה?

טבליות לבנות, אליפטיות, קמורות עם קו ח齐ה. הטבליות ארכזות באrizה מגשיות. בכל אריזה 2, 10 או 30 טבליות.
יתכן ולא כל גדי האריזות משווים.

בעל הרישום: מעבדות רפואי בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים 9100301.
היצן: פאום פרמה S.A, ספרד.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1590634829

נערך במאי 2024.

לשם הפשטות והקלת הקראיה עלון זה נוסח בלשון זכר, אך התרופה מיועדת לשני המינים.