



עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקשיים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פרגבילין דקסל 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 מ"ג, כמוסות

כל כמוסה מכילה פרגבילין (Pregabalin) 25, 50, 100, 150, 200, 225 או 300 מ"ג בהתאם.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך, אל תעביר אותה לאחרים, היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מיועדת לטיפול ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

טיפול בכאב ממוקד נירופטי (עצב) במובגרים, לטיפול בדابت שרירים (פיבромיאלגייה – Fibromyalgia) ולטיפול בהפרעת חרדה מוגבלת במובגרים.

קבוצה רפואיית: אנלוג לחומצה גاما אמינובוטירית (gamma-aminobutyric acid).

**2. לפני השימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (פרגבילין) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

**اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
פנה לרופא שלך לפני נטילת פרגבילין.**

• חלק מן החולים הנוטלים פרגבילין דיווחו על תופעות אלרגיות. תופעות אלו כוללות נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ובולען פרייה עורית מופשטת. אם אתה חוווה אחת או יותר מתופעות אלו, עליך לפנות מיד לרופא.

• פרייה עורית חמורות, כגון טסמנונט סטיבנס-ג'נסון ונמק אפידרמלי רעל, דיווחו בהקשר של השימוש בפרגבילין. יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם אתה חוווה אחד או יותר מהתסמים הקשורים בתופעות העוריות החמורות המתוארות בסעיף 4.

• התרופה עלולה לגרום לScheduler וליישנונו, כך שהילדים הנוטלים את התרופה הם בסיכון מגבר לנפילות ולפצעות. יש לנוקוט בזיהירות עד שתתרגל להשפעת התרופה עליך.

• התרופה עלולה לגרום לטשטוש או אובדן ראייה או שינויים אחרים בראשיה, שרובם חולפים. יש להודיע לרופא מיד על כל שינוי שלב בראשיה.

• בחולי סוכרת מסויימים, העולים במשקל במהלך הטיפול בתרופה, יתכן צורך בהתאם מינון התרופות להורדת רמת הסוכר בدم.

• תופעות לוואי מסוימות, כגון ישנונו, עשויות להיות יותר שכיחות, כגון שחלים עם פגיעה בעמוד השדרה עשויים ליטול תרופות נוספות לטיפול בכאב וספסטיות, שלתן תופעות לוואי דומות לאלו של פרגבילין וחומרתן עשוייה לגבר כאשר אלו ניתלות יחד.

• במספר חולים שנטלו פרגבילין דווח על כשל לבבי, בעיקר אצל מבוגרים בעלי מחלות לב וכלי דם. **לפני תחילת השימוש בתרופה, יש לידע את הרופא אם אתה סובל או סבלת בעבר מחלה לב.**

• קיימים מספר דיווחים של כשל קליני על רקע טיפול בפרגבילין. אם במהלך הטיפול בתרופה אתה מבחין בהשתנה מופחתת, יש לדוח על כך לרופא, שכן הפסקת הטיפול בתרופתי עשויה להביא לשיפור.

• בחולים מסויימים, שטופלו בתרופות אנטיאפליפטיות כגון פרגבילין, דווח על מחשבות על פגיעה עצמית או מחשבות אובדןיות או שהראו התנהגות אובדןית. במקרה של הופעת מחשבות או התנהגות מסווג זה בכל שלב, יש לפנות לרופא מיד.

• שילוב פרגבילין עם תרופות אחרות העשויות לגרום לעצירות (כגון סוגים מסוימים של משיכי כאבים), עלול לגרום לביעות במערכת העיכול (כגון: עצירות, חסימת או שיתוק מעי). יש להודיע לרופא אם אתה סובל מעצרות, במיוחד אם קיימת נתיחה לעצירות.

• לפני תחילת השימוש בתרופה, יש לידע את הרופא אם אתה סובל או סבלת בעבר מתולות או התמכרות למשקאות חריפים, לסמים או לתרופות כלשהן. במצב זה יתכן שיש לך סיכוי גבוה יותר לפתח תלות בפרגבילין.

• במהלך השימוש בתרופה או מיד לאחר הפסקתה עלולות להופיע עוינות. יש להודיע לרופא מיד אם אתה סובל מעוינות.

- במספר חולים עם מחלות רקע נוספת על ירידת בתפקוד מוחי (אנצפלופתיה). יש לידע את הרופא אם ידוע על מצב רפואי בעל השכלה ממשוואות, כולל מחלות כבד או כלויות.
- קיימים דיווחים על קשי נשימה. אם יש לך הפרעות במערכת העצבים, הפרעות נשימה, ליקוי קליטי או שאתה מעל גיל 65, ניתן שהרופא ירשם לך משטר מינון אחר. היועץ ברופא אם יש לך קשי נשימתי או נשימות שטוחות.

תלוּת

אנשים מסוימים יפתחו תלוּת בפרגבלין (צורך להמשיך לקחת את התרופה). הם עשויים לפתח תסמיינית גמilia בהפסקת השימוש בפרגבלין (ראה סעיף 3, "יכן משתמש בתרופה?" ו-"אם אתה מפסיק את נטילת התרופה"). אם קיימ השש שאתה עלול לפתוח תלוּת בפרגבלין, חשוב שתתיעץ עם הרופא.

אם הבדיקה באחד מהסתנים הבאים בזמן שאתה גוטל פרגבלין, זה יכול להיות סימן שפיטה תלוּת:

- אתה צריך ליטול את התרופה לתקופת זמן ארוכה יותר מאשר שורשמה עבורה
- אתה מרגיש שאתה צריך ליטול יותר מהמנה שורשמה עבורה
- אתה משתמש בתרופה מסוימת שונות מזו אשר עברון היא גורשה מהר
- הוא לך נסיבות חוזרים ולא מצליחים להפסיק או לשנות בשימוש בתרופה
- כאשר אתה מפסיק ליטול את התרופה אתה מרגיש לא טוב, והוא מרגיש טוב יותר לאחר נטילת התרופה שוב

אם אתה מבחן בכל אחד מס'ים אלו, פנה אל הרופא והתיעז אליו לגבי הטיפול המיטבי עבורה, כולל מתי יש להפסיק לקחת את התרופה ואיך לעשות זאת בבטחה.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם אתה לוקת: במיחוד אם אתה לוקת: לירוק. לירוקות ותרופות מסוימות אחרות עלולות להיות השפעות הדדיות על הפעולות. אם פרגבלין נלקחת במקביל לתרופות מסוימות בעלות השפעות מרגיעות (כולל אופיאטים), פרגבלין עלולה להגבר השפעות אלו ולהוביל לכשל נשימתי, ורדמתה (קומה) ולמוות. עצמת הסחרחות, ישננות וירידה בריכוז עלולים לעלות אם פרגבלין נלקחת במקביל ל:

- אוקסיקודון - תרופה לשיכוך כאבים
- לורצופם - תרופה לטיפול בחרדה
- אלכוהול

ניתן ליטול פרגבלין עם גלולות למניעת הירין.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול התרופה עם או ללא מזון.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

הירין, הנקה ופוריות אין להשתמש בפרגבלין במהלך ההירין או תקופת הנקה, אלא בהוראת הרופא לאחר הייעוץ עמו. השימוש בפרגבלין במהלך 3 החודשי ההירין הראשונים עלול לגרום למומים מולדים בעבר הדורשים טיפול רפואי. במחקר שスクר נתונים מנשים ממדיינות נורדיות אשר נטו פרגבלין במהלך 3 החודשי הראשונים של ההירין, 6 תינוקות מתוך 100 סבלו ממומים מולדים כאלה. זאת בהשוואה ל- 4 תינוקות מתוך 100 שנולתו לבשים שלא טיפול בפרגבלין במהלך. דוח על חריגות בפנים ובפה), בעיניים, במערכות העצבים (כולל במוח), בклיפות ובאייררי המין.

נשים העשויות להרות במהלך הטיפול בתרופה חייבות להשתמש באמצעות מניעה ייעלים. אם את בהירין או מנקה, חושבת שאתה בהירין או מתכוונת להיכנס להירין, היועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכוניות

אין להזог או להפעיל מכוניות מסווג עד שתדע כיצד התרופה משפיעה עליו, מפני שהשימוש בתרופה זו עלול לגרום לשחרחות, לנמנום או לירידה בריכוז.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
פרגבלין דקסל 50 מ"ג מכילה את החומר (E129) Allura red AC, אשר עלול לגרום לתגובהות אלרגיות.

3. כיצד משתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או ברוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

הminster וואפן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.
אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת נטילה

יש לבלווע את הכמותה של מהתופעות. אין מידע לגבי פתיחה ופייזור תוכן הכמותה, היות שהשפעת צורת מתן זו לא נבדקה. יש לבלווע את התרופה עם מים.

אם נטלה בטעות מנתן גובה יותר, אתה עלול לסייע מהתופעות הבאות: ישנות, בלבול, אי שקט, חוסר מנוחה. דוח גם על התקפים של עוויתות (פרכוים) ואיבוד הכרה (תרדמת).
אם נטלה מנתן יתר או אם בטעות בעליל מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד

חשוב ליטול את התרופה בכל יום בשעה קבועה. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד, אין ליטול ממנה כולה. רק את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור בבריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. אם הוחלט על הפסקת טיפול, הרופא יסביר לך איך לעשות זאת. הפסקת הטיפול בתרופה חייבת להיות הדרגתית, במשך תקופה של שבועיים לפחות.

לאחר הפסקת הטיפול בתרופה (בין אם טיפול ארוך או קצר טוויך) יתכן שתחווה תסמינים מסוימים שנקרוים תסמיינית גמilia. תסמיינים אלו כוללים: נדודי שינה, כאבי ראש, בחילות, חרדה, שלשול, תסמיינים דמוני שפעת, עוויתות, עצבנות, דיכאון, מחשבות על פגיעה בעצמך או התאבדות, כאבים, הזעה וסחרחות. ככל שהתרופה ניתלה במשך זמן ארוך יותר, תופעות אלו עשויות להיות שכיחות ו חמורות יותר. אם אתה חוות תסמיין גמilia, יש לפנות לרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעעם** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפרגבלין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואאי, יתכן שלא תסבול מכך אפילו אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם אתה סובל מנופיחות בפנים או בלשון או מתגבה עורית חמורה (העור מאדים ומכתסה שלפלוחיות או מתקלף).

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביוטר משתמש אחד מעשרה):
סחרחות, תחושת נমום, כאבי ראש.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 מ/users מתקף):
• תיאבון מוגבר.

• תחושת התромמות רוח, בלבול, קשי הטעניות, ירידת בחشك המעי, רגונות.

• הפרעה ברכיז או בדיכרו, איבוד זיכרין, גמלוניות, רעד, הפרעה בדייבור, תחושת עקצוץ, חוסר/קහות תחושה, סדzieha, רדמת, נדודי שינה, עייפות, תחושה משתנה.

• טשטוש ראייה, ראייה כולה.
• ורטיגו, הפרעות בשינוי המשקל, נפילות.

• יובש בפה, עצירות, הקאות, גדים, שלשול, בחילות, בטן נפוצה.
• בעיות זקפה.

• נופיחות של הגוף, כולל הגפיים.

• תחושת שכוות, סגןון הליכה חריג.

• עלייה בממשק.

• התכווצויות שרירים, כאב מפרקים, כאבי גב וגפיים.

• כאב גרון.

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שמופיעות ב-1-10 מ/users מתקף):
• אובדן תיאבון, ירידת בממשק, רמה נמוכה של סוכר בדם, עליה ברמת הסוכר בדם.

• שינוי בתפיסת האדם את עצמו, אי שקט, דיכאון, חוסר מנוחה, שינוי מצב רוח, קושי במצב מילימ, היזות, חלומות
משונים, התקפי פאניקה, אפאתיה, תוקפנות, מצב רוח מרומם, הפרעה נפשית, קושי בחשיבה, עליה בחشك המני, בעיות
בתפקוד המני, כולל חוסר יכולת להגיא לפורקן מיני, עיכוב בשפייה.

- שינויים בריאותה כולל אובדן ראייה היקפית, ריצוף עיניים, הבזקי אוור, תנועות קופצניות, ירידת בתגבורות רפלקס, פעלתנות, סחרחות בעמידה, רגישות עורית, איבוד טעם, תחושת צריבה, רעד בתנועה, ירידת ברמת הכרה, אובדן הכרה, עלפון, רגשות מוגברת לרוש, תחושת מלחה.
- עיניים יבשות, נפיחות או כאב בעין, חולשת עיניים, עיניים דומות, עיניים בדופק, גירוי בעין.
- הפרעות בקצב הלב, קצב לב מוגבר, לחץ דם נמוך או גבוה, שינויים בדופק, כשל לבבי.
- הסמקה, גלי חום.
- קושי בנשימה, יובש באף, גודש באף.
- יצירת רוק מוגברת, צרבת, רדים מסבב לפה.
- העעה, פירחה, צמרמות, חום.
- עוויות שרירים, נפיחות במפרקים, קשייה שרירים, כאב כולל כאב שרירים, כאב צוואר.
- כאב בשדיים.
- קושי או כאב במתן שתן, בריחת שתן.
- חולשה, צמא, לחץ בחזה.
- שינויים בבדיקות דם ותקופוד כבד (עליה בקריאטינ פוספוקינאז בדם, עליה באנזימי כבד, ירידת בטסיות הדם, נויטרופניה, עליה בקריאטינין בדם, ירידת באשלגן בדם).
- רגשות יתר, נפיחות פנים, גרד, חרפת, נחלת, דימום מהאף, שיעול, נחירות.
- כאבים במוחזר החודשי.
- ידים ורגליים קרחות.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שሞיפות ב- 1-10 מעתמדים מתוך 10,000):

- חוש ריח חריג, תנודות ראייה, שינוי בתפיסת העומק, בהירות ראייה, איבוד ראייה.
- אישונים מורחבים, פזילה.
- זיעה קרה, תחושת היצרות בגרון, לשון נפocha.
- דלקת לבלב.
- קושי בבליעה.
- תנעות גופאיות יותר או מופחתת.
- קושי בכתיבה.
- בזקות באזורי הבطن.
- נזלים בריאות.
- עוויותות.
- שינויים בא.ק.ג התואמים להפרעות קצב לב.
- נזק לשדר.
- הפרשה מהשדיים, ההגדלת שדיים חריגה, ההגדלת שדיים אצל גברים.
- הפרעות במוחזר החודשי.
- כשל כליתי, ירידת בנפח השתן, אכזרת שתן.
- ירידת בספירת תא הדם הלבנים בבדיקה דם.
- התנהגות חריגה, התנהגות אובדןית, מחשבות אובדןיות.
- תגבות אלרגיות (עשויות להתרטא בקישי נשימה, דלקת עיניים [דלקת בקרנית] ותגובה עורית חמורה המאפיינת בכתמים עגולים, אדמדמים, לא מוגברים באזורי הגוף, אשר לעתים קרובות מלאוים בשלפוחיות במרקזם, התקלפות העור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניהם). לתופעות עוריות חמורות אלו יכולות להיות תופעות מקדיימות, כגון חום ותסמים דמיי שפעת (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, נמק אפידרמלי רעל).
- צהבת (הצהבה של העור ולובן העיניים).
- פרקיןנסונים, כולם תסמים של מחלה הפרקינסון כמו: רעד, בדיקינזיה (ירידה יכולת התנועה) וקשייה (נווקשות שרירים).

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמויפות בפחות מעתמד אחד מתוך 10,000):

- כשל כבד.
- דלקת כבד נגיפית (הפטיטיס).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחות טרם נקבעה):

- פיתוח תלות בפרגבלין
- לאחר הפסיקת הטיפול בפרגבלין (בין אם טיפול קצר או ארוך טווח) "יתכן שתחווה תסמים מסוימים שנקרוים תסמיini גמילה".
- ראאה סעיף 3 "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה").

תופעות לוואי מסוימות, כגון ישנונות, עשוויות להיות יותר שכיחות, כיוון שהולמים עם פגיעה בעמוד השדרה עשויים ליטול תרופות נוספת לטיפול בכאב וספסטיות, שהן תופעות לוואי דומות לאלו של פרגבלין וחומרתן עשויה לגבור כאשר אלו ייטולות יחד.

תופעות הלואין הבאות דווחו לאחר שיוקה של התרופה: קושי נשימתית ונשימות שטוחות.

אם הופעה תופעת לואין, אם אחת מתופעות הלואין מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לואין שלא צינה בעלון, עיר להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לואין ממשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואין עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעת לואין, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה למורותת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריה תאריך התפוגה המופיע על גבי האזיה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-25°C.

6. מידע נוספת

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Gelatine, starch pregelatinized, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), printing ink: shellac (E904), propylene glycol (E1520), strong ammonia solution (E527), potassium hydroxide (E525), black iron oxide (E172).

כמוסות פרגבליין דקסל 25 ו- 50 מ"ג מכילות בנוסף: אוטול.

כמוסות פרגבליין דקסל 50 מ"ג מכילות בנוסף: Allura red AC (E129), brilliant blue FCF (E133).

כמוסות פרגבליין דקסל 100, 75, 225, 200 ו- 300 מ"ג מכילות בנוסף:

Yellow iron oxide (E172), red iron oxide (E172)

כמוסות פרגבליין דקסל 100 ו- 300 מ"ג מכילות בנוסף: Black iron oxide (E172).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץזה:

פרגבליין דקסל 25 מ"ג: כמוסה בצעב לבן עליה מודפס 'DP25'.

פרגבליין דקסל 50 מ"ג: כמוסה בצעב לבן ואפור עליה מודפס 'DP50'.

פרגבליין דקסל 75 מ"ג: כמוסה בצעב לבן וחום עליה מודפס 'DP75'.

פרגבליין דקסל 100 מ"ג: כמוסה בצעב חום עליה מודפס 'DP100'.

פרגבליין דקסל 150 מ"ג: כמוסה בצעב כתום לבן עליה מודפס 'DP150'.

פרגבליין דקסל 200 מ"ג: כמוסה בצעב כתום ולבן עליה מודפס 'DP200'.

פרגבליין דקסל 225 מ"ג: כמוסה בצעב חום ולבן עליה מודפס 'DP225'.

פרגבליין דקסל 300 מ"ג: כמוסה בצעב חום ולבן עליה מודפס 'DP300'.

גודל אריזה מאושר: 56 כמוסות.

נערכ במאי 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פרגבליין דקסל 25 מ"ג: 158-72-34727-00

פרגבליין דקסל 50 מ"ג: 158-73-34728-00

פרגבליין דקסל 75 מ"ג: 158-74-34729-00

פרגבליין דקסל 100 מ"ג: 158-75-34730-00

פרגבליין דקסל 150 מ"ג: 158-76-34731-00

פרגבליין דקסל 200 מ"ג: 158-77-34732-00

פרגבליין דקסל 225 מ"ג: 158-78-34733-00

פרגבליין דקסל 300 מ"ג: 158-79-34695-00

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

צורך ובעל רישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל.