

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תק Shirim) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על-פי מרשם רפואי בלבד

**אורוקמבי 100 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות
אורוקמבי 200 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות**

חומרים פעילים וכמותם
אורוקמבי 100 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות
כל טבלייה מצופה מכילה:
100 מ"ג לומקפטור (lumacaftor)
125 מ"ג איבקפטור (ivacaftor)

אורוקמבי 200 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות
כל טבלייה מצופה מכילה:
200 מ"ג לומקפטור (lumacaftor)
125 מ"ג איבקפטור (ivacaftor)

חומרים בלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוספים". ראה גם "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בסעיף 2.

קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזין להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אורוקמבי (لومקפטור ואיבקפטור) משמשת לטיפול ארוך טווח בליפת כיסיתית (סיסטיק פיברוזיס-CF) במטופלים בני 6 שנים ומעלה שיש להם שינוי ספציפי (שנקרא מוטציה F508del) המשפע על הגן לחלבון cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), אשר הינו בעל תפקיד חשוב בויסות זרימת הריר בריאות. אנשים עם המוטציה יוצרים חלבון CFTR פגום. אורוקמבי ניתנת למטופלים בהם שני העותקים של גן CFTR הנמצאים בתא מושפעים מהמוטציה F508del.

אורוקמבי הינה טבלייה אחת המכילה שני מוצרים פעילים, לומקפטור ואיבקפטור. שני אלו פעילים יחד כדי לשפר את תפקוד חלבון CFTR הפגום. לומקפטור מגדיל את כמות ה- CFTR הקיימת וアイבקפטור עוזר לחלבון CFTR הפגום לפועל בצורה יותר תקינה.

קבוצה תרפואיית: לומקפטור - מתן CFTR
איבקפטור - פוטנציאטור של חלבון CFTR

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (איבקפטור או לומקפטור) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוספים").

اذhorot miyadot nognutot leshimosh batrufa
היוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת אורוקמבי.

אורוקמבי מיועדת אך ורק למטופלים בעלי שני עותקים של המוטציה F508del בגן CFTR.

לפני הטיפול באורוקמבי ספר לרופא אם נאמר לך בעבר כי אתה סובל ממחלת כבד או כלות, יתכן שייהיה על הרופא להתאים את המינון של אורוקמבי עבורה.

רמת חריגות של אנדמי כבד בבדיקות דם נהוא באופן שכיח בחלק מהמטופלים המקבלים אורוקמבי. פנה לרופא מיד עם הופעת אחד התסמינים הבאים העשויים להיות סימן לביעות בכבד:

- כאב או אי-נוחות באזורי הבطن ימין או מרכזית העליונה
- הצחהה של העור או של החלק הליכון של העיניים

- חוסר תיאבן
- בחילות או הקאות
- שטן כהה
- בלבול

אורקמבי אינה מומלצת במטופלים שעברו השתלת איברים.

דיכאון (כולל מחשבות והתנהגות אובדן) אשר בדרך כלל התחיל תוך 3 חודשים הטיפול הראשונים, דוח בחולים בעת נטילת אורקמבי. פנה מיד ל佗א אם אתה (או מישחו הנוטל את התרפיה) חוות אחד מהתסמים הבאים: מצב רוח רע או شيء במצב הרוח, חרדה, תחושות של אי נוחות רגשית או מחשבות על פגעה עצמה או על להתאבד, אשר עלולים להוות סימנים של דיכאון.

ילדים

טבליות אורקמבי אין מיועדות לשימוש ילדים מתחת לגיל 6 שנים.

בדיקות ועקב

הרופא יעורר לך מספר בדיקות דם כדי לבדוק את תפקוד הגוף לפני ובמהלך הטיפול באורקמבי, בעיקר במהלך השנה הראשונה.

הפרעות במערכת נשית, כגון קוצר נשימה או לחץ בחזה או היצרות דרכי הנשימה נראים במקרים רבים ליטול אורקמבי. במיוחד במקרים עם תפקודי ריאה ירודים. אם אתה סובל מתפקוד ריאתי ירוד, הרופא שלך עשוי לבצע מעקב לעתים קרובות יותר לאחר התחלת הטיפול באורקמבי.

עליה לחץ דם נצפתה בחלק מהמטופלים באורקמבי. הרופא שלך עשוי לנטר את לחץ הדם שלך במהלך הטיפול באורקמבי.

פגיעה בעדשת העין (קטרקט) ללא השפעה על הראייה, נצפתה בחלק מהילדים ובני הנעור שטופלו עם אורקמבי או איבקפטור (אחד מהמרכיבים באורקמבי).

הרופא שלך עשוי לבצע בדיקות עיניים לפני ובמהלך הטיפול באורקמבי.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופותיו
אם אתה לוקה, לוקח, לא תפסיק או אם אתה עשוי לקחת, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על קר ל佗א או לרוקה. במקרה אם אתה לוקה:

- תרופות אנטיבiotיות (משמשות לטיפול בziehoms חידקים) כגון טליתרומיצין, קלריטרומיצין, ריפאמיצין, ריפאבטון, ריפאפנטין ואրיתромיצין
- תרופות לטיפול בפרכוים (משמשות לטיפול בהתקפים אפילפטיים) כגון פנברביטל, קרבמזהן ופניטואין
- בהזודיאזפינים (משמשים לטיפול בחרדה, הפרעות שינה ואי שקט) כגון מיזאצולם וטריאזולם
- תרופות אנטי פטרייטיות (המשמשות לטיפול בziehoms פטרייטים) כגון פלקונוזול, קטוקונוזול, איטרkonוזול, פוסקונוזול ווירקונוזול
- מדכאי מערכת חיסון (בשימוש לאחר השתלה) כגון ציקלוספורין, אברולימוס, סיורולימוס וטאקROLימוס
- צמחי מרפא כגון פרע מחורר (הפריקום פרופוטום)
- תרופות אנט-אלרגיות (משמשות לטיפול באלהיות / או אסתמה) כגון מונטולוקסט ופקסופנאנן
- תרופות נוגדות דיכאון (משמשות לטיפול בדיכאון) כגון ציטאלופראם, אסציטאלופראם, סרטראליין ובופרופין
- תרופות אנט-דלקתיות (משמשות לטיפול בדלקת) כגון איבופרופין
- חוסמי הקולין H2 (משמשות להפחטה בחומצת קיבה) כגון ראנטיידין
- גליקוזידים של הלב (משמשים לטיפול באיספיקת לב וקצב לב חריג הנקרא פרפור פרוזידרים, בחומרה קלה עד בינויו) כגון דיאגוקסין
- נוגדי קרישא (משמשים למניעת היוציארות או גדיית קרישי דם בדם ובכלי הדם) כגון וורפארין ודאביגטראן
- אמצעי מנעה הורמוניים (משמשים למניעת הירון) הניתנים דרך הפה, בהזרקה, אמצעי מנעה מושתלים, מדבקות לעור, שכוללים אתנית אסטרדיול, נוראantineדרון ופרוגסטרונים אחרים. אין להסתמך על אמצעים אלו למניעת הירון בזמן השימוש באורקמבי
- קורטיקוסטרואידים (טיפול בדלקת) כגון מתילפרדנסולון ופרדנסון
- מעכבי משאבת פרוטונים (משמשים לטיפול בהחזר וושט ויכבים) כגון אומפרזול, אסומפרזול ולאנסופרזהול

- תרופות להורדת רמות הסוכר בدم הניתנות דרך הפה (משמשות לשילטה בסוכרת סוג 2) כגון רפאליניד

קיימים דיווחים על תוצאות חיוביות שגויות בבדיקה שתן להימצאות טטרהיידרוכובינול (THC – רכיב פעיל בקנאביס) במטופלים הנוטלים אורקמב. יתכן שהרופא שלך בקש בדיקה נוספת על מנת לאמת את התוצאה.

שימוש בתרופה ומזון
נטילת אורקמב עם מזון המכיל שומן חשובה על מנת לקבל רמות נכונות של התרופה בגוף. יש לאכול ארוחה שומנית או חטף המכיל שומן מיד לפני או מייד אחרי נטילת אורקמב. ארוחות וחטפים מומלצים בהנחיות לטיפול ב- CF או ארוחות המומלצות בהנחיות תזונה רגילה מילוט כמות מספקת של שומן. דוגמאות אחרות למזון המכילים שומן הין ארוחות הכוללות חמאה, שמנים או ביצים.

- גבינות, חלב מלא, מוצרים מחלב מלא
- בשרים, דגים עם ריכוז שומן גבוה
- אבוקדו, חומוס, מוצרים על בסיס סודה (טופו)
- חטיפי אנרגיה או משקאות

הירין והנקה
אם את בהירין או מיניקה, חשוב שתאת בהירין, או מתכונת להיכנס להירין היועצי ברופא לפני השימוש בתרופה. יתכן שעדייף יהיה להימנע משימוש באורקמב בזמן הירין במידת האפשר. הרופא יסיע לך לקבל החלטה מה יהיה הטיפול הטוב ביותר עבורך ועבור תינוקך.

לומקפטור או איבקפטור מופרשים בחלב אם. אם את מתכונת להניק, היועצי ברופא לפני נטילת אורקמב. הרופא יחליט האם להמליץ לך להפסיק את הטיפול בלומקפטור/איבקפטור. הרופא ישוקל את התועלות שבנהנקה עברו תינוקך מול תועלות הטיפול עבורך.

הגיגת השימוש במכונות
סחרחות דזוזה במטופלים שקיבלו איבקפטור, אחד המרכיבים של אורקמב, יכול להשפיע על יכולת לנוגג או להשתמש במכונות. אם אתה חווית סחרחות, אין לנוגג או להשתמש במכונות עד שתסתמנים אלו. יעלמו.

אם ילך חווית סחרחות בזמן נטילת אורקמב, מומלץ שהילד לא ירכב על אופניים או יעשה כל דבר אחר הדורש תשומת לב מלאה, עד שהסתמנים שלו יעלמו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה פחתות מ"ג נתרן במנה, כך שלמעשה התרופה נחשבת כ"נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעוון בוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. **המינון המקבול** למטופלים מגיל 6 ומעלה בדרך כלל הוא 2 טבליות בבוקר ו 2 טבליות בערב (12 שעות הפרש), סה"כ 4 טבליות ליום, יש לקחת עם מזון שמכיל שומן.

ישנם מינונים שונים של טבליות אורקמב עברו קבוצות גיל שונות. בדוק שקיבלת את הטבלייה הנכונה (להלן).

גיל	טבליות	מינון
6 עד 11 שנים	אורקמב 100 מ"ג/125 מ"ג 2 טבליות בבוקר 2 טבליות בערב	
12 שנים ומעלה	אורקמב 200 מ"ג/125 מ"ג 2 טבליות בבוקר 2 טבליות בערב	

אם אתה סובל מבעיות כבד ברמה מתונה עד חמורה, יתכן שהרופא יפחית את המינון של אורקמב, כיוון שהכבד שלך אינו מפנה את אורקמב באוותה מהירות כמו באנשים שאינם סובלים מבעיות בתפקוד הכבד.

- בעיות כבד מתונות: יתכן שהמיןון יופחת לשתי טבליות בבוקר וטבלייה אחת בערב.
- בעיות כבד חמורות: יתכן שהמיןון יופחת לטבלייה אחת בבוקר וטבלייה אחת בערב.

אין לעבר על המנה המומלצת.

יש לבלוע את התרופה בשלמותה. אסור לילעום, לשבור או להמיס את הטבליות.
ניתן להתחליל לקחת אורקםבי בכל אחד מימיות השבוע.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר אתה עלול לחוות תופעות לוואי כולל אלו המוזכרות בסעיף 4 בהמשך. אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעל יلد מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אחר.

אם שחתת ליטול תרופה זו בזמן הדירוש וטרם חלפו 6 שעות מהמועד בו הייתה אמורה לקחת את התרופה, קח את המנה שנשכחה עם מזון המכיל שומן. לאחרת יש לילג על המנה שנשכחה. יש ליטול את המנה הבאה במועד הקבוע. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפחות על המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את נתילת התרופה ללא היוזמות ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באורקםבי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת משתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מ אף אחת מהן. תופעות הלואו שדווחו עם אורקםבי ואייקפטור בלבד (אחד המרכיבים הפעילים של אורקםבי), מפורטות להלן ועלולות להופיע בעת שימוש באורקםבי.

תופעות לוואי חמורות עברו אורקםבי כוללות עלייה ברמת אנזימי כבד בدم, פגעה בכבד, והחמרה של מחלת כבד חמורה קיימת. ההחמרה בתפקוד הכבד עלולה להיות קטלנית. תופעות לוואי חמורות אלו אין שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 אנשים).

דווח לרופא מיד אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים:

- כאב או אי נוחות בבטן הימנית העליונה
- הצהבה של העור או בלבן של העין
- אובדן תיאבון
- בחילות או הקאות
- בלבול
- שטן כרה

דיכאון

הסימנים לכך כוללים מצב רוח רע או שינוי במצב הרוח, חרדה, תחושות של אי נוחות רגשית.

תופעות לוואי נוספת

תופעות לוואי שכיחות מבודד (מופיעות ביותר משתמש אחד מעשרה)

- שיעול עם ליחה
- גודש באף
- קווצר נשימה
- כאב ראש
- כאב בطن
- שלשול
- עלייה בכמות הלילה
- בתיילה
- הצטננות*
- סחרחות*
- שינויים בסוג החידקים בריר*

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100)

- לחץ בחזה
- היצרות דרכי הנשימה
- גודש בסינוים*
- נזלת או אף סתום
- דלקת בדרכי הנשימה העליונות
- כאב גרון

- אדרומיות באוזן*
- פריחה
- גזים
- הקאות
- עליה באצימים בدم (קראטין פוספורינאז בדם)
- רמות גבוהות של אנזימי כבד בבדיקות הדם
- מחזר לא סדר (וות) או כאב עם וות*
- כאב אוזניים, אי נוחות באוזן*
- צלצולים באוזניים*
- אדרומיות בתוך האוזן*
- הפרעת האוזן הפנימית (תחושת סחרחות או ספינינג)*
- גוש בשד*

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000)

- וות חריגה, העדר וות או וות נדירה או וות תכופה יותר או דימום וותי כבד יותר
- עליה בלחץ הדם
- גודש באוזן*
- דלקת בשד*
- הגדלה של השדים בגברים*
- שינוי או כאב בפטמה*

* תופעות לוואי שנצפו עם איבקפטור לבדו.

תופעות לוואי בילדים

תופעות הלואוי שנצפו אצל ילדים דומות לאלו שנצפו במבוגרים ובמבוגרים. עם זאת, רמות גבוהות של אנזימי כבד בדם נצפו בשכיחות גבוהה יותר בילדים מאשר במבוגרים.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדוח על <https://sideeffects.health.gov.il> או על ידי כניסה לקישור: www.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוויה ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש באורקמבי אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הקרטון והתוויות. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

אחסן מתחת ל-30°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:
• ליבת הטבליה מכילה:

microcrystalline cellulose, hypromellose acetate succinate USP/NF, croscarmellose sodium, povidone K30, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate.

- ציפוי הטבליה מכיל 85F140026 (pink) opadry II (pink)
- צבע הdadפס מכיל S-1-17823 opacode black,

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזידה

אורקמבי 100 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות

טבליה ורודה בצורה אובלית, עם הדפס של "V125" בשחור על צד אחד וצד אחר חלק.

אורוקמבי 200 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות
טבלייה ורודה בצורה אובלית, עם הדפס של "2V125" בשחור על צד אחד וצד אחר חלקי.

כל אחד מהחזקים של אורוקמבי מגיע באירועה המכילה 112 טבליות מצופות (4 אריזות של 28 טבליות מצופות)

בעל הרישום וכתובתו
ורטקס פרמאסוטיקלസ (יו.ק"י) לימיטד
רחוב ריב"ל 7, תל אביב-יפו, ישראל

שם היצרן וכתובתו

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited
2 Kingdom Street, London, W2 6BD, United Kingdom

נערך במאי 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות
אורוקמבי 100 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות: 161-99-35506
אורוקמבי 200 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות: 157-84-34839

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.