

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

עלון לצרכן לתכשיר וטרנרי | התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרנרי בלבד | לשימוש בבעלי חיים בלבד

- שם התרופה הווטרנרית, צורתה וחוזקה**

Partovet Veterinary פרטווט וטרינרי

- חומרים פעילים וריכוזם ביחידת מינון**

כל 1 מ"ל מכיל 10 יב"ל אוקסיטוצין סינתטי.

- למה מיועדת התרופה?**

פרטווט מותווה להחשת תהליך ההמלטה, סילוק שלה, הגברת מתן חלב לאחר ההמלטה בכפות, סוסות, עזים, כבשים, כלבות, חתולות וחזירות.

אוקסיטוצין הינו הורמון המשפיע על שרירי הרחם בשלבים האחרונים של ההריון, במהלך ההמלטה ומספר ימים לאחר מכן.

קבוצה תרמיטית: הורמונים סינתטיים לשימוש וטרינרי

- התוויות נגד**

באם ידועה רגישות יתר לחומר הפעיל, או לחומרים הבלתי פעילים יש להימנע מטיפול בתכשיר זה.

השימוש בתכשיר זה אסור בחיות עם אי בשלות של צואר הרחם, דיספוזיציה של העובר, עובר גדול מהרגיל, מחלות קרדיו-וסקולוריות או לנקבות עם רקע של קריעה של הרחם.

יש לתת את התרופה בזehירות בעת טוקוסמיה, או בעת שאין הרחבת צוואר הרחם.

- תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מבעלי החיים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ובעל החיים לא יסבול מאף אחת מהן. תרופה זו יכולה לגרום לתגובות אלרגיות.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il.

- חיות מטרה**

פרות, סוסות, עזים, ככשות, כלבות, חתולות וחזירות.

- צורת המתן והמינון עבור כל חיית מטרה**

פרטווט ניתן בהזרקה תוך-שרירית, תת-עורית או תוך-ורידית (בהזרקה תוך-ורידית יש להשתמש במחצית המינון הרגיל ובמידת הצורך לדلل כמים להזרקה).

סוסות ופרות 6-4 מ"ל | חזירות 4-2 מ"ל

כבשים ועזים 2-1 מ"ל | כלבות וחתולות 1-0.25 מ"ל

ניתן לחזור על הטפול במידת הצורך מדי 40 דקות.

- אופן השימוש בתכשיר**

הערה: בעת המלטה יש להגיע להרפיה מוחלטת של צואר הרחם באופן טכעי או באמצעות אסטרוגן לפני מתן אוקסיטוצין.

- זמן המתנה**

0 ימים.

- אזהרות**

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחיית מטרה

אין.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים

מתן בווריד של התריפה יש לתת באיטיות רבה ובעדיפות תוך מתן אינפוזיה של גלוקוז או של סליין.

השתמש בזehירות בעת טוקסמיה.

תִּם תְּחִיד ‏שׁוּבְּעָה זֶהָ הַנְּשֵׂרָה מִן כִּיל זֹרָרָה הַשְׁכָּה וּמָמְת הַזֹּרָרָה בְּחִשׁ מִצֻּמַּיִן הַנְּשֵׂרָה וּמִוָּפָּאָה עִלְיָהּ.

נִשְׂרָה הַמְּשֻׁתְּחָל לַמְּשַׁחֲרָ בִּיטְרִי | יִסּוֹף הַדּוּאָה תֵּבָּעָ לְוִשְׁפָּה תִּיבִּי בִּיטְרִי כִּפְּט | לְלִאסְתְּחָמ לְדֵי הַחַיּוּנָת כִּפְּט

- אסם הדּוּאָה הַבִּיטְרִי, שִׁכְלֶה וּמְדֵי מִפְּעוּלֶה**

Partovet Veterinary פּאַרְטוֹוֶט בִּיטְרִי

- הַמוֹדָּ הַפְּעָלָה וְתַרְכִּיזָּהּּאִי וּחְדָּה תְּגְרִיעַ**

יִכְתוּי כָּל 1 מִל עָלִי 10 וּחְדָּת דּוּלְטָּה מִן הַאֹוּכְסִיטּוֹסִין הַאִשְׁמְנָעִי.

- הַאִי עֶרֶשׁ כְּחֻסַּס זֶהָ הַדּוּאָה?**

יִתֵּם אִסְתְּחָמ פּאַרְטוֹוֶט לְתַסְרִיע עִמְלִיָּה הַוּלָדָה, וּיְרוּג הַמְשִׁמָּה, וּזְיָדָה אִנְתָּח הַחֵילִב בַּעַד הַוּלָדָה פִּי הַבְּקָרָת וְאִנָּת הַחַיּוּל וְאִנָּת הַמָּעַז וְאִנָּת הַחֶרָפ וְהַכִּלְבָּת וְאִנָּת הַקֶּחַט וְאִנָּת הַחַנְזָיִיר.

הַאֹוּכְסִיטּוֹסִין הוּ הֶרְמוֹן יוֹזְרָה עָלִי עִשֻׁלָּת הַרַחַם כְּלָחַל הַמְרָחַל הָאַחִירָה מִן הַחַמֵּל, וְכְלָחַל הַוּלָדָה וְעָלִי מְדָר בֻּשְׁעָה אַיָּם בַּעַד זֵלְךְ.

הַפְּשִׁילָּה הַעֲלָגִיָּה: הֶהֳרַמוּנָת הַאִשְׁמְנָעִיָּה לְלִאסְתְּחָמ הַבִּיטְרִי

- מְוָנַע הַאִסְתְּחָמ**

פִּי חָלָה וְיּוּד הַחִסָּאסִיָּה מִפְּרָטָה מִעֻרּוּפָה לְלַמָּדָה הַפְּעָלָה אוּ לְלַמוּדָה גַּיַר הַפְּעָלָה, יִתְעַיֵּן הָאִמְנָתַע עַן תְּקַדִּימ הַעֲלָח בְּהַזָּ הַמְּשַׁחֲרָ.

מְמוּנַע אִסְתְּחָמ זֶהָ הַמְּשַׁחֲרָ לְעֲלָח אִנָּת הַחַיּוּנָת הַתִּי עֵנַאי מִן אַי מְנָהּ. קִד יִסְבֵּיב זֶהָ הַדּוּאָה רְדוּד הַפְּעַל הַתְּחַסָּיָּה. בַּהִמְלָכָּ אִבְלָאג וְזָרָרָה הַשְׁכָּה עַן אַעְרָשׁ גַּאיבִּיָּה בַּלְשֻׁמַּץ עָלִי הַרָאָב "הַאִבְלָאג עַן אַעְרָשׁ גַּאיבִּיָּה עַקֵּב הַעֲלָח הַדּוּאָתִי" הַמּוּגוּד

פִּי הַשְּׁפָחָה הַרַנְשִׁיָּה לְמוּקַע זָרָרָה הַשְׁכָּה (www.health.gov.il) וְהַזֵּי יּוּכָּהֶךְ אֵלִי הַאִסְמָרָה מְתַשְׁלָּה לְאִבְלָאג עַן הַאַעְרָשׁ

גַּאיבִּיָּה, אוּ עַן תִּרְיָק דַּחּוּל הַרָאָב: https://sideeffects.health.gov.il

- הַאַעְרָשׁ הַגַּאיבִּיָּה**

מְתָל אִי דוּאָה, קִד יִסְבֵּיב אִסְתְּחָמ זֶהָ הַדּוּאָה אַעְרָשָׂא גַּאיבִּיָּה לְדֵי בַעֲשׁ הַחַיּוּנָת.

לֹא תִלְקֹץ עַנד קְרָאָה קָאנְמָה הַאַעְרָשׁ הַגַּאיבִּיָּה. קִד לֹא יַעֲנַי הַחַיּוּן מִן אִי מְנָהּ. קִד יִסְבֵּיב זֶהָ הַדּוּאָה רְדוּד הַפְּעַל הַתְּחַסָּיָּה.

בַּהִמְלָכָּ אִבְלָאג וְזָרָרָה הַשְׁכָּה עַן אַעְרָשׁ גַּאיבִּיָּה בַּלְשֻׁמַּץ עָלִי הַרָאָב "הַאִבְלָאג עַן אַעְרָשׁ גַּאיבִּיָּה עַקֵּב הַעֲלָח הַדּוּאָתִי" הַמּוּגוּד פִּי הַשְּׁפָחָה הַרַנְשִׁיָּה לְמוּקַע זָרָרָה הַשְׁכָּה (www.health.gov.il) וְהַזֵּי יּוּכָּהֶךְ אֵלִי הַאִסְמָרָה מְתַשְׁלָּה לְאִבְלָאג עַן הַאַעְרָשׁ הַגַּאיבִּיָּה, אוּ עַן תִּרְיָק דַּחּוּל הַרָאָב: https://sideeffects.health.gov.il

- הַחַיּוּנָת הַמְּשֻׁתְּחָה**

הַבְּקָרָת וְאִנָּת הַחַיּוּל וְאִנָּת הַמָּעַז וְאִנָּת הַחֶרָפ וְהַכִּלְבָּת וְאִנָּת הַקֶּחַט וְאִנָּת הַחַנְזָיִיר.

אִזְהָרוֹת מִיּוּחַדּוֹת הַנוּגְעוֹת לִבְטִיחּוֹת הָאָדָם הַמְּטֻפּל בְּתַכְשִׁיר

אַנְשִׁיִּם בַּעֲלֵי רָגִישׁוֹת יְדוּעָה לְאַחַד מְמַרְכִּיבֵי הַתַּכְשִׁיר צְרִיכִים לְהַמְנַע מִמְנַע עִם הַתַּכְשִׁיר.

אִין לְתַת אֶת הַתְּרוּפָּה עַל יַד אִישָׁה בַּהֲרִיּוּן.

לְכַשׁ כִּפְפוֹת בַּעַת הַשִּׁמּוּשׁ בְּתְרוּפָּה.

יִשׁ לְהִימְנַע מִמְנַע עִם הַעוּר והַעַיִנִּים, בְּמַקְרָה שֵׁל מִגְע יִשׁ לַשְׁטוֹף מִיִּידִית כַּכּמוֹת גְּדוּלָה שֵׁל מִים.

יִשׁ לְהִיזָּהר מֵאֵד מֵהַזְרָקָה עִצְמָאִית שֵׁל הַתְּרוּפָּה, אַחֲרֵי הַזְרַקַּת הַתַּכְשִׁיר יִשׁ לְקַבֵּל יִיעוּץ רְפוּאִי וְלִהָרְאוֹת אֶת עֵלּוּן הַתַּכְשִׁיר לְרופֵא הַמְּטֻפּל.

הֲרִיּוּן וְהַנְּקָה

לֹא לְשִׁימוּשׁ בְּנַקְבוֹת בַּהֲרִיּוּן לִפְנֵי הַסִּימָנִים הָרָאשׁוֹנִים שֵׁל הַהַמְלָטָה.

תְּנוּבוֹת עִם תְּרוּפוֹת אַחֲרוֹת וְסוּגִים אַחֲרִים שֵׁל אִינֶטְרָאקְצִיָּה

אִין לְהַשְׁתַּמֵּשׁ בְּתַכְשִׁיר זֶה עִם תַּכְשִׁירִים קוֹרְטִיקוֹסְטְרוֹאִיִּידִים, תְּרוּפוֹת מְכוּוּצוֹת כְּלִי דָם סִימְפְּטוֹמְטִים, חוֹמּוּרֵי אַלְחוּשׁ, סִידָן, אִסְטְרוֹנִגִּים וּפְרוֹסְטַגְלַנְדִּינִים יְכוּלִים לְהַגְבִּיר אֶת הַשַּׁפְעַת הַתְּרוּפָּה.

מִינוּן יְתָר

מִינוּן יְתָר יְכוּל לַגְרוּם לִגְרוּי יְתָר וְלַהַתְכוּוּצִיּוֹת שֵׁל תְּשׁוּרוֹת הָרַחַם, הַפְּרָדָת שְׁלִייה מוּקֻדְמַת, קַצֵּב לִב אִיטִי וְהַפְּרַעוֹת בְּקַצֵּב הַלֵּב, יְתָר לַחַץ דָם וְאִפִּילוּ מוּוֹת שֵׁל הָאֵם וְהַעוּבֵר. הַהֲרַעְלָה בְּשׁל אִצִּירַת מִים מְתָאִפִּייַת בַּהַתְכוּוּצִיּוֹת, הַלֵּם וְאִפִּילוּ מוּוֹת שֵׁל הָאֵם לְאַחַר מִתָּן IV מְמוּשָׁךְ שֵׁל מְנוֹת גְּבוּהוֹת שֵׁל הַתְּרוּפָּה.

יְכוּל לַגְרוּם לְדִימוּם לְאַחַר הַהַמְלָטָה.

חוּסֵר הַתָּאמָה

בְּהַעֲדָר מַחֲקָרִים לְגְבִי הַתָּאמָה אִין לְעַרְכֵּב תַּכְשִׁיר זֶה עִם תַּכְשִׁירִים וְטְרִינְרִיִּים אַחֲרִים.

- הוּרָאוֹת אַחֲסוּן**

● מְנַע הַרַעְלָה! תְּרוּפָּה זוֹ וְכֹל תְּרוּפָּה אַחֲרַת יִשׁ לְשַׁמוּר בְּמַקּוּם סָגוּר מְחוּץ לְהִישָׁג יָדָם שֵׁל יִלְדִים וְאוּ תִינוּקוֹת וְעַל יַדֵּי כַךְ תִּמְנַע הַרַעְלָה.

● אִין לְהַשְׁתַּמֵּשׁ בְּתְרוּפָּה אַחֲרֵי תֵאַרִיךְ הַתַּפּוּגָה (Exp. Date) הַמוּכִיעַ עַל גְבִי הָאִרְיָה.

● תֵאַרִיךְ הַתַּפּוּגָה מֵתִיחַס לַיּוֹם הָאַחֲרוֹן שֵׁל אוֹתוֹ הַחוּדָשׁ.

תַּנְאֵי אַחֲסוּן:

● יִשׁ לְאַחֲסַן בְּמַקּוּם קָרִיר וְיִבֵּשׁ, מִתַּחַת ל 25°C, מוּגֵן מְאוּר.

● יִשׁ לְהַרְחִיק מִיָּדָם שֵׁל יִלְדִים.

● לְאַחַר פְּתִיחָה הָרָאשׁוּנָה יִשׁ לְהַשְׁתַּמֵּשׁ בְּתַכְשִׁיר בְּתוֹךְ 28 יָמִים, מַעֲבַר לֹזֶה יִשׁ לְהַשְׁמִיד אֶת הַשַּׁרְיּוֹת.

- הוּרָאוֹת בְּדַבַּר הַשְּׁמַדַּת הַתַּכְשִׁיר / שאַרְיּוֹת הַתַּכְשִׁיר בְּתוּם הַשִּׁימוּשׁ**

יִשׁ לְהַשְׁמִיד כָּל שאַרִית שֵׁל תְּרוּפוֹת וְטְרִינְרִיּוֹת אוּ חוֹמּרִים שְׁמוּקְרִים בְּתַכְשִׁירִים וְטְרִינְרִיִּים בְּהַתָּאֵם לְהוּרָאוֹת הַהַשְּׁמָדָה שֵׁל הַמְּשַׁרְד לְאִיכּוֹת הַסְּבִיבָּה.

- מִידַע נוֹסָף**

● **נוֹסָף עַל הַחוֹמֵר הַפַּעִיל הַתַּכְשִׁיר מְכִיל גָם:** Benzyl alcohol (E1519), Chlorobutanol hemihydrate, Ethanol, Sodium chloride, Acetic acid, Water for injection.

● **כִּיְצַד נְרָאִית הַתְּרוּפָּה וְמה תּוּכַן הָאִרְיָה:** תְּמִיסָה צְלוּלָה בְּכַבּוּקִים בְּנַפְחִים שׁוּנִים: 10, 50, 100, 250 מ"ל.

● **מַסְפַּר רִישׁוּם הַתְּרוּפָּה:** 083-47-92369

● **שֵׁם הַיְצָר:** דִּיּוּסָה פְּרַמַּאבִּיק, בְּרַצְלוּנָה, סְפָרַד.

● **שֵׁם בַּעַל הָרִישׁוּם:** אַם.פִּי.וֹס. בַּע"מ, ת.ד. 7004, פַּתַּח תְּקוּוּהָ, 49170.

נַעֲרָךְ בִּיּוּל, 2021 בְּהַתָּאֵם לְהַנְחִיּוֹת מְשַׁרְד הַבְּרִיאוֹת

- כִּיפִיָּה אִיעָטָא וְהַגְרַעָה לְכָל מִן הַחַיּוּנָת הַמְּשֻׁתְּחָה**

יִעָטִי בַּרְטוֹוֶיַת בַּלְחַפֵּן פִּי הַעִשֻׁלָּה אוּ תַחַת הַגְּלָד אוּ פִּי הַוּרִיד (עַנד הַחַפֵּן פִּי הַוּרִיד יִגְבֵּב אִסְתְּחָמ נִשְׁפַּ הַגְרַעָה הַמְעַתָּדָה וְתַחְפִּיפָּהּ בַּלְמֵאָ לְחַפֵּן אִזָּא דַּעַת הַחָאָגָה).

אִנָּת הַחַיּוּל וְהַבְּקָרָת 4-6 מִל | אִנָּת הַחַנְזָיִיר 2-4 מִל

אִנָּת הַחֶרָפ וְאִנָּת הַמָּעַז 1-2 מִל | הַכִּלְבָּת וְאִנָּת הַקֶּחַט 0.25-1 מִל

יְמַכֵּן תְּכַרֵּר הָעֲלָח אִזָּא לְזַם הָאָמֵר כָּל 40 דְּקִיפָּה.

- כִּיפִיָּה אִסְתְּחָמ הַמְּשַׁחֲרָ**

הַמְלַחֲשָׂה: כְּלָחַל הַוּלָדָה, יִגְבֵּב תַּחְפִּיק הַאִסְרַחָא הַכָּמֵל לַעֲנַף הַרַחַם אִמָּא בְּשִׁכַּל תַּיְבִּיעִי אוּ עַן תִּרְיָק אִסְתְּחָמ הָאַסְטְרוֹגִיַּין וְזֵלְךְ קַבֵּל אִיעָטָא הָאֹוּכְסִיטּוֹסִין.

- מְדָה הָאִנְתָּזָר**

0 אַיָּם.

- הַתַּחְזִירָת**

תַּחְזִירָת חָאִסָּה תֵתְלַץ בַּלִּאסְתְּחָמ לְעֲלָח הַחַיּוּן הַמְּשֻׁתְּחָ

מָא מִן תַּחְזִירָת.

תַּחְזִירָת חָאִסָּה תֵתְלַץ בַּלִּאסְתְּחָמ הָאָמֵן לְלַדּוּאָה לְעֲלָח הַחַיּוּנָת

עַנד חַפֵּן הַדּוּאָה פִּי הַוּרִיד, יִגְבֵּב הַמוּאָזִיָּה עָלִי הַחַפֵּן בְּשִׁכַּל בַּטִּיָּה גְּדָא בַּלְתְּזָמֵן מַע תְּסְרִיב הַגְּלוּקוּז אוּ הַמְּחַלוּל הַמְּלַחִי.

תּוּחַ הַחֲזָר עַנד אִסְתְּחָמ הַמְּשַׁחֲרָ פִּי חָלָה הַאִשָּׁבָה בְּתִסְמַם הַדָּם.

תַּחְזִירָת חָאִסָּה תֵתְלַץ בְּסָלָמָה הַשְּׁחַשׁ הַזֵּי יַקְדִּם הָעֲלָח בַּלְמְשַׁחֲרָ

יִגְבֵּב עָלִי הָאַשְׁחָשׁ זְוֵי הַחִסָּאסִיָּה מִעֻרּוּפָה לְאַחַד מְרַקְבָּת הַמְּשַׁחֲרָ תַּגְּבֵּב מְלַמָּסָה הַמְּשַׁחֲרָ.

מְמוּנַע אִיעָטָא הַדּוּאָה מִן קַבֵּל אַמְרָא חָאמֵל.

אַרְתִּי הַקִּפָּזָת עַנד אִסְתְּחָמ הַדּוּאָה.

יִגְבֵּב תַּגְּבֵּב הַתִּמָּאֵן מֵע הַגְּלָד וְהַעַי

الجرعة المفرطة

يمكن للجرعة المفرطة أن تسبب التهيّج المفرط والتقلصات لعضلات الرحم، والانفصال المبكر للمشيمة، ويطء معدل ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم وحتى وفاة الأمّ والجنين. ويتميّز التسمّم بسبب احتباس الماء بالتشنّجات والصدمة وحتى وفاة الأمّ وذلك بعد إعطاء جرعات عالية من الدواء عن طريق الوريد لفترة طويلة.

قد يسبب المستحضر النزيف بعد الولادة.

عدم التوافقية

نظرًا لعدم وجود دراسات بخصوص التوافقية، لا يجوز خلط هذا المستحضر مع مستحضرات بيطرية أخرى.

11. تعليمات التخزين

• امنع التسمّم! يجب الاحتفاظ بهذا الدواء وبأيّ دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الأطفال الرضع وهكذا سوف تمنع التسمّم.

• لا يجوز استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) الوارد على العبوة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر ذاته.

ظروف التخزين:

• يحتفظ به في مكان جافّ، في درجة حرارة تقلّ عن 25 درجة مئوية، وهو محميّ من الضوء.

• يجب إبعاده عن متناول أيدي الأطفال.

• بعد الفتح لأول مرّة، يجب استخدام المستحضر في غضون 28 يومًا، وبعد ذلك يجب إتلاف البقايا.

12. تعليمات بخصوص إتلاف المستحضر / بقايا المستحضر عند الانتهاء من الاستخدام

يجب تدمير جميع بقايا الأدوية البيطرية أو الموادّ المشتقة من المستحضرات البيطرية بالتماشى مع تعليمات التدمير التي أصدرتها وزارة حماية البيئة.

13. معلومات إضافية

• يحتوي المستحضر بالإضافة إلى المادّة الفعّالة على: Benzyl alcohol (E1519), Chlorobutanol hemihydrate, Ethanol, Sodium chloride, Acetic acid, Water for injection.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: محلول صافٍ في زجاجات ذات أحجام مختلفة: 10، 50، 100، 250 مل.

• رقم تسجيل الدواء: 083-47-92369

• اسم المصنّع: ديفاسا فارمافيك، برشلونة، إسبانيا

• اسم صاحب التسجيل: أم. بي. فت م.ض، ص.ب. 7004، بيتاح تكفا 49170



تمّ تحرير النشرة في تمّوز/يوليو 2021 تبعًا لتعليمات وزارة الصحة

The format of this insert was determined by the Israel Ministry of Health and its content was examined and approved by the Ministry | **Package Insert for a Veterinary Preparation** |

This medicine is only marketed subject to a veterinarian's prescription | For use only in animals

1. Name of the Veterinary Medicinal Product, Its Shape, and Strength

Partovet Veterinary

2. The Active Substances and Their Concentration per Each Dosing Unit

Each 1 ml contains 10 IU of synthetic oxytocin.

3. What Is the Medicinal Product Intended for?

PARTOVET is intended to induce delivery, placenta expulsion, and increased postpartum milk production in cows, mares, nanny goats, ewes, bitches, cats and sows.

Oxytocin is a hormone that affects the myometrium during the last stages of pregnancy, during delivery and for several days thereafter.

Therapeutic group: Synthetic hormones for veterinary use

4. Contraindications

In case of known hypersensitivity to the active substance or to the excipients, do not treat with this preparation. The use of this preparation is prohibited in animals with cervical immaturity, fetal disposition, abnormally large embryos, cardiovascular diseases or females with a background of uterine tears.

The medicinal product should be administered with caution in case of toxemia or in the absence of cervical dilatation.

5. Side Effects

Like all medicines, using this medicinal product may cause side effects in some animals. Do not be alarmed when reading the list of side effects. The animal might not suffer from any of them. This medicine can cause allergic reactions.

Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on the link "Reporting Side Effects and Drug-related Adverse Events" on the homepage of the Ministry of Health website (www.health.gov.il), which redirects to an online form for reporting side effects, or by clicking on the link: <https://sideeffects.health.gov.il>

6. Target Species

Cows, mares, nanny goats, ewes, bitches, cats and sows.

7. Administration Route and Dose for Each Target Species

PARTOVET is administered via intramuscular, subcutaneous, or intravenous injection (for intravenous injection use half the usual dose and if necessary dilute with water for injection).

Mares and cows 4-6 ml | Sows 2-4 ml

Ewes and nanny goats 1-2 ml | Bitches and cats 0.25-1 ml

The treatment can be repeated if necessary every 40 minutes.

8. How to Use the Preparation

Note: During delivery, complete cervical relaxation should be achieved either naturally or by administering estrogen prior to the administration of oxytocin.

9. Withdrawal Period

0 days.

10. Warnings

Special Warnings Regarding Use in the Target Species

None.

Special Warnings Regarding the Safe Use of the Medicinal Product in Animals

Intravenous administration of this medicinal product: Administration should be very slow preferably concomitantly with an infusion of glucose or saline. Use with caution during toxemia.

Special Warnings Regarding the Safety of the Person Administering the Preparation

People with known sensitivity to any of the preparation's ingredients should avoid contact with the preparation.

The medication must not be administered by a pregnant woman.

Wear gloves when using the medicine.

Avoid contact with the skin and the eyes. In case of contact, wash immediately with plenty of water.

Be very careful to avoid self-injection of this medicinal product. In case of self-injection seek medical advice and show the leaflet of the preparation to the attending physician.

Pregnancy and Lactation

Not to be used in pregnant females before the first signs of delivery.

Drug Interactions and Other Forms of Interaction

Do not use this preparation with corticosteroid preparations, sympathomimetic vasoconstrictors, anesthetics, calcium, estrogens and prostaglandins because they can increase its effect.

Overdose

Overdoses can cause myometrium hyperstimulation and spasms, premature placental separation, bradycardia and arrhythmias, hypertension and even death of the mother and fetus. Intoxication due to water retention is characterized by convulsions, shock and even death of the mother after the intravenous administration of large doses during long periods of time.

May cause postpartum hemorrhage.

Incompatibility

Given the absence of compatibility studies, do not mix this preparation with other veterinary preparations.

11. Storage Instructions

• Prevent poisoning! This medicinal product and any other medicinal product should be kept in a closed place out of the reach of children and/or babies to prevent poisoning.

• Do not use this medicinal product after the expiration date (Exp. Date), which appears on the package. The expiration date refers to the last day of that month.

Storage conditions:

• Store in a dry place, below 25°C, protected from light.

• Keep out of the reach of children.

• Once opened for the first time, use the preparation within 28 days, and terminate any residues thereafter.

12. Instructions Pertaining to the Disposal of the Preparation/Remaining Quantity of the Preparation Once Its Use Is Over

Any remaining quantity of the veterinary medicinal product or waste materials derived from such a veterinary medicinal product should be disposed of according to the disposal instructions set forth by the Ministry of Environmental Protection.

13. Additional Information

• **In addition to the active substance, the preparation also contains:**

Benzyl alcohol (E1519), Chlorobutanol hemihydrate, Ethanol, Sodium chloride, Acetic acid, Water for injection

• **What the medicinal product looks like and what the package content is:**

Clear solution in bottles of different volumes: 10, 50, 100, 250 ml.

• **Drug Registration Number:** 083-47-92369

• **Name of the Manufacturer:** Divasa-Farmavic s.a, Barcelona, Spain

• **Name of the Registration Holder:** M.P.VET Ltd., POB 7004, Petah Tikva 49170

