

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקנירים) התשמ"א - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ווילנטין 250 מ"ג

כמוסות

החומר הפעיל וממותו:

כל כמוסה מכילה:

טריאנטין הידרוולוריד 250 מ"ג trientine hydrochloride 250 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה פרק 6 " מידע נוספת".

קרא בעיון את העלון עד סוףו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם
נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול במחלה וילסון (Wilson's disease) במבוגרים, מתבגרים וילדים מגיל 5
ומעלה, עם אי-סבירות לטיפול ב-D-פניצילאמין (D-Penicillamine therapy).

কבוצה רפואיית: מוצריים שונים בדרך כלל וחילוף חומרים.

מחלה וילסון היא הפרעה תורשתית שמקורה בהצטברות של נחושת ברקמות בגוף. ייתכן
שהצטברות העודפת של הנחושת גורמת עקב פגעה במנגןן של הכבד להפרשת נחושת חופשית
למרה. תא הכבד המכונים הפטוציטים מאחסנים עופדי נחושת, אך כאשר יש חריגת מהקיבולות
שליהם, הנחושת משוחררת לדם ומצטברת ברקמות מחוץ לכבד. אופן הטיפול במחלה הוא באמצעות
דיאטה דלה נחושת ושימוש בתכשירים קוסמיים נחושת כדי להקל את הפרשתה מהגוף.
החומר הפעיל, טריאנטין הידרוולוריד, הוא חומר מקשר המסייע לסילוק עופדי נחושת מהגוף.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרג) לחומר הפעיל (טריאנטין הידרוולוריד) או לכל אחד מהמרכיבים
הנסופים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 " מידע נוספת").

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- יש להיות תחת פיקוח רפואי קבוע למשך כל תקופה נטילת התרופה. תיתכן אנמיה ממוקור של
חוسر בברזל במיחזור נൺ, נשים בהריון ובילדים.
- תיתכן דלקת עור ממגע (contact dermatitis), על כן יש לשטוף במים ככל אזהר שנחשף לתכולת
הכמוסה באופן מיידי.
- יש למדוד חום מדי לילה בחודש הראשון לטיפול ויש לדוח לרופא על כל תסמין כגון חום או
פריחה.
- יש לשים לב לסימנים של רגשות יתר ולידע את הרופא המתפל.

ילדים

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתרופה בילדים מתחת לגיל 5.

בדיקות ומעקב

לפני תחילת השימוש בתרופה ובמשך תקופה טיפול בתרופה הרופא יפנה אותך לבדיקות דם ושתן.

אינטראקציות/תגובה בין תרופה
אם אתה לוקח או אמ' לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

יש להימנע מנטילת התרופה עם תוספי מינרלים מכיוון שהם עשויים להפריע לספגט התרופה. מחסור בברזל עלול להתפתח במיוחד ובנשים בהריון או בנשים בזמן וסת', או כתוצאה מדיאטה דלת נוחות המומלצת בעת محلת וילסון. במידת הצורך, ניתן ליטול תוספי ברזל לפרקע זמן קצרים, אך מכיוון שברזל והחומר הפעיל בתרופה עשויים לעכב ספיגה זה של זה, יש לחכות שעתים לפחות בין מתן התרופה ותוספי הברזל.

הירון והנקה

הירון
לא קיים מספיק מידע לגבי השימוש בתרופה בנשים בהריון. יש לשתמש בתרופה במהלך ההריון רק אם הייעול האפשרי מצדקה את הסיכון האפשרי לעובר.

הנקה
לא ידוע אם תרופה זו מופרשת בחלב אם. מכיוון שתרופות רבות מופרשות בחלב אם, יש לנוכח בזיהירות אם התרופה ניתנת לאישה מניקה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למין ואופן הטיפול בתכשיך.

המיןון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המיןון המקובל בדרך כלל הוא: 500-750 מ"ג ליום לילדים ו 750-1250 מ"ג ליום למבוגרים במנות מוחלקות לפחות ארבע פעמיים ביום. ניתן להגדיל למיןון מקסימלי של 2000 מ"ג ליום למבוגרים או 1500 מ"ג ליום לילדים בני 12 ומטה.

אין לעבר על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

- יש ליטול את התרופה על קיבת ריקה, לפחות שעה לפני ארוחה או שעתים לאחר ארוחה ולפחות בהפרש של שעיה מנטילת כל תרופה אחרת, מזון או חלב. כך תתאפשר ספיגה מקסימלית ותופחת הסבירות של ביטול פעילות התרופה באמצעות קישורה למתכת במערכת העיכול.
- יש לבלווע את הכמוסות בשלמותן עם מים ואין לפתוח או לעוזז אותן.

אם נטלה בטעות מין גבוה יותר
אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעלILD מין התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

יש להתميد טיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעוץ עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. ניתן שלא תסבול מכך אחת מהן.

- מהסור בברצל
- זאבת (systemic lupus erythematosus)
- הפרעת מתח שרירים (dystonia)
- התכווצות שרירים
- חולשת שרירים חמורה (myasthenia gravis)
- צרבת
- כאב ורגישות ברום הקיבת
- עיבוי, סדקים והתקלפות העור
- אנמיה מיקרוציטית היפוכרומית (hypochromic microcytic anemia)
- דלקת קיבת חריפה
- פצעים בפה (אפטות)
- כאב בטן
- צואה שחורה (melena)
- אנוורקסיה
- הרגשות חול (malaise)
- התכווצויות
- כאב שרירים
- חולשה
- רבדומיליזיס (rhabdomyolysis)

אם הופעה תופעת לוויאי, אם אחת מתופעות הלוויאי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוויאי
שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוויאי

ניתן לדוח על תופעות לוויאי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוויאי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il), המפנה לטופס המukan לדוח על תופעות לוויאי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הארזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האخرון של אותו חודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן במקדר (C-8°-2°C). יש לסגור היטב את הבקבוק.

- אין להשיליך תרופות לביב או לפסולות הביתיים. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמרן על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסך על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

gelatin, water, stearic acid, titanium dioxide, FD&C Yellow 6, imprinting black ink (contains shellac, propylene glycol, black iron oxide, dehydrated alcohol, isopropyl alcohol, butyl alcohol, strong ammonia solution, and potassium hydroxide)

כיצד נראהת התרופה ומה תוכן הארזה:

כמוסות בעלות גוף אוטום בצבע לבן מוטבע עם "101" ומכסה אוטום בצבע כתום, מוטבע עם "NAV" בדיו שחור.

התרופה משווקת בבקבוק פלסטייק המכיל 100 כמוסות. הבקבוק מכיל סופח לחות.

שם בעל הרישום וכתובתו: אמ.ב.א. פארמה, ת.ד. 5061, קידימה.

שם היצרן וכתובתו:

Apothecon Pharmaceuticals Pvt. Limited, Pin – 391440, District – Vadodara, State - Gujarat, India.

עודכן במאי 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
169-34-36612-99

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.