

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

## فوريك حمل

### أقراص

يحتوي كل قرص على:

حديد (على شكل فيروس فومارات) 100 ملг

Ferrous Iron (as ferrous fumarate) 100 mg

حامض الفوليك 400 مكغ

Folic Acid 400 mcg

للقائمة المركبات الإضافية بالدواء انظر الفقرة 6

معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء غير مخصص لأطفال دون عمر 6 سنوات. يتوجب عليك بلع الدواء بالشكل الصحيح. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لمنع ولечение فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والحفاظ على نسبة حامض الفوليك خاصة خلال فترة الحمل.

**الفصيلة العلاجية:** مستحضر مركب من الحديد وحامض الفوليك.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً لأحد مركبات الدواء.

• كنت تعاني من حالات أخرى لفقر الدم غير المترافقه بنقص الحديد مثل فقر الدم الإنhalالي.

• كنت تعاني من نقص فيتامين B12.

• كنت تعاني من خلل في وظيفة جهاز الدم.

• كنت تتلقى أو تلقيت في الماضي تسريب دم متكرر.

• كنت تعاني من خلل في وظيفة جهاز الهضم مثل قرحة معدية، إلتهاب القولون.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء**

لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة أو لفترة مطولة بدون إستشارة الطبيب.

يجب إجراء فحوص الدم خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، خاصة للحديد والحامض الفوليك، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

إذا كنت تتناول هذا الدواء والبراز لم يصبح أسوداً، عليك مراجعة الطبيب.

قبل العلاج بفوريك حمل، بلغ الطبيب إذا:

• كنت ت تعالج أو عولجت في الماضي من القرحة المعدية

• كنت تعاني من ورم يتعلق بالقولات

• إجتذرت عملية جراحية لإستئصال كامل أو جزئي المعدة

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

• مضادات حيوية

• مستحضرات مضادة للإختلالات (الصرع)

• مضادات الحموضة

• بنيسيالامين (لإلتهاب المفاصل الروماتيزمي)

• سولفالاسالازين (لإلتهاب المفاصل الروماتيزمي، الأمراض المعاوية)

• كوليستيرامين (لتخفيف نسبة الكوليسترول، للإسهال)

• ليثودوبا، كاربيدوبا (لداء الباركينسون)

• تيرووكسين (لاضطرابات الغدة الدرقية)

• بيسفسوفونات (لأمراض العظامية)

• أمينوبيتيرين، ميتوتريكسات (المعالجة أنواع مختلفة من السرطان)

• بيريبيتامين (للمalaria)

• تريابينتين (المرض ويلسون)

• ميتيل دوبا (لارتفاع ضغط الدم)

• الزنك

استعمال الدواء والطعام لا يجوز تناول هذا الدواء مع الشاي، القهوة، الحليب أو البيض، وذلك لتجنب تضرر إمتصاص الحديد.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء المستحضر يحتوي على الكتوز وقد يسبب الضرر للأشخاص الحساسين للكتوز.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

## التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة أو عن طريق تصفح الرابط: [www.health.gov.il/](http://www.health.gov.il/) أو <https://sideeffects.health.gov.il/>

### (5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقاديم إصابتهم بالتسمم.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة حتى 25 درجة مئوية. يجب الحماية من الضوء.

### (6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً Microcrystalline Cellulose, Lactose, Sodium Starch Glycolate, Povidone, Ascorbic Acid, Magnesium Stearate, Sodium Bicarbonate, Opadry OY-29020, Talc, Titanium Dioxide, Red Lake No 3.

يحتوي كل قرص على أقل من 1 ملغم صوديوم وحوالي 75 ملغم لكتوز.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة - أقراص زهرية ضمن عبوة لوحة (بليستر)
- المنتج، صاحب الإمتياز وعنوانه: سام - أون.م.ض.، شارع إهود كينامون (هاعافودا) 25، بات - يام. تم إعدادها في آذار 2024.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 1253430478
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

المعالجة فقر الدم: 1-3 أقراص لليوم.

لمنع فقر الدم والحفاظ على نسبة حامض الفوليك:

قرص 1 لليوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يجب بلع الدواء مع كأس من الماء. يجب تناول الدواء بعد وجبة الطعام، بالإمكان سحق الأقراص.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة. تناول الجرعة الدوائية القادمة في الوقت الإعتيادي.

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فوريك حمل قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهبني من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

بالإضافة للتأثير المرغوب للدواء، فقد تظهر خلال فترة إستعماله تأثيرات جانبية مثل: آلام في البطن، إمساك، إسهال، غثيان وقيؤات، قلة الشهية للطعام.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه في الحال إلى الطبيب إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي، الذي يشمل الأعراض التالية: صعوبات في التنفس، إنفاس الجفنين، الوجه أو الشفتين، طفح وجحكة.

إذا كنت تعاني من آلام شديدة في البطن.

في أية حالة تشعر فيها بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغير على شعورك العام، عليك إستشارة الطبيب في الحال.

قد يؤدي هذا الدواء لتغيير لون البراز. لا داعي للقلق، لمثل هذا التغيير.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.