

بيورچون محلول للحقن 150 IU, 300 IU, 600 IU, 900 IU محلول للحقن

كل خرطوشة تحتوي على:

Follitropin beta 150 IU/ 0.18 ml

Follitropin beta 300 IU/ 0.36 ml

Follitropin beta 600 IU/ 0.72 ml

Follitropin beta 900 IU/ 1.08 ml

فوليتروپين بيتا 150 وحدة دولية/ 0.18 ملل

فوليتروپين بيتا 300 وحدة دولية/ 0.36 ملل

فوليتروپين بيتا 600 وحدة دولية/ 0.72 ملل

فوليتروپين بيتا 900 وحدة دولية/ 1.08 ملل

لقائمة المواد غير الفعالة أنظر بند 6.1 "على ماذا يحتوي بيورچون".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن بيورچون. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، إسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء وصف لأجلك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن وضعهم الصحي مماثل.
- استعمال بيورچون غير مخصص للأطفال.
- بيورچون غير مخصص للنساء الحوامل.

1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

يُستعمل بيورچون لعلاج العقم في الحالات التالية:

نساء

لدى النساء اللواتي لا تحدث لديهن إباضة ولا يستجبن لعلاج في كلوميفين سيترات، يُستعمل بيورچون لإحداث إباضة. لدى النساء اللواتي يجتزن علاجات خصوبة، بما في ذلك إخصاب الأنابيب (IVF) وأساليب أخرى، من الممكن أن يؤدي بيورچون إلى تطوّر جريبات كثيرة.

رجال

لدى الرجال الذين يعانون من العقم نتيجة مستويات هرمونات منخفضة، يُستعمل بيورچون لإنتاج الحيوانات المنوية.

الفصيلة العلاجية: الهرمونات الجنسية (جوناوتروپينات).

بيورچون محلول للحقن يحوي فوليتروپين بيتا، وهو هرمون معروف بالهرمون المحرض للجريبات (FSH).

ينتمي FSH إلى فصيلة الهرمونات الجنسية (gonadotrophins) التي تؤدي دورًا هامًا في الإخصاب والولادة لدى البشر. لدى النساء، FSH ضروري لنمو وتطور الجريبات في المبايض. الجريبات هي عبارة عن أكياس صغيرة تحوي خلايا البويضة. لدى الرجال، FSH ضروري لإنتاج الحيوانات المنوية.

2. قبل استعمال بيورچون

2.1 يُمنع استعمال بيورچون إذا:

- كنت حساسًا (ألرجي) لفوليتروپين بيتا أو لأي واحد من المركبات الأخرى في بيورچون (مفصلة في بند 6.1)
- كان لديك ورم في المبيض، في الثدي، في الرحم، في الخصية أو في الدماغ (في الغدة النخامية أو في الوطاء-hypothalamus)
- لديك نزف مهبلي شديد أو غير عادي لسبب غير معروف
- لديك مبايض التي لا تعمل نتيجة لحالة تسمى فشل مبيضي أولي
- لديك كيسات في المبايض أو تضخم للمبايض ليس بسبب متلازمة المبايض متعددة الكيسات (PCOS)
- لديك تشوه في الأعضاء التناسلية التي تحول دون الحمل العادي
- لديك أورام ليفية في الرحم التي تحول دون الحمل العادي

2.2 تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال بيورجون

قبل العلاج ببيورجون، أخبر طبيبك إذا:

- كان لديك رد فعل تحسسي لمضادات حيوية معينة (نيومايسين و/أو سترپتومايسين)
- لديك مشاكل في الغدة النخامية غير مسيطر عليها أو مشاكل في الوطاء (hypothalamus)
- لديك قصور في الغدة الدرقية (hypothyroidism)
- لديك عدد كظرية التي لا تعمل بشكل سوي (قصور قشرة الغدة الكظرية)
- لديك مستويات عالية من البرولاكتين في الدم (فرط برولاكتين الدم)
- لديك حالات صحية أخرى (على سبيل المثال، سكري، مرض قلب، أو أي مرض آخر طويل الأمد).

إذا كنت امرأة:

متلازمة فرط التحريض المبيضي (OHSS)

سيفحص طبيبك تأثيرات العلاج بشكل ثابت ليختار المقدار الدوائي الصحيح من بيورجون كل يوم. ستخضعين لمسح للمبايض بالأمواج فوق الصوتية (أولتراساوند) بشكل ثابت. من المحتمل أن يفحص طبيبك مستويات الهرمونات في الدم أيضاً. هذا الأمر هام جداً، لأن جرعة زائدة من FSH يمكنها أن تسبب مضاعفات نادرة لكن جديّة، حيث تُعرض فيها المبايض أكثر مما ينبغي وتصبح الجريبات النامية أكبر من العادي. هذه الحالة الجديّة تسمى متلازمة فرط تحريض المبيض (OHSS). في حالات نادرة، OHSS وخيمة قد تكون فتاكّة. تُسبب OHSS تراكم سوائل مفاجئ في منطقة البطن والصدر وقد يُسبب تشكل جلطات. اتصلي مباشرة بطبيبك إذا لاحظت انتفاخ شديد في البطن، ألم في منطقة البطن، غثيان، تقيؤ، زيادة مفاجئة في الوزن نتيجة لتجمع سوائل، إسهال، انخفاض في در البول أو صعوبات في التنفس. (انظري أيضاً بند 4، "الأعراض الجانبية").

← إن المتابعة الدائمة للاستجابة للعلاج بـ FSH تساعد على منع تحريض زائد للمبايض. اتصلي مباشرة بطبيبك إذا شعرت بألم في بطنك، حتى ولو حدث هذا الأمر بعد عدة أيام من تلقي الحقنة الأخيرة.

الحمل متعدد الأجنة أو تشوهات خلقية

بعد علاج بمستحضرات جوناوتروپين، يزداد احتمال حدوث حمل متعدد الأجنة، حتى عندما يتم إرجاع جنين واحد فقط للرحم. حمل متعدد الأجنة يشتمل على اختطار (احتمال خطر) صحي متزايد سواءً للأم أو للأجنة قبيل موعد الولادة. كذلك، فإن الحمل متعدد الأجنة وصفات متلقي العلاج الذين يمرون بعلاج خصوبة (على سبيل المثال، عمر المرأة، صفات الحيوانات المنوية، الخلفية الوراثية لكلا الوالدين) قد تكون مرتبطة بزيادة الاختطار لحدوث تشوهات خلقية.

مضاعفات الحمل

هناك زيادة طفيفة في الاختطار لحدوث حمل خارج الرحم (ectopic pregnancy). لذلك، يجب على طبيبك أن يقوم بفحص أمواج فوق الصوتية (أولتراساوند) مبكر لنفي الإمكانية لحمل خارج الرحم. لدى نساء اللواتي تجتزن علاجات خصوبة قد يكون احتمال أعلى قليلاً للإجهاض.

خثار دموي (thrombosis)

علاج ببيورجون، كما الحمل نفسه، يمكن أن يزيد الاختطار لحدوث خثار دموي (thrombosis). خثار دموي هو تشكل خثرة دموية في أوعية الدم.

قد تؤدي خثرات دموية لحالات طبية جديّة، مثل:

- انسداد في رئتيك (انصمام رئوي)
- سكتة
- نوبة قلبية
- مشاكل في الأوعية الدموية (thrombophlebitis - التهاب الوريد الخثاري)
- نقص في جريان الدم (خثار وريدي عميق - DVT) الذي قد يؤدي لفقدان ذراعك أو ساقك.

من فضلك تحدث عن ذلك مع طبيبك قبل العلاج، خاصةً:

- إذا كنت تعرف أن لديك احتمال متزايد أن تعاني من خثار دموي
- إذا عانيت أنت، أو واحد من عائلتك القريبة من خثار دموي ذات مرة
- إذا كنت تعاني من زيادة وزن وخيمة.

لوي مبيضي (Ovarian torsion)

حدث لوي مبيضي بعد العلاج بجوناوتروپين، بما في ذلك بيورجون. لوي مبيضي هو عبارة عن إلتواء المبيض. إلتواء المبيض قد يؤدي لتوقف جريان الدم للمبيض.

- قبل بداية العلاج بهذا الدواء، أخبري طبيبك إذا:
- عانيت في الماضي من متلازمة فرط تحريض المبيض (OHSS)
 - كنت حامل أو تظنين بأنك قد تكوني حامل
 - اجتزت في الماضي جراحة في البطن
 - كان لديك في الماضي لوي مبيضي
 - كان لديك في الماضي أو يوجد لديك كيسات في المبيض أو المبيضين.

أورام في المبيض وأورام أخرى في جهاز التناسل
كانت هناك بلاغات عن أورام في المبيض وأورام أخرى في جهاز التناسل لدى النساء اللاتي اجتزن علاجات خصوبة. من غير المعروف إذا كان العلاج بأدوية للخصوبة يزيد من الاختطار لهذه الأورام لدى نساء عقيمة.

حالات طبية أخرى

- بالإضافة، قبل بداية العلاج بهذا الدواء، أخبري طبيبك إذا:
- قيل لك من قبل طبيب أن الحمل قد يُشكل خطرًا عليك.

إذا كنت رجلاً:

رجال ذوي FSH أكثر مما ينبغي في الدم
مستويات متزايدة من FSH في الدم هي علامة لضرر بالخصيتين. **بيورجون** غير ناجع عادةً في مثل هذه الحالات. من أجل متابعة تأثيرات العلاج، من الممكن أن يطلب منك الطبيب أن تمر بفحص لعينة من الحيوانات المنوية، 4 حتى 6 أشهر بعد بداية العلاج.

2.3 الأطفال والمراهقون

استعمال **بيورجون** ليس له صلة بالأطفال والمراهقين.

2.4 تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. إذا أعطي **بيورجون** بالدمج مع كلوميفين سترات، قد تزداد فعالية **بيورجون**. إذا تم إعطاء ناهضة GnRH (دواء يُستعمل لمنع الإباضة المبكرة)، من الممكن أن تكون حاجة لجرعات أعلى من **بيورجون**.

2.5 الحمل والإرضاع

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء. لا يجوز استعمال **بيورجون** إذا كنت حامل، أو تعتقدين بأنك قد تكوني حامل. **بيورجون** قد يؤثر على إنتاج الحليب. من غير المحتمل أن ينتقل **بيورجون** لحليب الأم إذا كنت مرضعة، أخبري طبيبك قبل تناول **بيورجون**.

2.6 السياقة واستعمال الآلات

من غير المحتمل أن يؤثر **بيورجون** على قدرتك على سياقة المركبة أو تشغيل الآلات.

2.7 معلومات مهمة بخصوص جزء من مركبات **بيورجون**

يحتوي **بيورجون** على كحول بنزيلي يحتوي هذا المستحضر الطبي على 10 ملغ من الكحول البنزيلي لكل ملل. قد يؤدي الكحول البنزيلي لردود فعل أرجية. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك مرض كبد أو كلى. ذلك لأن كمية كبيرة من الكحول البنزيلي قد تتراكم في جسمك وقد تسبب أعراضًا جانبية (تسمى "الحماض الأيضي" – "metabolic acidosis"). استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت حاملًا أو مرضعة. ذلك لأن كمية كبيرة من الكحول البنزيلي قد تتراكم في جسمك وقد تسبب أعراضًا جانبية (تسمى "الحماض الأيضي" – "metabolic acidosis").

يحتوي **بيورجون** على صوديوم يحتوي هذا المستحضر الطبي على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) للحقنة، يعني فعليًا 'خالي من الصوديوم'.

3. كيف تستعمل **بيورجون**؟

يجب استعمال **بيورجون** دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة ومدة العلاج تحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي:

الجرعة لدى النساء

سيقرر طبيبك الجرعة الأولية. قد تكون هناك حاجة لملاءمة الجرعة طوال فترة العلاج. تفاصيل أخرى حول جدول مواقيت العلاج تظهر في الأسفل.

هناك فوارق كبيرة بين النساء برد فعل المبايض لـ FSH، الأمر الذي يجعل تحديد برنامج الجرعة الملائم لجميع المعالجات مستحيلًا. من أجل إيجاد الجرعة الملائمة، سيقوم طبيبك بفحص نمو الجريبات لديك بواسطة مسح أمواج فوق صوتية (أولتراساوند)، وقياس كميات الإسترواديول (هرمون الجنس الأنثوي) في الدم.

* النساء التي ليس لديها إباضة

يتم تحديد الجرعة الأولية من قبل طبيبك. تُعطى هذا الجرعة لمدة سبعة أيام على الأقل. في حال ولم يكن هنالك رد فعل للمبايض، ترتفع الجرعة اليومية بالتدريج إلى أن تكبر الجريبات و/أو تشير مستويات الإسترواديول في الدم لرد فعل ملائم. بعد ذلك يتم الاستمرار مع الجرعة اليومية حتى ظهور جريب بحجم ملائم. عادةً ما يكفي 7 حتى 14 يومًا من العلاج. عندها يتم إيقاف العلاج ببيورجون ويمكن إحداث الإباضة عن طريق إعطاء مَوْجَهة الغُدِّ النَّسَائِيَّة المَشِيمَائِيَّة النَّشْرِيَّة - جوناودوتروبين مَشِيمَائِيَّ (hCG). علاجات الإخصاب، مثل (IVF)

* يتم تحديد الجرعة الأولية من قبل طبيبك. تُعطى هذه الجرعة لمدة أربعة أيام على الأقل. بعد ذلك يتم ملاءمة الجرعة اليومية، بالاستناد على رد فعل المبايض لديك. عندما يكون عدد كافي من الجريبات بحجم ملائم، يتم إحداث المرحلة الأخيرة من نضوج الجريبات عن طريق إعطاء مَوْجَهة الغُدِّ النَّسَائِيَّة المَشِيمَائِيَّة النَّشْرِيَّة - جوناودوتروبين مَشِيمَائِيَّ (hCG). سحب البويضة/ات يتم 34-35 ساعة بعد ذلك.

الجرعة لدى الرجال

يُعطى ببيورجون عادةً بجرعة من 450 وحدة دولية للأسبوع، غالبًا بثلاث جرعات من 150 وحدة دولية، بالدمج مع هورمون آخر (hCG)، لمدة 3-4 أشهر على الأقل. مدة العلاج ملائمة لمدة تطور الحيوانات المنوية، وأيضًا للمدة التي يمكن ملاحظة تحسن خلالها. إذا لم يبدأ إنتاج الحيوانات المنوية لديك بعد هذه الفترة، قد يستمر العلاج 18 شهرًا إضافيًا على الأقل.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية إعطاء الحقن

الحقنة الأولى من ببيورجون يجب أن تُعطى تحت إشراف طبيب أو ممرضة فقط.

لقد طُورت خراطيش محلول الحقن من ببيورجون للاستعمال مع قلم ببيورجون. يجب متابعة تعليمات استعمال القلم نفسه بحذر، التي تظهر على حدة. لا يجوز استعمال الخرطوشة إذا كان المحلول يحتوي على جزيئات أو أن المحلول ليس صافياً. عند استعمال القلم، يمكن إجراء الحقن تحت الجلد (في منطقة البطن السفلي مثلاً)، من قبلك أو من قبل شريكك. سيشرح لك طبيبك متى وكيف تقوم بذلك. إذا كنت تقوم بحقن ببيورجون لنفسك، إتبع التعليمات بحذر، من أجل إعطاء ببيورجون كما ينبغي ومع أقل قدر من عدم الراحة.

من الممكن بقاء كمية صغيرة من الدواء في الخرطوشة بعد إنهاء العلاج ببيورجون، حتى أيضًا عندما يتم استعمال جميع الجرعات بالصورة الصحيحة. لا تحاول استعمال بقايا الدواء. بعد إعطاء الجرعة الأخيرة، يجب رمي الخرطوشة كما ينبغي.

تعليمات الحقن

1. أخرج القلم من محفظته، انزع الغطاء عن القلم، إفضل جسم القلم عن حاضنة الخرطوشة بواسطة لولبته.



2. أدخل خرطوشة **بيورچون** داخل حاضنة الخرطوشة وذلك بإدخال غطاء الخرطوشة أولاً. لولب القلم من جديد. تأكد من عدم بقاء فراغ وأن السهم الأزرق المعلم في أطراف حاضنة الخرطوشة يشير إلى العلامة الصفراء الموجودة في طرف جسم القلم.




3. يجب استعمال إبرة جديدة في كل عملية حقن. قبل وصل الإبرة، فُم بتعقيم طرف خرطوشة **بيورچون** (الموجودة داخل القلم) والطرف المفتوح لحاضنة الخرطوشة بواسطة القليل من الكحول. يجب نزع السدادة الورقية عن وافي الإبرة الخارجي ودفع القلم بنبات داخل وافي الإبرة. لولب الإبرة إلى الداخل بقوة. إنزع وافي الإبرة الخارجي والداخلي.




4. أمسك القلم بحيث تكون الإبرة متجهة نحو الأعلى، أطرق بلطف على حاضنة الخرطوشة بإصبعك كي تسمح للفقاعات الهوائية بالصعود إلى طرف الإبرة. تتشكل قطرة سائل في طرف الإبرة. إذا لم تر سائل في طرف الإبرة، فم بتوجيه طاقة واحدة بواسطة زر الجرعة الدوائية واضغط على زر الحقن. تأكد من تشكل قطرة في طرف الإبرة. يجب تكرار هذه المرحلة حتى رؤية قطرة في طرف الإبرة. يكون القلم الآن جاهزاً لحقن **بيورچون**.




5. قم بتوجيه زر الجرعة الدوائية البرتقالي حتى تكون النقطة الموجودة بين العلامتين في مركز مقياس الجرعة الدوائية بخط مستقيم مع الجرعة الدوائية المطلوبة التي وصفها لك طبيبك. إذا قمت بالتوجيه بالخطأ بما يتجاوز الجرعة الصحيحة، يجب تدوير زر الجرعة الدوائية إلى ما بعد 450 وحدة دولية، طالما هو يدور. إن مقياس الجرعة الدوائية يجب أن يتحرك بحرية. اضغط زر الحقن نحو الداخل وأبدأ بضبط الجرعة الدوائية من جديد، من الصفر باتجاه الأعلى. لا ضياع للمادة في هذه العملية. إذا حاولت إصلاح خطئك بواسطة التوجيه بالإتجاه المعاكس فإنك ستتلقى جرعة دوائية دقيقة، لكنك ستفقد جزءاً من الدواء.



6. عقم منطقة الحقن بواسطة الكحول ودع الكحول ليجف قليلاً قبل الاستمرار. من المفضل إجراء الحقن في البطن، تحت السرة. أقرص بواسطة الإبهام والسبابة قطعة الجلد التي يراد الحقن فيها، وادخل بالإبرة الثانية الإبرة بكاملها للجلد بزواوية قدرها 90 درجة. اضغط على زر الحقن واحقن حتى يبين مقياس الجرعة الدوائية "0". إنتظر 5 ثوان قبل نزع الإبرة من الجلد. إسحب الإبرة خارجاً بلطف وضع شاش معقم على منطقة الحقن.



7. أدخل الإبرة إلى الوافي الخارجي. إنزع الإبرة عن القلم واحفظ القلم في مكان آمن.





إذا أفرطت في استعمال بيورچون

أخبر طبيبك فوراً.

جرعات زائدة من بيورچون من شأنها أن تسبب تحريض زائد للمبيض (OHSS). هذه الحالة تتجلى بألم في البطن. إذا كنت تعاني من الآلام في البطن، أخبري طبيبك فوراً (أنظري أيضاً بند 4، "الأعراض الجانبية"). إذا تناولت جرعة مفرطة أو بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول بيورچون

إذا نسيت تناول جرعة، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية. ← إتصل بطبيبك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات إذا كنت بحاجة لها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال هذا الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كأي دواء، استعمال بيورچون قد يسبب أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

أخبر طبيبك فوراً إذا لاحظت:

علامات لرد فعل تحسسي خطير (رد فعل تأقي) مثل تورم الوجه، الشفتين، الحلق أو اللسان الأمر الذي يسبب صعوبة في البلع أو التنفس، ضيق تنفس، إحساس بفقدان الوعي.

أعراض جانبية جديّة لدى النساء

إحدى المضاعفات في فترة العلاج بـ FSH هو تحريض زائد للمبايض. تحريض زائد للمبيض قد يتطور لحالة طبية تُدعى متلازمة فرط التحريض المبيضي (OHSS)، التي قد تكون مشكلة طبية صعبة. يمكن التقليل من الاختطار لذلك بواسطة متابعة عن كثب تطور الجريبات خلال العلاج. سيقوم طبيبك بإجراء مسح فوق صوتي للمبيضين ليرصد بحذر عدد الجريبات الناضجة. قد يفحص طبيبك أيضاً مستويات الهرمونات في الدم. ألم في البطن، شعور بغثيان أو إسهال هي الأعراض الأولية. في حالات وخيمة أكثر، قد تشمل الأعراض تضخم المبيضين، تراكم سوائل في البطن و/أو في الصدر (التي ممكن أن تسبب ارتفاعاً مفاجئاً في الوزن بسبب تراكم السوائل) وتكون خثرات دموية في الدورة الدموية (أنظري أيضاً بند 2.2، "تحذيرات خاصة حول استعمال بيورچون"). ← إتصلي بطبيبك فوراً إذا كنت تشعرين بالألم بطن، أو كل عرض آخر لفرط التحريض المبيضي، حتى ولو حدث ذلك بعد عدة أيام من إعطاء الحقنة الأخيرة.

إذا كنت امرأة:

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- صداع
- أعراض بموضع الحقن (مثل كدمة، ألم، احمرار، انتفاخ وحكة)
- متلازمة فرط التحريض المبيضي (OHSS)
- ألم في الحوض
- ألم بطن و/أو انتفاخ

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):

- شكاوى عن أوجاع في الصدر (بما في ذلك حساسية)
- إسهال، إمساك أو عدم راحة في البطن
- تضخم الرحم
- غثيان
- رد فعل لحساسية مفرطة (مثل طفح، احمرار، شرى وحكة)
- كيسات في المبيضين أو تضخم المبيضين

- لوي مبيضي (التواء المبيضين)
- نزيف من المهبل

أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص):

- خثرات دموية (الأمر قد يحدث أيضًا بدون وجود حالة من فرط التحريض المبيضي غير المرغوب به، أنظري بند 2.2، "تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام بيورجون").

أعراض جانبية غير معروفة (لا يمكن تحديدها من المعلومات المتوفرة):

- ردود فعل تحسسية:
 - تورّم الوجه، الشفتين، الحلق أو اللسان الأمر الذي يسبب صعوبة في البلع أو التنفس، ضيق تنفس
 - شحوب الجلد، نبض ضعيف وسريع أو إحساس بفقدان الوعي

تم التبليغ أيضًا عن حمل خارج الرحم (ectopic pregnancy)، إجهاض وحمل متعدد الأجنة. هذه الأعراض لا تعتبر مرتبطة بالعلاج ببيورجون وإنما لعلاج الإخصاب (ART) أو للحمل الحاصل بعدها.

إذا كنت رجلاً:

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- حب الشباب
- أعراض في موضع الحقن (مثل تصلب وألم)
- صداع
- طفح
- تضخم معين للصدر
- كيسة في الخصيتين

أعراض جانبية غير معروفة (لا يمكن تحديدها من المعلومات المتوفرة):

- ردود فعل تحسسية:
 - تورّم الوجه، الشفتين، الحلق أو اللسان الأمر الذي يسبب صعوبة في البلع أو التنفس، ضيق تنفس
 - شحوب الجلد، نبض ضعيف وسريع أو إحساس بفقدان الوعي

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة طبيبك.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة: (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن بيورجون؟

- تجنب التسمم! هذا الدواء، ككل دواء آخر، يجب حفظه في مكان آمن، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. لا يجوز التسبب بالتقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال بيورجون بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب التخزين في الثلاجة (2-8 درجة مئوية). لا يجوز التجميد. يمكن الحفظ من قبل المُعالج بدرجة حرارة 25 درجة مئوية أو أقل لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. يجب حفظ المستحضر في عبوة الكرتون الخارجية. سجّل متى بدأت بتخزين المستحضر خارج الثلاجة. في لحظة ثقب الغطاء المطاطي للخرطوشة بواسطة الإبرة، يمكن تخزين المستحضر حتى 28 يوم على الأكثر. يجب تسجيل يوم الاستعمال الأول للخرطوشة في جدول تسجيل الجرعات، كما يظهر في تعليمات استعمال قلم بيورجون. يجب رمي الإبر المستعملة فورًا بعد الحقن. لا يجوز خلط أدوية أخرى داخل الخرطوشة. لا يجوز ملء الخرطوشة الفارغة من جديد. لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الخطوات تُساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

6.1 على ماذا يحتوي بيورجون؟

- المادة الفعالة هي: فوليتروبين بيتا، هورمون المعروف كهورمون محرض للجريبات (FSH) بعيار 833 وحدات دولية/ملل محلول مائي.
- خرطوشة بيورجون تحتوي على: 150 وحدة دولية، 300 وحدة دولية، 600 وحدة دولية أو 900 وحدة دولية من فوليتروبين بيتا.
- إضافة للمركب الفعال، يحتوي بيورجون أيضًا على:
sucrose, sodium citrate, benzyl alcohol in water for injections, L-methionine and polysorbate 20. The pH may have been adjusted with sodium hydroxide and/or hydrochloric acid.

6.2 كيف يبدو بيورجون ومحتوى العبوة

بيورجون محلول للحقن هو محلول مائي صافٍ، بدون لون.
حجم العبوات:

- بيورجون 150 وحدة دولية متوفر بعبوة تحتوي على خرطوشة واحدة متعددة الجرعات من 0.270 ملل، وعبوة واحدة التي تحتوي على 3 إبر للقلم.
- بيورجون 300 وحدة دولية متوفر بعبوة تحتوي على خرطوشة واحدة متعددة الجرعات من 0.480 ملل، وعبوتين مع 3 إبر للقلم في كل عبوة.
- بيورجون 600 وحدة دولية متوفر بعبوة تحتوي على خرطوشة واحدة متعددة الجرعات من 0.840 ملل، وعبوتين مع 3 إبر للقلم في كل عبوة.
- بيورجون 900 وحدة دولية متوفر بعبوة تحتوي على خرطوشة واحدة متعددة الجرعات من 1.230 ملل، و- 3 عبوات مع 3 إبر للقلم في كل عبوة.
قد لا تكون جميع العبوات مُسوّقة.

صاحب التسجيل وعنوانه:

أورجنون فارما إسرائيل م.ض.، عتير يداع 1، كفار سابا

المنتج: أورجنون LLC، نيوجيرزي، الولايات المتحدة

تم تحريرها في نيسان 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
بيورجون محلول للحقن: 130.52.30898

لتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.