

**עלון לזכרון לפי תקנות הרוקחים (השניים) נעשית – 1986**

התורפה משוקת על פי מרשם רופא בבד

## יופלימה

**40 מ"ג**

**המיסה להזרקה בעט מוכן להזרקה**

חומר פעיל ויחסי: אדאלימומאב 100 מ"ג/מ"ל

כל עט של יופלימה כולל הזרקה מבדל

אדאלימומאב 40 מ"ג - 0.4 מ"ל 4 ml mg100 adalimumab

הזרקה בלתי פעילים אולגונים בתכשיר – ראה פרק 6 עמוד 10.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתורפה.** עלון זה מכיל עוללה המתייח על התורפה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא, פנה אל הרוקח.

הזרחה זו מרשה לטיפול במחלתבוער-בן אי-סבילות.אם תכביר את הלאחרים, היא עוללה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתםצמצם והסרואו נדמה.

יופלימה הינו תכשיר יו-בי-סימילאר. למידע נוסף על התכשיר יו-בי-סימילאר, יש לפנות לאתר משרד הבריאות: **https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/Biosimilars.aspx**

בנוסף לעלון, יופלימה קיים בריסטי מדע ביטוחיו לטוטרס. כריסטי זה מכיל מדע ביטוחיו חשבו. שעליו לרעה, לפני החלת הטיפול בהחלקי הטיפול יופלימה לעיסול על פיו. יש לערוך בריסטי מדע ביטוחיו לטיפולם בעבור. יש לעמוד את הריסטי לעינו נוסף במידת הצורך.

לשמה ליבר, רצוננו שכל פעם שאהיה מקבל את התורפה שלי, תהיה מרתפת, חודרה, שואתה מקבל את אותה התורפה שארשך לך הרופא המומחה הסגל. גם, את החופשה שקיבלת נראית שונה מנו שאהה מקבל בדרך כלל וא שהנחות השימוש השתנו, אנה מנה מדי לוקוח יחדיו שקיבלת את התורפה הכונה. כל החלפה לא ישניו מינון של תורפה המכילה אדאלימומאב (החומר הפעיל בתורפה) ויחייב להחבצו אן רוק ועל-ידי הרופא המומחה המטפל. אנו מבקרי כִּי שמו המסחר של התכשיר שארשך לך הרופא המומחה במרשם, יהיו זהה לשם התורפה שקיבלת מהרוקח.

**1. להג מיועדת התורפה?**

יופלימה משויכת לטיפול בדילקת פרקים הגשורית לילית פעילה (Rheumatoid arthritis) (methotrexate).

טיפול בדילקת פרקים גשורית פעילה, בניגוד עד חמורה, במבוגרים, כאשר ההגובה לתרופות מסוג anti-rheumatic drugs disease-modifying (DMARDs) כולל מתורקטט ריחתי לא מספק.

טיפול בדילקת פרקים גשורית פעילה, חמורה ומתקדמת במבוגרים אשר לא נטפלו בעבר עם מתורקטט יו-בי סימילאר, כטיפול יחדיו במקרים של אי-סבילות למתורקטט או כאשר המעך הטיפול עם מתורקטט אינו מתאים.

אדאלימומאב הוא ירו פתחית את עקב התקדמות הוק למפרקים פני שנמדד באמצעות צילום רנטגן ומשטר את התפקוד הגופני, כאשר ניתן בשילוב עם מתורקטט.

**דילקת פרקים גשורית רב-מפרקית אידיופטית (מסיבה שאינה ידועה) בילדים ובמתבגרים** (Polyarticular juvenile rheumatoid arthritis)

יופלימה משויכת לטיפול בדילקת פרקים הגשורית לילית פעילה של הוגו החודר על ידי הרופא המומחה, במטופלים מגיל עשורים, במשקל של לפחות 20 ק"ג, אשר חוו הגובה לא מספקת לתורפה אחת או יותר ממספרת DMARDs. ניתן לתת יופלימה טיפול יחד במקרים של אי-סבילות למתורקטט או כאשר המעך טיפול עם מתורקטט אינו מתאים.

**דילקת פרקים הגשורית לילית אזורי חיבור בן הגיל בעה** (Enthesitis-related arthritis)
יופלימה מיועדת לטיפול בדילקת פרקים הגשורית לילית פעילה של הוגו החודר על ידי הרופא המומחה, במטופלים מגיל 6 ומעלה, במשקל של לפחות 30 ק"ג, אשר חוו הגובה לא מספקת או אי-סבילות לטיפול מקובל.

**דילקת חליות משקח (Ankylosing spondylitis)**
יופלימה מיועדת לטיפול במבוגרים עם דלקת חליות משקחת פעילה וחמורה, אשר חוו הגובה לא מספקת לטיפול מקובל.

**דילקת חליות משקחת ללא עדויות רדיוגרפיות (Axial spondyloarthritis without radiographic evidence of AS)**
יופלימה מיועדת לטיפול במבוגרים עם דלקת חליות משקחת ללא עדויות רדיוגרפיות חמורה, אך עם סימני דלקת כפי שנצטפו בבדיקת רנטגן מרובה ההולדת MRI מתומת CRP, אשר חוו הגובה לא מספקת או אי-סבילות לתרופות גשוריות נגד דלקת שאינן סטרואידיות (NSAIDs).

**דילקת פרקים מספחת (Psoriatic arthritis)**
יופלימה מיועדת לטיפול בדילקת פרקים מספחת פעילה מתקדמת, במבוגרים, כאשר ההגובה לטיפול קודם בתורפה משמשת anti-rheumatic drugs disease-modifying אינו מספקת. אדאלימומאב הוא ירו כהו המפחית את עקב התקדמות הוק למפרקים הריסטי כפי שנמדד באמצעות צילום רנטגן במטופלים עם חתי סוגים רב מפרקים יחדיו עם המחלה ומשטר את התפקוד הגופני.

**ספחת (Psoriasis)**

יופלימה מיועדת לטיפול בספחת רובדית כרונית בניגוד עד חמורה במבוגרים שמועדים לטיפול סיסטמי.

**ספחת רובדית בילדים (Paediatric plaque psoriasis)**
יופלימה מיועדת לטיפול בספחת רובדית כרונית חמורה בילדים ובמתבגרים מגיל 4, במשקל של לפחות 30 ק"ג, אשר חוו הגובה לא מספקת או אינם מתאימים לטיפול מקומי או לטיפולים באור (פוטותרפיה).

**הידראדניטיס פוסוריאלי (Hidradenitis suppurativa)**
יופלימה מיועדת לטיפול בהידראדניטיס פוסוריאלי פעילה, בניגוד עד חמורה במבוגרים ובמתבגרים מגיל 12, במשקל של לפחות 30 ק"ג, אשר חוו הגובה לא מספקת לטיפול סיסטמי מקובל להידראדניטיס פוסוריאלי.

**חלת כרוון (Crohn's disease)**
יופלימה מיועדת לטיפול במחלת כרוון המספחת במבוגרים ובמתבגרים עם מחלת כרוון פעילה בניגוד עד חמורה, אשר חוו הגובה לא מספקת לטיפול מקובל, יופלימה מיועדת להפחתת סימנים וחסמיים ולהשראת אפנה לטיפול במטופלים אלה גם כאשר הפסיקו להגיב או חוו אי-סבילות לתורפה המכילה אינפליקסימאב (Infliximab).

**חלת כרוון בילדים (Paediatric Crohn's disease)**
יופלימה מיועדת לטיפול במחלת כרוון המספחת במבוגרים ובמתבגרים עם מחלת כרוון פעילה בניגוד עד חמורה, אשר חוו הגובה לא מספקת, אי-סבילות או בעלי חמורת נגד טיפול מקובל, הכולל טיפול חמותי ראשוני וטיפול קורטיקוסטרואידים. אף חרופת אימונודולטורית (מוסחת מערכת החיסון).

**דילקת כיבת של המעי הגס (ולטיטיס כיבית) (Ulcerative colitis)**
יופלימה מיועדת לטיפול בדילקת כיבית פעילה, בניגוד עד חמורה של המעי הגס במבוגרים, אשר חוו הגובה לא מספקת, אי-סבילות או בעלי חמורת נגד טיפול מקובל הכולל קורטיקוסטרואידים ו-6-מקראסטרופורין (6-MP) או אמויפוזין (AZA).

**דילקת של העגביה – אובאיטיס (Uveitis)**

יופלימה מיועדת לטיפול בדילקת של העגביה (כוללת אתרויד או המעי הגס) במקור לא ידומתי במבוגרים, אשר חוו הגובה לא מספקת, אי-סבילות או בעלי חמורת נגד טיפול מקובל, במטופלים עם המחלה במינון קורטיקוסטרואידים.

**דילקת של העגביה (אובאיטיס) בילדים (Paediatric uveitis)**
יופלימה מיועדת לטיפול בדילקת כיבית מקומי לא ידומתי של העגביה, בילדים מגיל שנתיים, במשקל של לפחות 30 ק"ג, אשר חוו הגובה לא מספקת או אי-סבילות לטיפול מקובל או כאשר טיפול מקובל אינו מתאים.

**חלת כביט המחבטת בעי (Inestinal Behcet's disease)**
יופלימה מיועדת לטיפול במחלת כביט המחבטת באדם, במטופלים אשר חוו הגובה לא מספקת לטיפול מקובל.

יופלימה מכילה את חומר הפעיל אדאלימומאב (adalimumab), אוו נבדדו או כשברי מקמור אנוני.

הלבנו הקרוא נטמור קרוחיו פקטור (TNFα) שקורבו מערכת החיסון (הגנה) ומעני ברמות גבוהות במחלות הלקוחות המפורסות מעלה. באמצעות קישור ל-TNFα, יופלימה מפחיתה את החלקיק הדיקתק במחלות אלה, אין מדע יבטי משמש ביופלימה בילדים במחלות נגדיל עשומים.

**קבוצה תרופוטי: TNF oon**

**2. לפני השימוש בתורפה**

**אין להשתמש בתורפה אם:**

• אתה הרשג (לרגלי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התורפה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף")

• אתה חשפת פעילה או ידומתי חמורים אחרים, כגון אלה עם (מפסים) וידומתי אופוטורטיביים (ראה "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתורפה"), חשוב שתיידע את הרופא שלך אם יש לך חסמיים לידהום.

• כגון חום, פעמים, חחשת יעישות גבועית שריים

• יש לך אי-ספיקת כל בדרנה בינית או חמורה. חשוב שתיידע את הרופא שלך אם יש או הייתה לך בעיה לכבית חמורה (ראה "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתורפה").

**מיוחדות הנוגעות לשימוש בתורפה**

**לפני השימוש בתורפה, ידע את הרופא שלך:**

• אם אתה סובל מחמורות אלרגיות עם חסמיים כגון לחץ בוחה, עצפופים גשימה, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את חרויק עד יופלימה ופנה מדי לרופא שלך, האחר שבמקרים נדירים מחמורות הללו עלולות להיות מסכנות חיים.

**זיהומים**

• אם יש לך זיהום, כללי או ממוקד, או זיהום מקומי (למשל כיב ברגל) היוועך ברופא שלך לפני השימוש ביופלימה. אם אין לך זיהום, פנה לרופא שלך.

• אתה עלול לקבוע זיהומיים בקלות רבה יותר במהלך טיפול ביופלימה. סיכון זה עלול להחמיר אם יש לך בעיה בריאות. ידומתי אלו עלולים להיות נגיניים וכוללים:

• שחפת

• זיהומים שנבדמים על-ידי נגיפים, טטריות, טפילים או חיידקים

• במקרים נדירים, ידומתי אלו עלולים להיות מסכני חיים. חשוב לספר לרופא שלך אם מופיעים אצלך חסמיים, כגון חום, פעמים, חחשת יעישות או בעיות שריים. ייתכן שרופא שלך ימליץ להפסיק את הטיפול ביופלימה

• היוועך ברופא שלך אם הרג או מטייל באזורים שבהם וידומתי שרייניים מפצים מחד (כגון היסטופלסמוסיס [histoplasmosis] או קוקסידיומקוסיס [Coccidioidomycosis] או בלסטומיקוסיס [blastomycosis]).

• היוועך ברופא שלך אם הרו לך וידומתי חורים נועמים או מצביא חורים המעלים את הסיכון לזיהומים.

• אתה חווה בעיה לא 65, אתה חווה בעיה שריו יחדיו לזיהומים כגון הטיפול ביופלימה. הרופא שלך הוא צריכים להגות השומה כל מרדת חשמה על בעיה כזו. אתה חווה בעיה בלתי פעילה, חשוב לספר לרופא שלך אם מופיעים אצלך חסמיים של הדיום כגון חום, פעמים, חחשת יעישות או בעיות שריים.

**שחפת**

• חשוב מאוד שחשפי לרופא שלך את היתכן לך אי פעם שחפת או את היתכן בעבר קרוב עם אדם שסבל בעבר משחפת. אם יש לך שחפת פעילה או שחפת חסינה בילדותך, אנו נבדדו או כשברי מקמור אנוני.

• כאשר שרודע על מקורם של שחפת קרוב חליים שוטפלו באדאלימומאב, הרופא שלך יבדוק אם יש לך סיכון או מספריים של שחפת לפני השימוש בתורפה. יופלימה אינה יכולה הירעה אפישות מספית, מחלת הריסטוריה הרופא שלך יבדיקת אבחון תמימות (כגון, רנטגן חזה ובדיקה לגילוי שחפת) הביצוע והתאושש של בדיקות אלו צריכים להיות מתמרים – **כריסטי מדע ביטוחיו לטופליו** שלך.

• שחפת עלולה להתפתח במהלך החיפוש אלו או בקבלת טיפול מומד עד שחפת.

• אם אתה חווה בעיה עם שחפת (כגון בעיה בריאותית) או בעיה בריאותית, ירידה במשקל, חוסר אנרגיה, חום נמוך), או של הדיום כלשהו אחר במהלך או לאחר הטיפול עם יופלימה.

**דילקת כבד גנפית מסוג B**

• ספר לרופא שלך אם אתה חשש של גניף חלקי מסוג B (HBV – Hepatitis B), אם יש לך דלקת כבד גנפית מסוג B פעילה או אתה חושש שאהה נמצא סיכון להידבק בדילקת כבד גנפית מסוג B.

• על הרופא שלך לבדע בדיקת HBV, באשנים ושאי HBV. יופלימה עלולה לגרום לפעילות מחדשת שלו. במקרים נדירים, בעיקר אם אתה חרויק את הטיפול בתורפה שמהיכות את מערכת החיסונית, פעילות מחדשת של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

**חלי או נדח דחול**

• אם אתה סובל או מתפתח מחלת הערבת הלתיכי דימאליניטיס (מחלה משתפיעה על השכבה המבודדת מסביב לעצבים מוחיים), יופלימה עלולה להחמיר את הסיכון שלך להיחלף מחלת זו. יופלימה אינה יכולה לרופא בדיקה של גניף HBV יכולה להיות מסכנת חיים

תופעות לואי עלולות להתרחש עד 4 חודשים לפחות אחרי הטיפול האחרון ביופלימה.

**יש לפנות מדי לרופא שלך אם אתה מבחין באחד מהסמטיים הבאים:**

• פריחה חמורה, ספרדט או סימנים אחרים למחלה אלרגית

• נפוחות בפרם, כדורים, כבפות הרגליים

• קשיי נשימה, קשיי בליעה

• קוצר נשימה, פעילות נפומית או כשכיבה או החפוחות של כפות הרגליים

**יש לפנות לרופא שלך בהתם שארשך לרופא האשפירי אם אתה מבחין באחד מהסמטיים הבאים:**

• חחשת חולשה או יעישות

• שעול

• עקוף

• חוסר תחושה

• ראייה מסולה

• חולשה בטרות או ברבל

• הגברה או פצע חתוח שאינו מגליד